

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Josef Klíma

O zborčené ploše, jejíž část je topologicky ekvivalentní s Möbiovým listem

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 65 (1936), No. 4, 211--216

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/109339>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1936

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O zborcené ploše, jejíž část je topologicky ekvivalentní s Möbiovým listem.

Josef Klíma, Brno.

(Došlo dne 18. března 1935.)

V topologii uvádí se jako nejjednodušší příklad dvojité plochy¹⁾ nebo jednostranné, uvažujeme-li, že je uložena v prostoru o větším počtu dimensí než je dvě, t. zv. Möbiův list. Tento vznikne tím, že obdélníkový proužek slepíme podél dvou protějších stran tak, že jednu z těchto stran otočíme o 180° kol jejího středu. Ploška tak vytvořená je zřejmě rozvinutelná. Ale uvádí se, že lze plochu ekvivalentní topologicky s Möbiovým listem vytvořit ještě jinak,²⁾ leč pak plocha tato není, jak dále uvidíme, rozvinutelnou.


Zvolme v rovině α , jdoucí osou O , bod a mimo přímku O ! Bodem a vedme v α úsečku m^1m , jež je bodem a půlena! Nechť rovina otáčí se rovnoměrně kolem osy O a současně úsečka m^1m kolem bodu a v rovině α též rovnoměrně a sice úhlovými rychlostmi v poměru 2 : 1. Při otočení roviny α o úhel 360° ; otočí se úsečka m^1m o 180° , takže bod 1m splyne s počáteční polohou bodu m a obráceně. Úsečka m^1m při této dvojí rotaci vytvoří plochu, jež je zřejmě topologicky ekvivalentní s Möbiovým listem. Plocha takto vytvořená je částí jisté zborcené plochy, již vytvoříme hořejším způsobem, vezmeme-li v rovině α místo úsečky m^1m její prodloužení, přímku V . Lze snadno ukázat, že plocha tato je zborcenou plochou třetího stupně, která má přímku O za jednoduchou řídicí přímku. Sestrojíme tuto plochu v t. zv. vojenské perspektivě, t. j. v šikmém průmětu na rovinu π kružnice K , již opisuje bod a přímky V při otáčení kol osy O , pro promítací paprsky svírající s π úhel 45° .

V obr. 1 počáteční poloha přímky V vzata v rovině π kolmo k ose O a k jejímu šikmému průmětu O^k . Nechť otáčí se bod a ve smyslu + (proti směru pohybu ručiček na hodinách) kol osy O na kružnici K a přímka V ve smyslu — v rovině (VO) , takže průsečík b


¹⁾ Viz na př. Hlavatý: Úvod do neeuclidovské geometrie, str. 158.

²⁾ Steinitz-Rademacher: Vorlesungen über die Theorie der Polyeder (1934), str. 19.

přímky V s osou O probíhá tuto osu od středu o kružnice K vzhůru. Při otočení o úhel φ kol osy O , otočí se přímka V v rovině (VO) o úhel $\frac{1}{2}\varphi$ do polohy 1V . Šikmý průmět ${}^1V^k$ jde patrně diametrálně



protilehlým bodem D^k k bodu a na kružnici K . Z toho patrně, že vytvořená zborcená plocha má řídicí přímku D , jež má šikmý průmět v bodě D^k kružnice K . Přímka V vytvoří tudíž zborcenou plochu třetího stupně, jež má kružnici K , osu O za jedno-



duché řídicí útvary a přímku D za dvojnou řídicí přímku a lze ji označiti $[O, D, K]$. Rovina π je tečnou rovinou plochy v bodě a a její řez s plochou rozpadá se v přímku V a kružnici K . Torsální roviny jsou tu minimálními rovinami, jdoucími přímkou O , kuspídní body jsou jejich průsečíky s přímkou D . Ježto přímka D svírá s π úhel 45° a kolmý její průmět do π je v tečně kružnice K ,

jsou torsální přímky 1T , 2T imaginární druhého druhu a sice minimální, ležící v rovinách rovnoběžných s π ve vzdálenostech $\pm ai$, je-li a poloměr kružnice K . Ve zvolené vojenské perspektivě obrys plochy rozpadá se ve tři body, z nichž jeden je v D^k a druhé dva jsou v bodových průmětech ${}^2V^k$, ${}^4V^k$ tvořících přímek, rovnoběžných se směrem promítání.

V obr. 2 vyznačena zborcená tato plocha v kolmém promítání na rovinu π kružnice K , jež vzata za první průmětnu. Řez plochy s libovolnou rovinou $\lambda \parallel \pi$ je strofoidou A , jak ukážeme snadno následovně. Rovina λ protíná dvojnou řídicí přímku D v bodě d , jehož půdorys je od stopníku p přímky D vzdálen o délku pd_1 rovnou výšce roviny λ nad π . Průsečík x libovolné tvořící přímky 1V zborcené plochy s rovinou λ , je na průsečnici roviny (D^1V) s rovinou λ , jež je hlavní přímkou v rovině (D^1V) a tedy je rovnoběžná se stopou $p'a$ téže roviny na π . Opíšme kol středu O_1 kružnici L , jež jde bodem d_1 a její druhý průsečík s d_1x_1 označme ξ . Jestliže d_1x_1 protíná tvořící přímku V , ležící v π v bodě ${}^1\xi$, tu platí:


$$\xi x_1 = -d_1 \cdot {}^1\xi,$$

v čemž obsaženo známé kissoidální vytvoření strofoidy A_1 z kružnice L , jejího průměru V pro pól d_1 na kružnici.³⁾ Bod d je dvojným bodem řezu A a tečny v něm mají půdorysy jdoucí průsečíky kružnice L s přímkou V a tudíž vzájemně kolmé. V půdoryse 1V_1 je půdorys ještě druhé přímky ${}^1V'$, jež má stopník na π v bodě a' a která protíná rovinu λ v bodě x' . Polární subnormála pro pól d_1 křivky A_1 v bodě x'_1 je dána úsečkou $d_1n = d_1\xi - d_1r'$, kde body ξ , r' jsou na normálách křivek L a V , jichž kissoidou je A_1 . Reálná asymptota A_1 křivky A_1 je souměrně položená k V vzhledem k dvojnému bodu d_1 . Bod O_1 je singulárním ohniskem křivky A_1 , což vyplývá též z toho, že A je řezem s plochou. V obr. 2 vyznačena ona část plochy, která je mezi rovinami π a λ .

Část této zborcené plochy, jež je topologicky ekvivalentní s Möbiovým listem, je omezena částí M průsečné křivky této plochy s plochou anuloidu o středové kružnici K a poloměru r , jestliže délka $m^1m = 2r$. Průsečná křivka obou ploch je stupně 3 . 4 = 12, jež se tu rozpadá ve dvě křivky stupně 6, z nichž jedna je okrajem M . Křivku M lze výhodně sestrojiti ze sférické křivky M' , jež je na kulové ploše κ opsané ze středu o kružnice K poloměrem r . V obr. 3 sestrojeno vše opět v kolmém průmětu na rovinu π kružnice K co prvou průmětnu. Mysleme si, že s vytvořujícími přímkami V , 1V , ... plochy zborcené vedeme středem o kulové plochy κ rovnoběžky, jež lze dostati též tak, že tvořící přímka V otáčí se rovnoměrně kolem O a současně v rovině (VO) kol bodu o úhlovými rychlostmi v poměru 2 : 1. Průsečíky m' , ${}^1m'$ přímek těchto

³⁾ Wieleitner: Spezielle ebene Kurven, str. 37.

s kulovou plochou κ opíše na této křivku, jež je celičí druhého druhu.⁴⁾ Půdorys M'_1 je ruzičí o rovnici v polární soustavě $\rho = r \sin \frac{1}{2}\omega$,⁵⁾ jež je prodlouženou epicykloidou o dvou větvích, jíž opíše bod m' , spojíme-li jej s kružnicí P , která se kotálí po kružnici P' o poloměru dvojnásobném.⁶⁾ Křivka M'_1 je stupně 6 majíc rovnici v pravoúhlé soustavě vzhledem k ose $X \equiv m'm'$ a po-



čátku o:

$$4(x^2 + y^2)^3 + r^4 y^2 - 4r^2(x^2 + y^2)^2 = 0.$$

Kruhové body jsou trojnými body křivky M'_1 . Ježto kružnice o středu v počátku o mají v konečnu s M'_1 4 společné body, je v kruhových bodech obsaženo jejich zbývajících 8 průsečíků. Těčnu v libovolném bodě křivky M'_1 jakož i oskulační kružnice v jejích vrcholech lze snadno sestrojiti z jejího kinematického vytvoření.⁷⁾ Půdorys M_1 okraje je částí konchoidy křivky M'_1 pro pól o a délku rovnou poloměru a kružnice K . Úplná tato konchoida,


⁴⁾ G. Loria: Curve sghembe speciali, II. díl, str. 59.

⁵⁾ G. Loria: Spezielle algebraische Kurven und transcendente Kurven, I. díl, str. 366.

⁶⁾ Tamtéž, II. díl, str. 109.

⁷⁾ Kadeřávek-Klíma-Kounovský: Deskr. geometrie, I. díl, str. 128.

jež je kissoidou křivek M_1, K_1 pro pól o , je stupně $2 \cdot 2 \cdot 6 = (2 \cdot 2 + 8) = 12$,⁹⁾ ale rozpadá se tu ve dvě křivky stupňů 6, souměrně k sobě položených podle středu o .⁹⁾ Půdorys M_1 okraje plochy je křivkou stupně 6, jež má v počátku o a v bodě 3V_1 dvojně body a v kruhových bodech trojně body. Prostorová křivka M je též stupně 6, ježto je zvláštním případem globoidální závitnice (šneku).¹⁰⁾ Závitnici tuto vytvoří bod probíhající rovnoměrně kružnici, která se současně rovnoměrně otáčí kol obecně položené



osy tak, že úhlové rychlosti obou pohybů jsou v konstantním poměru $m : n$, a která je racionální křivkou stupně $2(m + n)$. V našem případě jest $m : n = 1 : 2$ a tedy M je prostorovou křivkou stupně 6.

Proniková čára zmíněného anuloidu se zborcenou plochou rozpadá se tu v křivku M a v křivku, již vyplňují průsečíky tvořících přímek zborcené plochy s druhými kružnicemi polednfkovými anuloidu, jejichž středy přímky ty neprocházejí. Obě tyto části proniku protínaly by se reálně v průsečících d, d' dvojně řídicí přímky D s anuloidem.

V obr. 4 sestrojen šikmý obraz ($\omega = 150^\circ, q = \frac{2}{3}$) této části zborcené plochy a vyznačen obrys Ω zborcené plochy, z něhož

⁹⁾ Wieleitner: Spezielle ebene Kurven, str. 3, nebo Klíma: Příspěvek ke křivkám cissoidálním, Rozpravy České akademie 31 (1922), č. 39, 5 stran.

⁹⁾ Tamtéž str. 108. Jedna část konchoidy má v polárních souřadnicích rovnici $\rho - a = r \sin \frac{1}{2}\omega$ a druhá $\rho + a = r \sin \frac{1}{2}\omega$, jež převedeny na pravouhlé souřadnice dají rovnice stupňů 6.

¹⁰⁾ G. Loria: Curve sghembe speciali, II. díl, str. 33—35.

tři části přicházejí k platnosti. Křivka Ω je třetí třídy, čtvrtého stupně s třemi body vratu, z nichž v obraze je jen jeden reálný napravo od bodu a . V obr. 4 vyznačena kruhová dráha K bodu a na povrchu a patrně, že při jednom proběhnutí přijdeme na druhou stranu plochy v bodě a a teprve při dvojnásobném proběhnutí kružnice vrátíme se do bodu a . K jasnější představě listu použito nyní zaváděného vytahování,¹¹⁾ že čáry plochy v částech bližších k oku vytahují se silněji.

*

**Sur une surface gauche dont une partie est topologiquement
équivalente à la feuille de Möbius.**

(Résumé de l'article précédent.)

Cette partie de la surface est engendrée par un segment m^1m d'une droite V qui tourne uniformément autour d'un axe O se trouvant avec V dans un plan et qui tourne en même temps autour de son centre a ($am = {}^1ma$), les deux vitesses angulaires ayant le rapport 2 : 1. La droite V engendre une surface réglée du troisième degré, soit D sa directrice double. Les plans perpendiculaires à la directrice simple O coupent la surface réglée suivant des strofoïdes. La courbe M qui limite la partie considérée est de l'ordre 6, et elle admet une construction simple dans la projection orthogonale sur le plan π qui contient la circonférence K décrite par le centre a du segment m^1m . Dans la figure 4 se trouve construite cette partie de la surface à la perspective cavalière, trois parties de la courbe Ω du contour et le segment d^1d de la droite double D de la surface y jouant un rôle.

¹¹⁾ Viz na př. Hilbert-Cohn: Anschauliche Geometrie.