

Jiří Štěpánek

Rozvoj analytické funkce v „Taylorovu“ řadu s proměnným středem

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 81 (1956), No. 1, 38--42

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117170>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1956

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

ROZVOJ ANALYTICKÉ FUNKCE V „TAYLOROVU“ ŘADU S PROMĚNNÝM STŘEDEM

JIRÍ ŠTĚPÁNEK, Praha.

(Došlo dne 14. ledna 1955.)

DT 517.531:517.513

V této práci je uvažován „Taylorův“ rozvoj analytické funkce s proměnným středem závislým na jistém parametru t . Pro spec. hodnoty t dostáváme tak různé rozvoje; mezi nimi pak Taylorův rozvoj a rozvoj konvergující v t. zv. polygonu konvergence (srov. podobný pojem v knize ÉMILA BORELA: *Leçon sur les séries divergentes*, Paris 1901, IV. a V. kap.). Spojitou změnou parametru lze konvergenční obor tohoto rozvoje spojitě měnit, zvětšovat nebo zmenšovat. Tyto rozvoje tvoří v jistém smyslu spojitý přechod mezi elementem-mocninou řadou dané funkce a funkcí samou.

Budiž dána analytická funkce $f(z)$ svým elementem

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k. \quad (1)$$

Analytickým pokračováním tohoto elementu obdržíme množinu M singulárních bodů funkce $f(z)$, která může býti izolovaná (jako na př. u funkcí meromorfních) nebo neisolovaná (na př. singulární body vyplní oblouk nějaké křivky).

Sestrojíme v z -rovině oblast H (tak zv. hvězdu) násl. způsobem: Spojme všechny singulární body funkce $f(z)$ s bodem z_0 . Na každé z těchto přímek zvolme pak tu polopřímku s počátkem v singulárním bodě, jež neobsahuje bod z_0 . Dostaneme tak jednoduše souvislou oblast H , která obsahuje vnitřek konvergenčního kruhu mocninné řady (1). Analytickým pokračováním řady (1) v této hvězdě dostaneme podle věty o monodromii jednoznačnou větev funkce $f(z)$. Znakem $f(z)$ budeme dále označovati pouze tuto větev. Sestrojíme nyní t. zv. polygon konvergence funkce $f(z)$ tím způsobem, že v každém singulárním bodě α vztyčíme kolmici na „paprsek“ hvězdy. Každá kolmice rozdělí z -rovinu na dvě poloroviny. Průnik všech otevřených polorovin obsahujících bod z_0 jest oblastí, jež má tyto vlastnosti: jest konvexní; vnitřek konvergence kruhu řady (1) je její částí; funkce $f(z)$ je v ní regulární. Tuto oblast označíme zkráceně PK .

Poznámka. Je-li $f(z)$ meromorfní, pak hranicí PK je polygon. Vyplňují-li sing. body nějaký oblouk, pak tento oblouk je úpatnicí „příslušného“ oblouku hranice PK pro střed z_0 . Na př.: Když singulární body vyplňují přímku, pak hranicí PK je parabola, jež má onu přímku za vrcholovou tečnu a bod z_0 za ohnisko. Obecněji je hranice PK složena z oblouků křivek, které jsou obálkami kolmic vztyčených v singulárních bodech na „paprsky“ hvězdy.

Věta 1. Pro funkci $f(z)$ platí v jejím PK rozvoj

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(\zeta) \cdot (z - \zeta)^n, \quad (2)$$

kde $\zeta = z_0 + \frac{1}{2}(z - z_0)$.

Důkaz. Bod ζ je střed úsečky z_0z . Je-li $z = z_1$ pevný bod, pak řada (2) je mocninná řada konvergující uvnitř kružnice $|z - \zeta| < |\alpha - \zeta|$, kde α je singulární bod nejbližší bodu ζ . Je-li nyní koncový bod z této úsečky proměnný, řada (2) konverguje pro všechna z splňující nerovnost

$$|z - z_0 - \frac{1}{2}(z - z_0)| < |\alpha - z_0 - \frac{1}{2}(z - z_0)|,$$

t. j.

$$(\bar{\alpha} - \bar{z}_0)z + (\alpha - z_0)\bar{z} + \alpha z_0 + \bar{\alpha} z_0 - 2\alpha\bar{\alpha} < 0, \quad (3)$$

což je otevřená polorovina s bodem z_0 , jejíž hranicí je kolmice v bodě α na spojnici jeho s bodem z_0 . Průnik takovýchto polorovin pro všechny sing. body α jest právě PK funkce $f(z)$.

Poznámka. Proměnný střed řady (2) v případě, že hranicí PK je nějaká křivka, leží tedy v oblasti s bodem z_0 , ohraničené křivkou homothetickou s hranicí PK pro střed v bodě z_0 a poměr 1 : 2.

Rozvoj pro funkci $f(z)$ v jejím PK se získá tedy velice „lacině“: Jest to formálně Taylorova řada o proměnném středu ζ . Ve většině případů konverguje však tato řada v daleko větší oblasti než je konvergenční kruh mocninné řady (1) a její konvergence uvnitř PK je také stejnoměrná. Mohli bychom provádět analytické pokračování pomocí těchto „elementů“. Řada (2) odstraňuje tedy tu „nepříjemnost“, že konvergenční kruh se nedá rozšířit i když na jeho obvodě leží jediný singulární bod.

Pro $z_0 = 0$ dostaneme analogon k řadě Maclaurinově

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}\left(\frac{z}{2}\right) \left(\frac{z}{2}\right)^n.$$

V dalším sestrojíme rozvoje pro funkci $f(z)$, jež tvoří jakýsi spojitý přechod mezi jejím Taylorovým rozvojem a funkcí samou, t. j. rozvoje, jejichž konvergenční obory se dají neomezeně zvětšovat. Přitom řada (2) bude v nich zahrnuta jako speciální případ. Nahradíme totiž kolmice na paprsky hvězdy v singulárních bodech kruhovými oblouky.

Věta 2. Budiž $\zeta = z_0 + t(z - z_0)$, kde t je reálný parametr a $\alpha \neq z_0$ nechť je libovolný singulární bod funkce (z) . Pak rozvoj

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(\zeta)(z - \zeta)^n \quad (4)$$

konverguje pro $t > \frac{1}{2}$ resp. $t < \frac{1}{2}$ vně resp. uvnitř každé kružnice incidentní se singulárním bodem α , se středem na přímce $z_0\alpha$, pro jejíž poloměr r v případě, že $t > \frac{1}{2}$ platí $\lim_{t \rightarrow 1} r = 0$. Při tom konvergenční obor obsahuje vždy jisté okolí bodu z_0 .

Důkaz. Jako v předchozím případě řada (4) konverguje pro z splňující nerovnost

$$|z - z_0 - t(z - z_0)| < |\alpha - z_0 - t(z - z_0)|,$$

kde α je nejbližší singulární bod k bodu ζ , t. j. pro

$$(1 - 2t)z\bar{z} + [t\bar{\alpha} - (1 - t)\bar{z}_0]z + [t\alpha - (1 - t)z_0]\bar{z} + (1 - t) \cdot (\bar{\alpha}z_0 + \alpha\bar{z}_0) - \alpha\bar{\alpha} < 0.$$

Pro $\frac{1}{2} < t$ resp. $t < \frac{1}{2}$ dostáváme tak vnějšek resp. vnitřek kružnice incidentní se singulárním bodem α , o středu v bodě $z^* = \frac{t-1}{2t-1}z_0 + \frac{t}{2t-1}\alpha$ a poloměru

$r = \left| \frac{t-1}{2t-1} |z_0 - \alpha| \right|$. Řada (4) konverguje tedy v prvním případě vně všech takovýchto kružnic, ve druhém případě uvnitř. Jest $\lim_{t \rightarrow 1} r = 0$. Konvergenční obor vždy existuje a obsahuje nějaké okolí bodu z_0 . Nechť totiž β je střed úsečky $z_0\alpha$. Roste-li parametr t od $-\infty$ do $+\infty$, pohybuje se střed z^* po přímce $z_0\alpha$ od bodu β přes z_0 do ∞ a odtud zase přes bod α k β . Pro $t < 0$ je uvnitř úsečky $z_0\beta$ (pro $t = 0$ je $z^* = z_0$), pro $0 < t < \frac{1}{2}$ je na polopřímce s počátečním bodem z_0 , jež neobsahuje α (pro $t = \frac{1}{2}$ je $z^* = \infty$), pro $\frac{1}{2} < t < 1$ je na paprsku hvězdy (pro $t = 1$ v bodě α), pro $1 < t$ uvnitř úsečky $\alpha\beta$ (pro $t = \infty$ zase v bodě β).

Poznámka. Jako spec. případy dostaneme z rozvoje (4) Taylorovu řadu (1) (pro $t = 0$), řadu o jednom členu, totiž $f(z)$ (pro $t = 1$) a řadu (2) (pro $t = \frac{1}{2}$). Pro $\frac{1}{2} \leq t < 1$ obsahuje příslušný konvergenční obor polygon konvergence, pro $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ konvergenční kruh řady (1).

Ukážeme, že polygon konvergence funkce $f(z)$ lze ještě jistým způsobem deformovat. Omezíme se pro jednoduchost na případ $z_0 = 0$.

Položíme-li

$$t = r + is, \quad z = x + iy, \quad \alpha = a + bi,$$

kde r, s, x, y, a, b jsou reálná čísla, dostaneme z nerovnosti (3)

$$(1 - 2r)(x^2 + y^2) + 2(ar + sb)x + 2(br - sa)y - (a^2 + b^2) < 0.$$

Pro $r = \frac{1}{2}$ je to zase otevřená polorovina s počátkem, jejíž hranicí jest přímka incidentní s α . Pro úhel φ , který svírá paprsek hvězdy s touto přímkou, platí

$\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{2s}$. Je tedy tento úhel nezávislý na singulárním bodě α . Pro $s = 0$ dostaneme PK , kdežto pro $s \neq 0$ dostaneme oblast, jež vznikne z PK otočením každé jeho strany kolem bodu α o úhel $\varphi - \frac{1}{2}\pi$. Tento „deformovaný“ PK neobsahuje tedy již konvergenční kruh řady $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) z^n$. Je-li $r \neq \frac{1}{2}$, $s \neq 0$, dostaneme jako konvergenční obor průnik všech vnějšků resp. vnitřků kružnic majících v bodech α tečny o směrnici $-\frac{ar - sb - a}{-br - sa + b}$. Úhel φ , který svírá paprsek hvězdy s příslušnou tečnou, je zase nezávislý na poloze bodu α , neboť platí $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1-r}{s}$.

Nechť nyní $f(z)$ je racionální funkce.

Analogicky s technikou rozvoje funkcí v potenční řady uvedeme zde jiný způsob rozvoje funkce $f(z)$ v řadu (4) pro $t = 1 - \frac{1}{2^m}$, kde m je přirozené číslo.

Rozložme racionální funkci $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ (kde polynomy $P(z)$, $Q(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$) jsou nesoudělné, při čemž $a_0 \neq 0$ a stupeň $Q(z)$ je větší než stupeň $P(z)$) na částečné zlomky tvaru

$$\frac{A}{(\alpha - z)^k} \quad (\alpha \neq 0).$$

Platí nyní

$$\frac{A}{\alpha^k} \left(1 - \frac{z}{2\alpha} - \frac{z}{2\alpha}\right)^{-k} = \frac{2^k A}{(2\alpha - z)^k} \left(1 - \frac{z}{2\alpha - z}\right)^{-k}.$$

Jestliže $|z| < |2\alpha - z|$, pak

$$\frac{A}{(\alpha - z)^k} = \frac{2^k A}{(2\alpha - z)^k} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-k}{n} \left(\frac{z}{2\alpha - z}\right)^n. \quad (5)$$

Množina bodů splňujících předchozí nerovnosti (pro každý singulární bod α) je však PK dané funkce. Sečtením všech řad (5) pro všechna α dostaneme žádaný rozvoj $f(z)$ v PK . Snadno se zjistí, že tento rozvoj lze psát ve tvaru uvedeném ve větě 1.

Provedme tento postup ještě jednou, t. j. položme

$$\begin{aligned} \frac{A}{(\alpha - z)^k} &= \frac{2^k A}{(2\alpha - z)^k} \left(1 - \frac{z}{4\alpha - 2z} - \frac{z}{4\alpha - 2z}\right)^{-k} = \\ &= \frac{2^k A}{(2\alpha - z)^k} \left(1 - \frac{z}{4\alpha - 2z}\right)^{-k} \left(1 - \frac{z}{4\alpha - 3z}\right)^{-k} = \frac{4^k A}{(4\alpha - 3z)^k} \left(1 - \frac{z}{4\alpha - 3z}\right)^{-k}. \end{aligned}$$

Za předpokladu, že

$$|z| < |4\alpha - 3z|,$$

je tedy

$$\frac{A}{(\alpha - z)^k} = \frac{2^{2k} A}{[2^{2\alpha} - (2^2 - 1)z]^k} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-k}{n} \frac{z^n}{[2^{2\alpha} - (2^2 - 1)z]^n}.$$

Tato řada konverguje vně kružnice

$$2z\bar{z} - 3\bar{\alpha}z - 3\alpha\bar{z} + 4\alpha\bar{\alpha} = 0.$$

Sečtením všech takových řad pro všechna α dostaneme rozvoj konvergující vně všech těchto kružnic.

Po m takovýchto krocích dostaneme indukci

$$\frac{A}{(\alpha - z)^k} = \frac{2^{mk} A}{[2^{m\alpha} - (2^m - 1)z]^k} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-k}{n} \frac{z^n}{[2^{m\alpha} - (2^m - 1)z]^n}.$$

Tato řada konverguje vně kružnice incidentní s bodem α , o poloměru $r = \frac{|\alpha|}{2^m - 2}$ a středu $z = \frac{2^m - 1}{2^m - 2} \alpha$.

Snadno zjistíme, že sečtením těchto řad pro všechna α dostaneme řadu (4), kde $z_0 = 0$, $t = 1 - \frac{1}{2^m}$, t. j.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)} \left(\frac{2^m - 1}{2^m} z \right) \left(\frac{z}{2^m} \right)^n. \quad (7)$$

Tedy po m krocích, kde

$$m = \left\lceil \frac{\log \left(\frac{M}{\varepsilon} + 2 \right)}{\log 2} \right\rceil + 1, \quad (M = \text{Max}(|\alpha|),$$

dostaneme tak řadu konvergující vně všech kružnic incidentních s body α o poloměrech menších než ε .