

Ján Jakubík

O existenčních algebrách

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 81 (1956), No. 1, 43--54

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117171>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1956

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O EXISTENČNÝCH ALGEBRÁCH

JÁN JAKUBÍK, Košice.

(Došlo dne 29. ledna 1955.)

DT: 512.9

Odsek 1 (doplnený na návrh recenzenta) má úvodný charakter. Jeho cieľom je oboznámiť čitateľa s pojmami ďalej užívanými (z ktorých nový je len pojem existenčnej algebry) a stručne informovať o význame doplnkovitosti relácií kongruentnosti. V odseku 2 sa dokazuje, že každá trieda existenčných algebier obsahuje algebru, ktorej relácie kongruentnosti sú nie doplnkové. V 3. odseku je dokázaná nesprávnosť istého tvrdenia G. BIRKHOFFA o algebrách s jednoprvkovými operáciami.

1

V abstraktnej algebre sa vyšetrujú množiny, na ktorých sú definované určité operácie. Za podstatne dôležité pritom nepovažujeme vlastnosti prvkov týchto množín, ale vlastnosti operácií. Zovšeobecnením známych pojmov grupy, okruhu, telesa a pod. dochádzame k obecnému pojmu algebry (viď [1], [2]):

Nech je daná množina A a množina operácií $F = \{f_\alpha\}$, pre ktoré platí: ku každej operácii $f_\alpha \in F$ existuje prirodzené číslo $n = n(\alpha)$ tak, že operácia f_α priradzuje každej postupnosti $\{x_1, \dots, x_n\}$ ($x_i \in A$, $i = 1, \dots, n$) určitý prvok $x = f_\alpha(x_1, \dots, x_n)$ z množiny A . Množina A s danou množinou operácií sa nazýva algebra.

Operácie $f_\alpha \in F$ nazývame základnými operáciami; bez ujmy všeobecnosti môžeme predpokladať, že v množine operácií F sa nachádza tiež operácia f_{α_1} , pre ktorú $n(\alpha_1) = 1$ a pre každé $x \in A$ platí $f_{\alpha_1}(x) = x$. Základné operácie nazývame tiež polynomami 1. stupňa. Indukciou definujeme polynomy n -tého stupňa ako výrazy tvaru $f_\alpha(u_1, \dots, u_n)$, kde $f_\alpha \in F$ a u_1, \dots, u_n sú polynomy najviac $n - 1$ stupňa. Význam výrazu „funkčná hodnota polynomu“ a „polynom o n premenných“ je zrejmý. Ak g, h sú polynomy o n premenných, a ak pre každú postupnosť $\{x_1, \dots, x_n\}$ prvkov z A platí $g(x_1, \dots, x_n) = h(x_1, \dots, x_n)$, hovoríme, že polynomy g, h sú si identicky rovné a píšeme $g \equiv h$.

Primitívnou triedou algebier nazývame triedu všetkých algebier, pre ktoré platí: 1. množina operácií $F = \{f_i\}$ je pre každú algebru tejto triedy tá istá, 2. je daná

množina dvojíc polynomov G tak, že pre každú dvojicu polynomov $(g_i^1, g_i^2) \in G$ a pre každú algebru tejto triedy platí $g_i^1 \equiv g_i^2$.

Mnohé vety, ktoré boli pôvodné známe pre niektoré špeciálne triedy algebier (napr. pre grupy), sa dajú zovšeobecniť na obecné algebry. Pri zovšeobecnení vynikne podstata vety, ukáže sa logický dosah potrebných predpokladov a „odfiltrujú“ sa vlastnosti špeciálneho typu algebry, ktoré na platnosť vety nemajú vplyv. Typickým príkladom takéhoto postupu sú vety Jordan-Hölderova a Schreierova (viď napr. [3]), dokázané pôvodne pre grupy, z ktorých temer bezprostredne vyplýva komplex ďalších dôležitých viet. Rad závažných prác bol venovaný postupnému zovšeobecňovaniu Jordan-Hölderovej vety (výčet týchto prác je uvedený v knihe [1], str. 89 (angl. vydanie); na príslušnom mieste ruského prekladu pripomína prekladateľ, že v poslednom čase vyšlo viac nových prác o zovšeobecnení vety Jordana-Höldera a uvádza tri najdôležitejšie z nich).¹⁾

Pri zovšeobecnení vety Jordana-Höldera na obecné algebry je podstatný predpoklad o doplňkovosti relácií kongruentnosti. Tento pojem je definovaný nasledovne:

Relácia kongruentnosti na algebre A je ekvivalencia²⁾ $x R y$ taká, že pre každé $f_\alpha \in F$ zo vzťahov $x_i R y_i$ ($i = 1, \dots, n$) vyplýva $f_\alpha(x_1, \dots, x_n) R f_\alpha(y_1, \dots, y_n)$. (Hovoríme tiež, že relácia R je súhlasná so všetkými operáciami $f_\alpha \in F$.) Relácie kongruentnosti (resp. ekvivalencie) R, R' na algebre A sú doplňkové, ak pre každú trojicu $x, y, z \in A$ zo vzťahov $x R y, y R' z$ vyplýva existencia prvku u , pre ktorý platí $x R' u, u R z$.

Podľa G. BIRKHOFFA dôležitosť doplňkových relácií kongruentnosti prvýkrát výslovne zdôraznili P. DUBREIL a M. DUBREIL-JACOTIN (viď [4]). Z predpokladu doplňkovosti relácií kongruentnosti vyplývajú okrem spomínaných viet typu Jordana-Höldera aj vety o rozkladoch obecnjej algebry na priamy súčin a polopriamy súčin, umožňujúce za určitých predpokladov skúmať štruktúru algebier a spôsob, akým sú tieto algebry zostrojené pomocou algebier s jednoduchšími vlastnosťami. O. BORŮVKA a O. ORE podrobne vyšetrili vlastnosti doplňkových ekvivalencií; ukázalo sa, že tento pojem patrí medzi základné pojmy v teorii rozkladov množín (viď [5], str. 10–19, [6], str. 590).

Z predošlého vyplýva, že má význam položiť si otázku: Za akých predpokladov sú všetky relácie kongruentnosti na algebrách určitej triedy navzájom doplňkové? V nedávno vyšlej práci [2] A. I. MALCEV úplne vyriešil túto otázku pre primitívne triedy algebier. Odvodil nutnú a postačujúcu podmienku, ktorú musí spĺňať primitívna trieda, aby každá algebra tejto triedy mala všetky relácie kongruentnosti navzájom doplňkové.

¹⁾ Vo februárovom čísle Mathematical Reviews (1955) sa recenzujú tiež dve práce o zovšeobecnení Jordan-Hölderovej vety.

²⁾ Ekvivalencia je binárna relácia R , splňujúca podmienky 1. $x R x$ pre každé $x \in A$, 2. $x R y \Rightarrow y R x$, 3. $x R y, y R z \Rightarrow x R z$.

Sú známe mnohé dôležité triedy algebier, ktoré sú nie primitívnymi triedami. Majú totiž okrem vlastností, ktoré možno popísať pomocou identít, aj vlastnosti iného charakteru. Najdôležitejšie vlastnosti iného druhu sú tieto:

1. *Existenčné vlastnosti.* Ak $g(z, z_1, \dots, z_n)$ je pevne zvolený polynom o $n + 1$ premenných v triede \mathfrak{A} , môžeme vysloviť nasledovnú vlastnosť, žiadanú od triedy \mathfrak{A} : ak S je ľubovoľná algebra triedy \mathfrak{A} a ak x_1, \dots, x_{n+1} sú ľubovoľné prvky z algebry S , existuje v algebre S jediný prvok x , vyhovujúci rovnici $g(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$. (I)

2. *Relácie.* Na algebrách triedy \mathfrak{A} môžu byť definované isté relácie, súvisiace s algebraickými operáciami tejto triedy.

Bolo by zaujímavé uvážiť, do akej miery a akým spôsobom sa dajú Malcevove výsledky rozšíriť aj na algebry, majúce vlastnosti všetkých spomenutých druhov. Zdá sa účelným vyšetrovať najprv niektorý zo špeciálnych prípadov, v istom zmysle opačných k pojmu primitívnej triedy: „existenčné algebry“ (v ktorých nepredpokladáme žiadne identity, len existenčné vlastnosti), alebo „algebry s reláciami“ (bez existenčných vlastností a bez identít, týkajúcich sa samotných algebraických operácií).

V tejto poznámke sa vyšetruje doplnkovosť relácií kongruentnosti pre triedy existenčných algebier. Dokážeme, že výsledky sú v určitom zmysle negatívne: existenčné vlastnosti samy o sebe (bez ich kombinácie s vlastnosťami iného druhu) nemajú žiadny vplyv na doplnkovosť relácií kongruentnosti. Zdá sa zaujímavým, že v súhre s vlastnosťami, definovanými pomocou identít, takýto vplyv môžu mať; nech \mathfrak{A} je trieda primitívnych algebier, z ktorých nie všetky majú relácie kongruentnosti doplnkové. Nech \mathfrak{A}_1 je trieda všetkých algebier, ktoré patria do triedy \mathfrak{A} a ktoré okrem toho splňujú určité existenčné vlastnosti. Môže sa stať, že všetky algebry triedy \mathfrak{A}_1 majú relácie kongruentnosti doplnkové (viď príklad v poznámkach za definíciou 2).

Ak každá algebra S triedy \mathfrak{A} má jediný prvok, potom vyšetrovanie doplnkovosti relácií kongruentnosti na algebrách triedy \mathfrak{A} je triviálne. V ďalšom budeme predpokladať, že aspoň jedna algebra uvažovanej triedy algebier má viac ako jeden prvok. (Z nižšie uvedenej vety 2 vyplýva, že pre triedy existenčných algebier takýto predpoklad nemusíme vyslovovať: pre ľubovoľnú triedu existenčných algebier \mathfrak{A} a ľubovoľné kardinálne číslo α existuje taká algebra S patriaca do triedy \mathfrak{A} , že kardinálne číslo množiny S je väčšie ako α .)

Pripomeňme nakoniec definíciu priameho súčinu dvoch algebier a faktorovej algebry vzhľadom k určitej relácii kongruentnosti:

Nech A, B sú algebry triedy \mathfrak{A} s množinou operácií F . Nech C je množina všetkých dvojíc (a, b) , $a \in A, b \in B$. Pre $f \in F$ definujeme

$$f((a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)) = (f(a_1, \dots, a_n), f(b_1, \dots, b_n)).$$

Tým je na množine C definovaná určitá algebra s množinou operácií F ; označujeme ju $A \times B$ a nazývame priamym súčinom algebier A, B .

Nech R je relácia kongruentnosti na algebre A s množinou operácií F . Ak $x \in A$, označme \bar{x} množinu všetkých prvkov $x' \in A$, pre ktoré platí $x' R x$. Systém všetkých množín \bar{x} označme \bar{A} . Pre $f \in F$ definujeme $f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = \bar{y}$. Množinu \bar{A} s takto definovanými operáciami $f \in F$ nazývame faktorovou algebrou na A vytvorenou reláciou kongruentnosti R a označujeme A/R .

2

Definícia 1. Nech \mathfrak{A} je (neprázdna) trieda všetkých algebier, ktoré majú nasledujúce vlastnosti: 1. v každej algebre triedy \mathfrak{A} sú definované základné operácie $f_i(x_1, \dots, x_n)$, $f_i \in A$; pre rôzne operácie f_i môžu byť príslušné čísla n rôzne, $n = n(i)$, množina $\{n(i)\}$ je ohraničená a existuje aspoň jedna operácia $f_{i_0} \in A$, pre ktorú $n(i_0) \geq 2$; 2. je daná množina polynomov $g_j(z, z_1, \dots, z_n)$, $g_j \in B$, zostrojených pomocou základných operácií $f_i \in A$ tak, že platí: ak $g \in B$ a ak S je ľubovoľná algebra triedy \mathfrak{A} , potom ku každej konečnej postupnosti o $n + 1$ prvkoch $x_1, \dots, x_{n+1} \in S$ existuje jediný prvok $x \in S$, vyhovujúci rovnici $g(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$. Hovoríme, že \mathfrak{A} je trieda existenčných algebier.

Poznámky. 1. Predpoklad o existenci aspoň jednej základnej operácie f_{i_0} , ktorá má najmenej dve premenné, je potrebný k tomu, aby bolo možné zostrojiť aspoň jeden polynom g_j , ktorý by mal viac ako jednu premennú. Niekoľko poznámok o algebrách, v ktorých každá základná operácia (a teda tiež každý polynom) má len jednu premennú, tvorí obsah nasledujúceho odseku 3.

2. Nech S je algebra, patriaca do triedy existenčných algebier \mathfrak{A} . Použijeme (všade ďalej) označenia z definície 1. Nech R je relácia kongruentnosti na S . Príslušná faktorová algebra nemusí patriť do triedy \mathfrak{A} ; od relácie R nežiadame, aby zachovávala „existenčné vlastnosti“. Ak $G \in B$ a \bar{x} označuje triedu vzhľadom k relácii R , obsahujúcu prvok x , rovnica $g(\bar{x}, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = \bar{x}_{n+1}$ má zrejme aspoň jedno riešenie, môže mať však aj viac riešení.

Definícia 2. a) Nech \mathfrak{A} je nejaká trieda algebier. Budeme hovoriť, že \mathfrak{A} má vlastnosť doplňkovosti, ak pre ľubovoľnú algebru S z triedy \mathfrak{A} , ľubovoľné prvky $x, y, z \in S$ a ľubovoľné relácie kongruentnosti R_1, R_2 na S zo vzťahu $x R_1 y R_2 z$ vyplýva existencia prvku u , vyhovujúceho vzťahu $x R_2 u R_1 z$.

b) Budeme hovoriť, že trieda algebier \mathfrak{A} má vlastnosť silnej nedoplňkovosti, ak obsahuje algebru S , pre ktorú platí: K ľubovoľnému prvku $x \in S$ existujú relácie kongruentnosti R_1, R_2 na S a nekonečne mnoho dvojíc $y, z \in S$, tak, že platí $x R_1 y R_2 z$, a v S neexistuje prvok u , ktorý by vyhovoval vzťahu $x R_2 u R_1 z$.

c) Budeme hovoriť, že trieda algebier \mathfrak{A} má vlastnosť (A), ak pre ľubovoľnú algebru S , patriacu do \mathfrak{A} , platí: každý vytvorujúci rozklad R na S je jednoznačne určený ľubovoľnou zo svojich tried; ak \mathfrak{A} nemá vlastnosť (A), hovoríme, že má vlastnosť (A').

Poznámky. 1. Ak trieda \mathfrak{A} má vlastnosť silnej nedoplňkovosti, zrejme nemá

vlastnosť doplnkovosti; ak nemá vlastnosť doplnkovosti, nemusí ešte mať vlastnosť silnej nedoplnkovosti.

2. Nech \mathfrak{A} je primitívna trieda algebier, majúca vlastnosť silnej nedoplnkovosti a vlastnosť (A'). Nech \mathfrak{B} je trieda tých algebier, ktoré patria do \mathfrak{A} a ktoré mimo identít, žiadaných v triede \mathfrak{A} , splňujú ešte nejakú existenčnú vlastnosť. Môže sa stať, že trieda \mathfrak{B} má vlastnosť doplnkovosti a vlastnosť (A). Príklad. Nech \mathfrak{A} je trieda všetkých pologrúp. Lahko sa zistí, že \mathfrak{A} má vlastnosť silnej nedoplnkovosti a vlastnosť (A'). Nech \mathfrak{B} je trieda tých pologrúp S , v ktorých pre $a, b \in S$ rovnice $ax = b, ya = b$ majú jediné riešenie. Potom \mathfrak{B} je trieda všetkých grúp; je známe, že trieda \mathfrak{B} má vlastnosť doplnkovosti a vlastnosť (A).

3. Typickým príkladom triedy existenčných algebier je trieda všetkých kvazigrúp (ak kvazigrupu definujeme ako algebru s jednou binárnou operáciou — násobením a žiadame existenciu prvkov x, y , pre ktoré je $ax = b, ya = b$). V Birkhoffovom probléme 31 (viď [1], str. 130) je položená otázka, či trieda všetkých kvazigrúp \mathfrak{A} má vlastnosť doplnkovosti. G. TREVISAN v práci [7] a VAN ŠI-CIAN v práci [8] (túto prácu poznám len z referátu v časopise Referativnyj žurnal, II, 1954) dokázali, že trieda všetkých kvazigrúp nemá vlastnosť doplnkovosti. Uvedieme jednoduchý dôkaz nasledujúceho silnejšieho tvrdenia:

Veta 1. Každá trieda existenčných algebier má vlastnosť silnej nedoplnkovosti a vlastnosť (A').

Dôkaz. Nech \mathfrak{A} je trieda existenčných algebier. Nech S_0 je algebra triedy \mathfrak{A} , obsahujúca aspoň dva prvky. Priamy súčin $S_0 \times S_0 = S$ je zrejme tiež algebra triedy \mathfrak{A} ; algebra S obsahuje viac ako tri prvky. Nech N je množina všetkých celých čísel. Uvažujme množinu S' všetkých funkcií $x = f(n)$, ktorých oblasťou definície je N , a ktorých funkčné hodnoty patria do S . Nech $f_i(x_1, \dots, x_m)$ je operácia, definovaná na algebrách triedy \mathfrak{A} . Ak $h_1, \dots, h_m \in S'$, utvoríme pomocou týchto prvkov novú funkciu $f_i(h_1, \dots, h_m) \in S'$ tak, že položíme

$$f_i(h_1, \dots, h_m)(n) = f_i(h_1(n+1), \dots, h_m(n+1))$$

pre každé $n \in N$. Tým sme na S' definovali všetky operácie f_i , ktoré sú definované na algebrách triedy \mathfrak{A} . Uvažujme rovnicu

$$g(h, h_1, \dots, h_n) = h_{n+1},$$

kde h_1, \dots, h_{n+1} sú dané prvky z množiny S' . Lahko sa dokáže, že táto rovnica má jediné riešenie $h(n)$. Teda S' je algebra triedy \mathfrak{A} .

Nech h_1 je ľubovoľný prvok algebry S' . Zvoľme si číslo $n_0 \in N$ a zostrojme funkcie $h_2(n), h_3(n)$ takto:

1. pre $n = n_0$ si zvolíme hodnoty $h_2(n_0), h_3(n_0) \in S$ tak, aby prvky $h_1(n_0), h_2(n_0), h_3(n_0)$ boli navzájom rôzne;

2. pre $n < n_0$ položíme $h_2(n_0) = h_3(n_0) = h_1(n_0)$;
3. pre $n > n_0$ môžu byť $h_2(n)$, $h_3(n)$ ľubovoľné prvky, patriace do S .

Definujme relácie R_1, R_2 na S' takto: pre $h, h' \in S'$ položíme $h R_1 h'$ ($h R_2 h'$), ak

1. pre $n < n_0$ platí $h(n) = h'(n)$,
2. prvky $h(n_0)$, $h'(n_0)$ sú si alebo rovné, alebo jeden z nich je rovný $h_1(n_0)$ ($h_2(n_0)$) a druhý $h_3(n_0)$.

Ľahko sa zistí, že R_1, R_2 sú relácie kongruentnosti na S' a že pre ne platí $h_1 R_1 h_3 R_2 h_2$.

Ak by existoval prvok $h_4 \in S'$, vyhovujúci podmienkam

$$h_1 R_2 h_4 \quad (1), \quad h_4 R_1 h_2 \quad (2),$$

vyplývalo by zo vzťahu (1) $h_1(n_0) = h_4(n_0)$ a zo vzťahu (2) $h_4(n_0) = h_2(n_0)$, t. j. $h_1(n_0) = h_2(n_0)$, čo je spor s predpokladom. Keďže hodnoty $h_2(n)$, $h_3(n)$ pre $n > n_0$ sú ľubovoľné, existuje takýchto dvojíc h_2, h_3 nekonečne mnoho. Tým je dokaná, že trieda \mathfrak{A} má vlastnosť silnej nedoplňkovosti.

Definujme ďalej na algebre S' reláciu R_3 tak, že položíme $h R_3 h'$ vtedy a len vtedy, ak pre $n < n_0$ platí $h(n) = h'(n)$. Ľahko sa zistí, že R_3 je relácia kongruentnosti na S . Nech \bar{h} (\tilde{h}) je trieda vytvoreného rozkladu R_1 (R_3), obsahujúca prvok h . Zrejme platí $\bar{h}_2 = \tilde{h}_3$. Keďže $R_1 \neq R_3$, trieda \mathfrak{A} má vlastnosť (A').

Poznámka. Nech \mathfrak{A} je trieda existenčných algebier, nech S je algebra triedy \mathfrak{A} , nech C je množina všetkých relácií kongruentnosti na S , nech C_1 je množina tých relácií kongruentnosti na S , ktoré zachovávajú aj existenčné vlastnosti. (Podrobnejšie: ak $R \in C_1$, $g \in B$ a \bar{x} je trieda vzhľadom k relácii R , obsahujúca prvok x , potom rovnica $g(\bar{x}, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = \bar{x}_{n+1}$ má jediné riešenie \bar{x} .) Ak by sme si všimli len relácie kongruentnosti, patriace do C_1 , úvaha by sa redukovala na prípad, vyšetrowaný A. I. Maľcevom. Mohli by sme totiž považovať priradenie $(x_1, \dots, x_{n+1}) \rightarrow x$ (pričom x je prvok, vyhovujúci rovnici (I)), za novú operáciu F , definovanú na algebrách triedy \mathfrak{A} . Relácie množiny C_1 sú súhlasné s operáciou F ; medzi operáciami $f \in A$ a novozavedenými operáciami F by mohli platiť nejaké identity. Množina C_1 môže mať vlastnosti, ktoré neplatia pre celú množinu C . V práci [2] Maľcev dokázal tvrdenie: ak S je kvazigrupa, potom ľubovoľné dve relácie kongruentnosti z množiny C_1 sú doplňkové. Z predošlej vety 1 plynie, že trieda všetkých kvazigrúp má vlastnosť silnej nedoplňkovosti.

Definícia 3. Nech \mathfrak{A} je trieda existenčných algebier s operáciami $f_i \in A$ a s existenčnými rovnicami $g_i = x_{n+1}$, $g_i \in B$. Nech S je algebraický systém, v ktorom pre niektoré usporiadané skupiny prvkov sú definované operácie $f(x_1, \dots, x_n)$, a v ktorých pre $g_i \in B$ rovnica $g_i(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$ má najviac jedno riešenie. Potom hovoríme, že S je čiastočná algebra triedy \mathfrak{A} . (Množinu S , v ktorej sú nie definované žiadne operácie, považujeme tiež za čiastočnú algebru triedy \mathfrak{A}).

Veta 2. Každá čiastočná algebra triedy existenčných algebier \mathfrak{A} sa dá vnoriť do vhodnej algebry triedy \mathfrak{A} . (Podrobnejšie: ak S_1 je čiastočná algebra triedy \mathfrak{A} , existuje algebra S triedy \mathfrak{A} , pre ktorú platí 1. $S_1 \subset S$, 2. ak pre $x_1, \dots, x_n \in S_1$ je v S_1 definovaná operácia $f_i(x_1, \dots, x_n)$ ($f_i \in A$), potom jej výsledok v S_1 je rovnaký ako výsledok tejto operácie, provedenej v S .)

Princíp dôkazu je rovnaký ako v dôkaze vety 1 v práci [9]. Náčrt dôkazu: uvažujme všetky polynomy, utvorené pomocou operácií, definovaných na algebrách triedy \mathfrak{A} . Ak pre ľubovoľný takýto polynom $F(z_1, \dots, z_n)$ nie je definovaný výsledok operácie $F(x_1, \dots, x_n)$ ($x_1, \dots, x_n \in S_1$), považujeme výraz $F(x_1, \dots, x_n)$ za nový prvok, ktorý pridáme k množine S_1 ; po pridaní všetkých takýchto prvkov dostávame množinu S'_1 . Ak $g_1 \in B$ a ak pre $x_1, \dots, x_{n+1} \in S_1$ rovnica $g_i(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$ nemá riešenie v S_1 (a teda ani v S'_1), pridáme k množine S'_1 nový prvok x , pre ktorý položíme z definície $g_i(x, x_1, \dots, x_n)$ rovné x_{n+1} . Po pridaní všetkých takto získaných prvkov x dostávame množinu $S_2 \supset S'_1$. Analogicky zostrojíme k množine S_2 množinu S_3 atď. Ľahko sa zistí, že na množine $S = \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i$ sú definované všetky operácie $f_i \in A$ a každá rovnica $g_i(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$, $g_i \in B$, $x_1, \dots, x_{n+1} \in S$ má v S jediné riešenie. Teda S vyhovuje podmienkám vety.

Poznámka. Nech na množine S_1 sú nie definované žiadne operácie. Utvoríme príslušnú algebru S podľa dôkazu predošlej vety. Je prirodzené nazvať S voľnou algebrou triedy \mathfrak{A} , vytvorenou množinou generátorov S_1 . Nech α resp. β resp. γ sú kardinálne čísla množiny S_1 , resp. A , resp. S . Z predošlej konštrukcie vyplýva platnosť tvrdení:

1. Ak množiny S_1, A sú najviac spočetné, potom množina S je spočetná.
2. Ak aspoň jedno z kardinálnych čísel α, β je nekonečné, potom $\gamma = \max(\alpha, \beta)$.
3. K ľubovoľnému nekonečnému kardinálnemu číslu $\delta \geq \beta$ existuje algebra S triedy \mathfrak{A} , ktorá má kardinálne číslo δ .

3

Tento odsek sa týka doplnkových relácií kongruentnosti, nesúvisí však priamo s existenčnými algebrami. Hovoríme, že algebra A s množinou operácií $f_\alpha \in F$ má len jednoprvkové operácie, ak pre všetky operácie $f_\alpha \in F$ platí $n(\alpha) = 1$. V knihe [1] vyslovuje G. Birkhoff nasledujúce tvrdenie (v inej slovnej formulácii):

(B) Ak algebra A má len jednoprvkové operácie, potom všetky jej relácie kongruentnosti sú doplnkové vtedy a len vtedy, keď algebra A má najviac tri relácie kongruentnosti:

Tvrdenie „vtedy“ je zrejmé (ak má algebra najviac tri relácie kongruentnosti,

potom má najviac jednu netriviálnu³⁾ reláciu kongruentnosti, z čoho plynie tvrdenie „vtedy“).

Tvrdenie „len vtedy“ je nesprávne. Existuje nekonečne mnoho algebier, ktoré majú len jednoprvkové operácie, ktorých všetky relácie kongruentnosti sú doplnkové a ktoré majú viac ako tri relácie kongruentnosti. Dôkaz vyplýva z nasledujúcich jednoduchých príkladov.

Príklad 1. Nech G je grupa, ktorá má viac ako tri relácie kongruentnosti. Uvažujme algebru A , definovanú takto: prvky algebry A sú tie isté ako prvky grupy G ; množina operácií $F = \{f_a, g_a\}$ na algebre A je tvorená všetkými operáciami tvaru

$$f_a(x) = ax, \quad g_a(x) = xa,$$

kde výrazy vpravo sú súčiny v grupe G a a je ľubovoľný prvok grupy G . Zrejme každá relácia R , ktorá je reláciou kongruentnosti na grupe G , je zároveň reláciou kongruentnosti na algebre A , a opačne. Algebra A má viac ako tri relácie kongruentnosti, všetky relácie kongruentnosti doplnkové a len jednoprvkové operácie.

V predošlom príklade algebra A je zrejme len „iným vyjadrením“ grupy G . Obecnjšie, je zjavné, že n -árna operácia $f(x_1, \dots, x_n)$ sa dá „vyjadriť“ pomocou systému (môže sa stať, že nekonečného) jednoprvkových operácií $f(x, a_1, \dots, \dots, a_{n-1})$, atď., kde a_i sú pevné prvky algebry A . Uvedený príklad nás nabáda zosilniť predpoklady v tvrdení (B) a vylúčiť možnosť „iného vyjadrenia“ tým, že žiadame, aby algebra A mala len jedinú operáciu f , a aby táto operácia bola jednoprvková. Takto zúžené tvrdenie (B) by však bolo tiež nesprávne, ako ukazuje nasledujúci príklad:

Príklad 2. Nech algebra A má 4 prvky, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, a jednoprvkovú operáciu f , pre ktorú platí $f(1) = 4, f(2) = 3, f(3) = 2, f(4) = 1$. Netriviálne relácie kongruentnosti na A sú dané rozkladmi $\{(1, 2), (3, 4)\}, \{(1, 3), (2, 4)\}, \{(1, 4), (2, 3)\}$. Ľahko sa preverí, že všetky relácie kongruentnosti sú navzájom doplnkové.

LITERATÚRA

- [1] *G. Birkhoff*: Lattice theory, New York, 1948 (Теория структур, Москва, 1952).
- [2] *А. И. Мальцев*: К общей теории алгебраических систем, Мат: сборник 35 (77) (1954), 3—20.
- [3] *А. Г. Курош*: Теория групп, Москва, 1953.
- [4] *P. Dubreil*: Algèbre, Paris, 1946.
- [5] *O. Borůvka*: O rozkladech množin, Rozpravy II. tř. České Akad., roč. 53 (1943), č. 23.
- [6] *O. Ore*: Theory of equivalence relations, Duke Math. J. 9 (1942), 573—627.
- [7] *G. Travisan*: Construzione di quasigruppi con relazioni di congruenza non permutabili, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 22 (1953), 11—22.

³⁾ t. j. rôznu od relácie R_m , v ktorej $x R y$ vtedy a len vtedy, keď $x = y$, a zároveň rôznu od relácie R_M , v ktorej $x R y$ pre každú dvojicu $x, y \in A$.

- [8] *Van Ši-Cian*: Poznámky o doplňkovosti relací kongruentnosti, *Šusjue Sjuebao* 3 (1953), č. 2, 133—141 (čínsky, ang. résumé), (Реферативный журнал 1 (1954), 5477).
 [9] *G. E. Bates - F. Kiokemeister*: A note on homomorphic mappings of quasigroups into multiplicative systems, *Proc. Amer. Math. Soc.* (1948), 1180—1184.

Резюме

О Э. АЛГЕБРАХ

Ян Якубик (Ján Jakubík), Кошице.

(Поступило в редакцию 29/I 1955)

Выражения алгебра, отношение конгруэнтности, примитивный класс алгебр, операция, полином имеют в этой работе тот же смысл, что и в работах [1], [2].

Пусть \mathfrak{A} — класс всех алгебр, имеющих следующие свойства:

1. на каждой из алгебр класса \mathfrak{A} определены основные операции $f_i(x_1, \dots, x_n)$, $f_i \in A$, для различных операций f_i могут быть различными и соответствующие числа n , $n = n(i)$, множество $\{n(i)\}$ ограничено, и существует по крайней мере одна операция $f_{i_0} \in A$, для которой $n(i_0) \geq 2$;

2. дано множество полиномов $g_j(z, z_1, \dots, z_n)$, $g_j \in B$, построенных при помощи основных операций $f_i \in A$ так, чтобы имело место следующее утверждение: если $g \in B$ и если S — произвольная алгебра класса \mathfrak{A} , то для каждой упорядоченной группы элементов $x_1, x_2, \dots, x_{n+1} \in S$ существует один единственный элемент $x \in S$ такой, что $g(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$. Тогда о классе \mathfrak{A} говорим, что это класс э. алгебр.

Пусть \mathfrak{A} — класс э. алгебр. Алгебраическую систему S , в которой определены для некоторых (не обязательно для всех) упорядоченных групп элементов x_1, \dots, x_n операции $f_i(x_1, \dots, x_n)$, $f_i \in A$ и в которой уравнение $g(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$ для $g \in B$ имеет самое больше одно решение, называем частичной алгеброй класса э. алгебр \mathfrak{A} .

Скажем, что класс алгебр \mathfrak{A} обладает свойством (**N**) (сильной недополнотельностью), если в нем содержится алгебра S , удовлетворяющая следующим условиям: для любого элемента $x \in S$ существуют отношения конгруэнтности R и R' на S , и существует бесконечно много пар элементов $y, z \in S$ таких, что $xRyR'z$, и в S не существует элемента u , который удовлетворял бы соотношению $xR'uRz$.

Скажем, что класс \mathfrak{A} обладает свойством (**A**), если для любой алгебры S , принадлежащей классу \mathfrak{A} , справедливо, что каждое отношение конгруэнтности на S определено однозначно любым из своих классов. Класс алгебр обладает свойством (**A'**), если не обладает свойством (**A**).

Теорема 1. *Всякий класс \mathfrak{A} алгебр обладает свойствами (N) и (A').*

Теорема 2. *Всякую частичную алгебру класса \mathfrak{A} алгебр \mathfrak{A} можно погрузить в алгебру класса \mathfrak{A} .*

Следствие: для любого кардинального числа α существует в классе \mathfrak{A} алгебра S , кардинальное число которой $\geq \alpha$.

Набросок доказательства теоремы 1. В классе \mathfrak{A} алгебр \mathfrak{A} выберем алгебру S , в которой находятся по крайней мере три элемента. Пусть S' — множество всех функций $h(n)$, которые определены на множестве $N = \{0, 1, 2, \dots, -1, -2, \dots\}$ и функциональные значения которых принадлежат S . На S' определим операции $f_i \in A$ уравнением

$$f_i(h_1, \dots, h_m)(n) = f_i(h_1(n+1), \dots, h_m(n+1)).$$

Тогда S' есть алгебра класса \mathfrak{A} . Пусть $h_1 \in S'$. Возьмем произвольное число $n_0 \in N$ и найдем $h_2, h_3 \in S'$ так, чтобы 1. элементы $h_i(n_0)$, $i = 1, 2, 3$ были взаимно различными, 2. для $n < n_0$ $h_1(n) = h_2(n) = h_3(n)$. Для $h, h' \in S'$ положим $h R_1 h'$ ($h R_2 h'$) тогда и только тогда, если 1. для $n < n_0$ будет $h(n) = h'(n)$, 2. элементы $h(n_0), h'(n_0)$ либо равны между собой, либо один из них равен $h_1(n_0)$ ($h_2(n_0)$), а второй — $h_3(n_0)$. Очевидно, R_1, R_2 являются отношениями конгруэнтности на S' , и выполняется условие, высказанное в свойстве (N). Для доказательства того, что имеет место свойство (A), достаточно рассмотреть отношение конгруэнтности R_3 , в котором $h R_3 h'$ тогда и только тогда, если для $n < n_0$ $h(n) = h'(n)$, и сравнить его с отношением конгруэнтности R_1 .

Теорема 1. является обобщением результата Г. Тревисана [7], который решил частично проблему Биркгоффа ([1], проблема 31). Построение, примененное в доказательстве теоремы 1 основательно проще и короче построения Тревисана. Что касается теоремы 2, то ход доказательства здесь совпадает с ходом доказательства теоремы 1 в работе [9].

Наконец, на простых примерах показана несправедливость одного утверждения Г. Биркгоффа об отношениях конгруэнтности на алгебрах с одинарными операциями ([1], стр. 131, упражнение 3).

Summary

ON THE EXISTENCE ALGEBRAS

JÁN JAKUBÍK, Košice.

(Received January 29, 1955.)

The concepts algebra, congruence relation on an algebra, primitive class of algebras, operation, and polynomial are used in the sense of [1] and [2].

Let \mathfrak{A} be the class of all algebras with the following properties:

1. in each algebra S of the class \mathfrak{A} the fundamental operations $f_i(x_1, \dots, x_n)$, $f_i \in A$ are defined; for different i the numbers n need not be equal, $n = n(i)$, the set of all $n(i)$ is bounded and there exists $f_{i_0} \in A$ such that $n(i_0) \geq \geq 2$.

2. there is given a set of polynomials $g_j(z, z_1, \dots, z_n)$, $g_j \in B$ constructed by means of the fundamental operations $f_i \in A$ such that for $g \in B$ each algebra S of the class \mathfrak{A} and every finite sequences $x_1, \dots, x_{n+1} \in S$ there exists a uniquely determined element $x \in S$ which satisfies the equation $g(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$. We say that \mathfrak{A} is a class of existence algebras.

Let \mathfrak{A} be a class of existence algebras. If on the set S for some (not necessarily all) finite sequences $x_1, \dots, x_n \in S$ the operations $f_i(x_1, \dots, x_n)$, $f_i \in A$ are defined such that the equation $g_j(x, x_1, \dots, x_n) = x_{n+1}$ has (for fixed $x_1, \dots, x_{n+1} \in S$) not more than one solution $x \in S$, S is a partial algebra of the class \mathfrak{A} .

A class of algebras \mathfrak{A} has the property **(N)** (strong non-permutability) if there exists an algebra S in \mathfrak{A} such that for each $x \in S$ there exist congruence relations R, R' on S and an infinity of pairs of elements $y, z \in S$ for which $x R y R' z$ and there does not exist $u \in S$ with the property $x R' u R y$.

A class of algebras \mathfrak{A} has the property **(A)**, if congruence relations R on each algebra S of the class \mathfrak{A} are uniquely determined by each class of S/R . A class \mathfrak{A} has the property **(A')**, if it has not the property **(A)**.

Theorem 1. *Every class of existence algebras has the properties **(N)** and **(A')**.*

Theorem 2. *Each partial algebra of the class \mathfrak{A} of existence algebras can be imbedded in an algebra of the class \mathfrak{A} .*

Corollary: if α is a cardinal number and \mathfrak{A} a class of existence algebras, there exists in \mathfrak{A} an algebra S the cardinal number of which is $\geq \alpha$.

Sketch of proof of theorem 1. Let \mathfrak{A} be a class of existence algebras. Let S be an algebra with more than two elements which is contained in \mathfrak{A} . Let S' be the set of all functions $h(n)$, where $n = 0, 1, 2, \dots, -1, -2, -3, \dots$ and $h(n) \in S$. For $f_i \in A$, $h_j \in S'$ we define $f_i(h_1, \dots, h_m)(n) = f_i(h_1(n+1), \dots, h_m(n+1))$. Then, S' is an algebra of the class \mathfrak{A} . Let h_1 be a fixed (but arbitrary) element of S' , n_0 a fixed (but arbitrary) integer. We find $h_2, h_3 \in S'$ such that 1. no two of the elements $h_1(n_0), h_2(n_0), h_3(n_0)$ are equal, 2. $n < n_0 \Rightarrow h_1(n_0) = h_2(n_0) = h_3(n_0)$. For $h, h' \in S'$ we put $h R_1 h'$ ($h R_2 h'$) if 1. the elements $h(n_0), h'(n_0)$ are equal or one of them is equal to $h_1(n_0)$ ($h_2(n_0)$) and the second is equal to $h_3(n_0)$ 2. $n < n_0 \Rightarrow h(n) = h'(n)$. Clearly, R_1, R_2 are congruence relations on S' and R_1, R_2 are not permutable. This proves the property **(N)**. To prove the property **(A')** it is sufficient to consider the congruence relation R_3 on S' in which $h R_3 h'$ if and only if $n < n_0 \Rightarrow h(n) = h'(n)$ and to relate it with the congruence relation R_1 .

Theorem 1 is a generalization of a theorem of G. TREVISIAN ([7]) solving a problem of G. BIRKHOFF ([1], problem 31), his construction being rather complicated. The proof of theorem 2 does not differ from the method used in [9].

Finally, it is proved by simple examples that a statement contained in [1] (p. 87, exercise 3) on algebras with unary operations is not true.