

Jiří Sedláček

O soustavách úhlopříček v konvexním n -úhelníku

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 81 (1956), No. 2, 157--161

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117186>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1956

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O SOUSTAVÁCH ÚHLOPŘÍČEK V KONVEXNÍM n -ÚHELNÍKU

JIŘÍ SEDLÁČEK, Praha.

(Došlo dne 28. ledna 1955.)

DT: 513.34
: 513.82

Předpokládáme-li, že žádné tři úhlopříčky konvexního n -úhelníka ($n > 3$) nemají společný průsečík, lze množinu úhlopříček, již je určeno právě k průsečíků úhlopříček a přidáním každé další úhlopříčky se tento počet průsečíků zvětší, nazvat soustavou úhlopříček k -tého stupně. Soustavou nultého stupně je určen rozklad daného n -úhelníka na trojúhelníky. Počet těchto rozkladů určil RODRIGUES [1] — viz vzorec (1). Akademik E. ČECH položil otázku, zda pro malé k lze počet soustav k -tého stupně vyjádřit stejně jednoduchým způsobem, jak se to pro $k = 0$ podařilo Rodriguesovi. V tomto článku — kromě speciálních výsledků (věta 2) — je ukázáno, že pro $k = 1$ a 2 je odpověď kladná (věta 3 a 4). Závěrem jsou položeny dvě další otázky týkající se soustav úhlopříček.

V rovině buď dán konvexní n -úhelník ($n > 3$) $A_1A_2A_3 \dots A_n$, jehož žádné tři úhlopříčky nemají společný vnitřní bod. Označme M množinu všech úhlopříček daného n -úhelníka a pro $X \subset M$ nazveme *průsečíkem množiny X průsečík dvou prvků množiny X* . Buď $0 \leq k \leq \binom{n}{4}$, k celé; existuje-li množina $S_k^{(n)}$, která má tyto vlastnosti:

1. $S_k^{(n)} \subset M$, 2. $S_k^{(n)}$ má právě k průsečíků, 3. je-li $S_k^{(n)} \subset Y \subset M$, $S_k^{(n)} \neq Y$, pak počet průsečíků množiny Y je aspoň $k + 1$,

potom $S_k^{(n)}$ nazveme *soustavou k -tého stupně*. Vrchol n -úhelníka, který neleží na žádné úhlopříčce soustavy $S_k^{(n)}$, nazveme *volným vrcholem této soustavy*.

Je zřejmá existence soustavy $S_0^{(n)}$. Místo $S_0^{(n)}$ můžeme studovat též jistý rozklad $R_0^{(n)}$ daného n -úhelníka na trojúhelníky. Z úvahy o součtu vnitřních úhlů v n -úhelníku plyne, že $R_0^{(n)}$ má $n - 2$ prvků.

O soustavách $S_0^{(n)}$ platí věta:

Věta 1. *Buď a_n počet soustav stupně 0. Pak*

$$a_n = \frac{1}{n-1} \binom{2n-4}{n-2}. \quad (1)$$

Důkaz. Strana A_1A_2 patří v každém rozkladu $R_0^{(n)}$ právě jednomu trojúhelníku. Budiž to trojúhelník $A_1A_2A_j$ ($3 \leq j \leq n$). Označme $a_2 = a_3 = 1$ a uvažme dvě skupiny vrcholů: první A_2, A_3, \dots, A_j , druhou $A_1, A_j, A_{j+1}, \dots, A_n$. Počet rozkladů $R_0^{(n)}$, ve kterých existuje trojúhelník $A_1A_2A_j$, je zřejmě $a_{j-1} \cdot a_{n-j+2}$. Platí tedy rekurentně

$$a_n = \sum_{i=2}^{n-1} a_i a_{n+1-i} \quad (2)$$

a methodou vytvořujících funkcí najdeme výsledek (1).

Při $n \geq 6$ můžeme udat rozklady $R_0^{(n)}$, ve kterých existuje *úhlopříčkový trojúhelník*. Tak nazveme trojúhelník, jehož všechny strany jsou úhlopříčky n -úhelníka. O počtu takovýchto rozkladů (resp. soustav) platí

Věta 2. *Bud' b_n počet rozkladů $R_0^{(n)}$, v nichž neexistuje úhlopříčkový trojúhelník. Pak $b_n = n \cdot 2^{n-5}$.*

Důkaz. Příklad $n = 4$ je zřejmý; buď tedy $n \geq 5$. Dva sousední vrcholy nemohou být zřejmě volné v téže soustavě. Snadno určíme, že ke každé soustavě, která vytváří $R_0^{(n)}$ bez úhlopříčkových trojúhelníků, přísluší právě dva volné vrcholy n -úhelníka. Indukcí podle n nejdříve dokážeme, že počet rozkladů $R_0^{(n)}$, které mají volné právě vrcholy A_1, A_j (kde $3 \leq j \leq n-1$), je $\binom{n-4}{j-3}$.

Pro $n = 5$ je toto tvrzení zřejmě správné. Ať tedy $n > 5$ a předpokládejme, že tvrzení je správné pro m -úhelník ($5 \leq m \leq n-1$). Pro $j = 3, 4, n-2, n-1$ se snadno vidí, že je tvrzení správné i pro n -úhelník, takže zbývá dokázat tvrzení pro j , pro něž $4 < j < n-2$. V tomto případě roztrídíme rozklady na dva (disjunktní) typy: Rozklad prvního (resp. druhého) typu je vytvořen pomocí úhlopříčky A_2A_{n-1} (resp. A_3A_n). Počet rozkladů prvního typu je roven počtu rozkladů $(n-2)$ -úhelníka $A_2A_3A_4 \dots A_{n-1}$ s volnými vrcholy A_{n-1}, A_j nebo s volnými vrcholy A_2, A_j — a těch je podle indukčního předpokladu

$$\binom{n-6}{j-3} + \binom{n-6}{j-4} = \binom{n-5}{j-3}.$$

Počet rozkladů druhého typu je roven počtu rozkladů $(n-2)$ -úhelníka $A_3A_4A_5 \dots A_{n-1}A_n$ s volnými vrcholy A_n, A_j nebo s volnými vrcholy A_3, A_j — a těch je

$$\binom{n-6}{j-4} + \binom{n-6}{j-5} = \binom{n-5}{j-4}.$$

Úhrnem počet rozkladů obou typů je

$$\binom{n-5}{j-3} + \binom{n-5}{j-4} = \binom{n-4}{j-3}, \text{ c. b. d.}$$

Platí tedy

$$b_n = \frac{n}{2} \sum_{j=3}^{n-1} \binom{n-4}{j-3} = n \cdot 2^{n-5}$$

a důkaz je podán.

Každá soustava $S_0^{(n)}$ má zřejmě $n - 3$ úhlopříček. Odtud vyplývá

Věta 3. Počet soustav prvního stupně je $c_n = \frac{n-3}{2} a_n$.

Důkaz je jasný.

Soustavy druhého stupně rozdělíme na tři kategorie.

1. kategorie: Oba průsečíky soustavy leží na téže úhlopříčce.

2. kategorie: Existují vrcholy A_i, A_{i_1}, A_{i_2} tak, že jeden průsečík soustavy leží na $A_i A_{i_1}$ a druhý na $A_i A_{i_2}$ — a soustava není 1. kategorie.

3. kategorie: Ostatní.

Soustavy 3. kategorie existují jen pro $n \geq 8$. O soustavách $S_2^{(n)}$ dokážeme větu:*)

Věta 4. a) Počet soustav 1. kategorie je $d_n = \frac{(13n-45)(n-4)}{2(n-1)} a_{n-1}$,

b) počet soustav 2. kategorie je $e_n = \frac{11n-45}{n+1} \binom{2n-7}{n-6}$,

c) počet soustav 3. kategorie je

$$f_n = 3n \sum_{i=4}^{n-4} \frac{1}{i-1} \binom{2i-6}{i-4} \binom{2n-2i-2}{n-i-4}.$$

Důkaz. a) Příklad $n = 4$ je zřejmý. Při $n \geq 5$ určíme počet soustav, jejichž průsečíky leží na úhlopříčkách $A_1 A_r, A_p A_q, A_u A_v$, kde

$$2 \leq p \leq u < r < v \leq q \leq n, \quad |p-u| + |q-v| > 0.$$

Počet soustav, u nichž je $p < u, v < q$ (takové existují právě pro $n \geq 6$), určíme úvahou o součinu

$$\pi = a_p a_{u-p+1} a_{r-u+1} a_{v-r+1} a_{q-v+1} a_{n-q+2}.$$

Pomocí vzorce (2) určíme

$$\sum_{q=6}^n \sum_{v=5}^{q-1} \sum_{r=4}^{v-1} \sum_{u=3}^{r-1} \sum_{p=2}^{u-1} \pi = a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1}.$$

Je totiž

$$\sum_{p=2}^{u-1} a_p a_{u-p+1} = a_u, \quad \sum_{u=3}^{r-1} a_u a_{r-u+1} = a_r - a_{r-1},$$

$$\sum_{r=4}^{v-1} (a_r - a_{r-1}) a_{v-r+1} = a_v - 2a_{v-1},$$

*) Pro $k < 0$ klademe $\binom{h}{k} = 0$.

$$\sum_{v=5}^{q-1} (a_v - 2a_{v-1}) a_{q-v+1} = a_q - 3a_{q-1} + a_{q-2},$$

$$\sum_{q=6}^n (a_q - 3a_{q-1} + a_{q-2}) a_{n-q+2} = a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1}.$$

Počet soustav, u nichž je $p = u$, určíme úvahou o součinu

$$\pi' = a_p a_{r-p+1} \cdot a_{v-r+1} \cdot a_{q-v+1} \cdot a_{n-q+2}.$$

Pomocí vzorce (2) analogicky jako prve vypočteme

$$\sum_{q=5}^n \sum_{v=4}^{q-1} \sum_{r=3}^{v-1} \sum_{p=2}^{r-1} \pi' = a_{n+1} - 3a_n + a_{n-1}.$$

Stejný je též počet soustav, u nichž je $v = q$. Platí tedy $d_n = \frac{n}{2} (3a_{n+1} - 10a_n + 5a_{n-1})$ čili po úpravě $d_n = \frac{(13n - 45)(n - 4)}{2(n - 1)} a_{n-1}$.

b) Případy $n = 4$, $n = 5$ jsou zřejmé. Při $n \geq 6$ určíme počet soustav, jejichž průsečíky leží na úhlopříčkách A_1A_u , A_pA_r , A_wA_q , A_1A_v , kde

$$2 \leq p < u < r \leq w < v < q \leq n.$$

Tento počet je

$$\pi'' = a_p a_{u-p+1} \cdot a_{r-u+1} \cdot a_{w-r+2} \cdot a_{v-w+1} a_{q-v+1} \cdot a_{n-q+2}.$$

Pro $w = r$ provedeme výpočet analogicky jako sub a).

$$\sum_{q=6}^n \sum_{v=5}^{q-1} \sum_{r=4}^{v-1} \sum_{u=3}^{r-1} \sum_{p=2}^{u-1} \pi'' = a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1}.$$

Pro $w > r$ máme

$$\sum_{u=3}^{r-1} \sum_{p=2}^{u-1} a_p a_{u-p+1} a_{r-u+1} = a_r - a_{r-1},$$

$$\sum_{r=4}^{w-1} (a_r - a_{r-1}) a_{w-r+2} = a_{w+1} - 3a_w + a_{w-1},$$

$$\sum_{w=5}^{v-1} (a_{w+1} - 3a_w + a_{w-1}) a_{v-w+1} = a_{v+1} - 4a_v + 3a_{v-1},$$

$$\sum_{v=6}^{q-1} (a_{v+1} - 4a_v + 3a_{v-1}) a_{q-v+1} = a_{q+1} - 5a_q + 6a_{q-1} - a_{q-2},$$

$$\sum_{q=7}^n (a_{q+1} - 5a_q + 6a_{q-1} - a_{q-2}) a_{n-q+2} = a_{n+2} - 6a_{n+1} + 10a_n - 4a_{n-1}.$$

Je tedy

$$e_n = \frac{n}{2} (a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1}) + n (a_{n+2} - 6a_{n+1} + 10a_n - 4a_{n-1}),$$

což po úpravě dává

$$e_n = \frac{11n - 45}{n + 1} \binom{2n - 7}{n - 6}.$$

c) Můžeme dokázat, že v n -úhelníku počet soustav $S_1^{(n)}$ takových, že průsečík soustavy leží na úhlopříčkách vycházejících z vrcholů A_1, A_n , je dán číslem $\frac{3}{n-1} \binom{2n-6}{n-4}$. Podobně dokážeme, že počet soustav $S_1^{(n)}$ takových, že průsečík soustavy neleží na žádné úhlopříčce vycházející z vrcholů A_1, A_n , je dán číslem $2 \binom{2n-6}{n-6}$. Důkazy obou lemmat přenechávám čtenáři.

Rozdělme nyní n -úhelník úhlopříčkou A_1A_r ($4 \leq r \leq n-1$) na r -úhelník a $(n-r+2)$ -úhelník a v každém sestrojme soustavu 1. stupně tak, aby sjednocení obou soustav (spolu s úhlopříčkou A_1A_r) byla soustava 2. stupně 3. kategorie. Položíme-li

$$P_r^{(n)} = 2 \binom{2(n-r+2)-6}{(n-r+2)-6} \cdot \frac{3}{r-1} \binom{2r-6}{r-4},$$

$$Q_r^{(n)} = 2 \binom{2r-6}{r-6} \cdot \frac{3}{(n-r+2)-1} \binom{2(n-r+2)-6}{(n-r+2)-4},$$

vidíme, že počet způsobů, jimiž tuto konstrukci můžeme provést, je

$$\sigma_n = \sum_{r=4}^{n-2} (P_r^{(n)} + Q_r^{(n)}).$$

Ze vztahu $Q_r^{(n)} = P_{n-r+2}^{(n)}$ plyne

$$\sigma_n = 2 \sum_{r=4}^{n-4} P_r^{(n)} = 12 \sum_{r=4}^{n-4} \frac{1}{r-1} \binom{2r-6}{r-4} \cdot \binom{2n-2r-2}{n-r-4}$$

a tedy $f_n = \frac{1}{4}n\sigma_n$, c. b. d.

Závěrem uvádíme ještě dvě otevřené otázky:

- I. Pro která k existuje (při daném n) soustava $S_k^{(n)}$?
- II. Odhadněte počet úhlopříček v soustavě $S_k^{(n)}$.

LITERATURA

- [1] *O. Rodrigues*: Sur le nombre de manières d'effectuer un produit de n facteurs. Journal de mathématiques pures et appliquées III (1838), str. 549.
- [2] *E. Netto*: Lehrbuch der Combinatorik, 2. vydání z r. 1927 doplnili *V. Brun a Th. Skolem*.