

# Časopis pro pěstování matematiky

---

Ladislav Drs

O základní větě centrální axonometrie

*Časopis pro pěstování matematiky*, Vol. 82 (1957), No. 2, 165--174

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117251>

## Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1957

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

## O ZÁKLADNÍ VĚTĚ CENTRÁLNÍ AXONOMETRIE

LADISLAV DRS, Praha.

(Došlo dne 12. března 1956.)

DT: 515.69

V článku je dokázána první fundamentální věta centrální axonometrie a jsou vyšetřeny některé konstruktivní důsledky, týkající se vhodné volby elementů určujících axonometrii.

Věty obsažené v této práci mají pro centrální axonometrii podobný význam jako věta Pohlkeova pro rovnoběžnou axonometrii. Z těchto vět jsou odvozeny konstrukce pro volbu elementů určujících centrální axonometrii. Úvahy jsou vázány na reálný, resp. komplexní eukleidovský prostor rozšířený o nevlastní rovinu.

1. V tomto odstavci bude dokázána základní věta centrální axonometrie. Předmětem našich úvah bude průmět pravoúhlé souřadnicové soustavy  $(O', A', B', C')$ , (kde platí  $O'A' \perp O'B' \perp O'C' \perp O'A'$ ,  $\overline{O'A'} = \overline{O'B'} = \overline{O'C'} \neq 0^1$ ). Nevlastní body přímek  $O'A'$ ,  $O'B'$ ,  $O'C'$  označíme  $A'_u, B'_u, C'_u$ . Průměty označíme stejným písmenem jako útvary v prostoru bez připojené čárky.

**Definice 1a.** Body  $O, A, B, C, A_u, B_u, C_u$  ve vlastní rovině nazveme  $\delta$ -konfigurací, když platí: I.  $A \neq A_u, B \neq B_u, C \neq C_u$ .

II. Přímký  $AA_u, BB_u, CC_u$  procházejí bodem  $O$  různým od ostatních šesti bodů.

III. Body  $A, B, C$  neleží současně na přímce.

IV. Body  $A_u, B_u, C_u$  neleží současně na přímce.

**Definice 1b.** Jsou-li v dané  $\delta$ -konfiguraci body  $O, A, B, C, A_u, B_u, C_u$  po řadě středovými průměty bodů  $O', A', B', C', A'_u, B'_u, C'_u$  souřadnicové soustavy  $(O', A', B', C')$  z bodu  $S$ , nazveme ji  $\delta$ -konfigurací typu  $S$ .

Dodatek k definici 1. Trojúhelníky<sup>2)</sup>  $ABC; A_u B_u C_u$  jsou perspektivní (podle Desarguesovy věty). Osou perspektivy je přímka  $o$ .

<sup>1)</sup> Pruhem označujeme vzdálenost.

<sup>2)</sup> „Trojúhelník“ může mít jeden nebo dva nevlastní body.

Dále označíme  $H_u$  harmonický pól přímky  $o$  vzhledem k trojúhelníku  $A_u B_u C_u$  a  $k_u$  kuželosečku určenou polárním trojúhelníkem  $A_u B_u C_u$  a pólem  $H_u$  s polárou  $o$ .

Poznámka 1. Z definice 1b je patrný geometrický význam  $\delta$ -konfigurace typu  $S$ . Definicí 1a vylučujeme některé průměty souřadnicové soustavy:

1.  $S$  neleží na žádné z přímek  $O'A'$ ,  $O'B'$ ,  $O'C'$ . Kdyby na příklad platilo  $S \in O'A'$ , pak by splývaly body  $A$ ,  $A_u$ .

2.  $S$  neleží v rovině  $A'B'C'$ . Kdyby  $S \in (A'B'C')$ , pak by průměty  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ležely na přímce.

3.  $S$  není nevlastní. Kdyby byl nevlastní, ležely by body  $A_u$ ,  $B_u$ ,  $C_u$  na nevlastní přímce.

Případ, kdy neplatí 1, by bylo nutno vyšetřovati zvlášť, ale nemá praktický význam. Případy kdy neplatí 2, 3, vyšetřuje V. HAVEL v práci [4]. Splňuje-li konfigurace z definice 1a jen podmínky I, II, III, získáme  $d_1$ -konfiguraci, platí-li jen I, II, získáme  $d_2$ -konfiguraci definovanou v této práci [4].

Uvedme bez důkazu pomocnou větu a některé pojmy známé z projektivní geometrie.

**Pomocná věta.** *Polarita II v rovině  $\alpha$  se promítá ze středu  $S \notin \alpha$  jako pravoúhlá prostorová polarita II' tehdy a jen tehdy, když základní kuželosečka polarity je imaginární kružnice a když bod  $S$  je Laguerrov bod této kružnice.*

Pravoúhlá polarita II' má za svou řídicí kvadriku minimální kuželovou plochu. Průnik této plochy s rovinou  $\alpha$  je imaginární kružnice, (reálný) vrchol kuželové plochy je od roviny  $\alpha$  vzdálen o absolutní hodnotu poloměru této kružnice a promítá se kolmo do roviny  $\alpha$  do jejího středu. Vrchol nazýváme Laguerrovým bodem této kružnice.

Nyní již můžeme vyslovit základní větu centrální axonometrie.

**Věta 1.**  *$\delta$ -konfigurace je typu  $S$  právě tehdy, když kuželosečka  $k_u$  je imaginární kružnice.*

Důkaz. Nechť  $\delta$ -konfigurace je centrálním průmětem souřadnicové soustavy  $(O', A', B', C')$  ze středu  $S$ . Máme dokázat, že  $k_u$  je imaginární kružnice. Přímka  $o$  je průmět nevlastní přímky roviny  $A'B'C'$ . Budiž  $T'$  těžiště rovnostranného trojúhelníka  $A'B'C'$  (a zároveň tedy jeho orthocentrum). Je zřejmé, že průmět  $T$  bodu  $T'$  je harmonický pól přímky  $o$  vzhledem k trojúhelníku  $ABC$  a dále, že průmět  $T_u$  nevlastního bodu přímky  $O'T'$  je harmonický pól přímky  $o$  vzhledem k trojúhelníku  $A_u B_u C_u$ , čili  $T_u = H_u$ . Uvažujme prostorovou polaritu II', která vznikne promítnutím rovinné polarity II o základní kuželosečce  $k_u$  z bodu  $S$ . Pak platí  $SA_u \parallel O'A'$ ,  $SB_u \parallel O'B'$ ,  $SC_u \parallel O'C'$ ; tři páry polárně sdružených elementů  $SA_u$ ,  $SB_u C_u$ ;  $SB_u$ ,  $SA_u C_u$ ;  $SC_u$ ,  $SA_u B_u$  jsou navzájem kolmé. Dále platí  $SH_u \parallel O'T'$ ,  $So \parallel A'B'C'$ . Protože je  $O'T' \perp A'B'C'$ , je také  $SH_u \perp So$  a v polaritě existuje čtvrtý pár kolmých polárně

sdužených elementů. Polarita  $II'$  je pravoúhlá a kuželosečka  $k_u$  je imaginární kružnice. Důkaz nutné podmínky je proveden.

Nechť pro danou  $\delta$ -konfiguraci je kuželosečka  $k_u$  imaginární kružnicí. Máme dokázat, že konfiguraci lze pokládat za centrální průmět jisté souřadnicové soustavy  $(O', A', B', C')$ . Zvolme za střed promítání  $S$  Laguerrov bod kružnice  $k_u$ . Rovinná polarita  $II$  přechází spojením s bodem  $S$  v pravoúhlou prostorovou polaritu  $II'$ . Zvolme na přímce  $SO$  vlastní bod  $O' \neq S$ . Sestrojme přímky  $O' \in x' \parallel SA_u$ ,  $O' \in y' \parallel SB_u$ ,  $O' \in z' \parallel SC_u$ . Ty jsou navzájem kolmé, neboť páry  $A_u, B_u C_u$ ;  $B_u, A_u C_u$ ;  $C_u, A_u B_u$  jsou sdužené v polaritě  $II$ . Budiž  $A' = x' \cap SA$ ,  $B' = y' \cap SB$ ,  $C' = z' \cap SC$ . Zbývá dokázat rovnice  $\overline{O'A'} = \overline{O'B'} = \overline{O'C'} \neq 0$ . Nechť je  $H$  harmonický pól přímky  $o$  k trojúhelníku  $ABC$ . Pak je  $H_u$  průmět nevlastního bodu přímky  $O'H'$ , to jest  $O'H' \parallel S'H_u$  a  $H' = O'H \cap A'B'C'$  je těžištěm trojúhelníka  $A'B'C'$ . Přímka  $H_u C_u$  (průmět nevlastní přímky roviny  $O'H'C'$ ) a průmět  $o \cap AB = o \cap A_u B_u$  nevlastního bodu přímky  $A'B'$  jsou polárně sdužené v  $II$ , neboť k bodu  $H_u$  je polárně sdužena přímka  $o$  a k bodu  $C_u$  přímka  $A_u B_u$ . Proto platí  $C'H' \perp A'B'$  a podobně  $A'H' \perp B'C'$ ,  $B'H' \perp A'C'$ . Bod  $H'$  je tedy zároveň průsečíkem výšek a proto  $\overline{A'B'} = \overline{A'C'} = \overline{B'C'} \neq 0$  (nerovnost platí proto, že body  $A, B, C$  jsou různé). Z těchto rovnic a ze vzájemné kolmosti přímek  $O'A', O'B', O'C'$  již plyne  $\overline{O'A'} = \overline{O'B'} = \overline{O'C'} \neq 0$ . Důkaz postačitelé podmínky je proveden a věta 1 je tím dokázána.

Poznámka 2. Tuto větu dokázal E. KRUPPA v práci [5]. Jeho důkaz zjednodušil N. M. BESKIN [2]. S ním se důkaz zde provedený v podstatě shoduje.

2. Vyšetříme podmínky, které splňuje pár  $o, H_u$  v  $\delta$ -konfiguraci typu  $S$ .

Úmluva. Místo imaginární kružnice  $k_u$  budeme dále uvažovat kružnici  $k$ , která kružnici  $k_u$  reálně zastupuje (t. j. kružnici, pro niž je trojúhelník  $A_u B_u C_u$  antipolárním). Podle věty 1 je v  $\delta$ -konfiguraci typu  $S$  pár  $o, H_u$  vzhledem ke kružnici  $k$  antipolárně sdužen.

Dále vyjádříme podrobněji podmínky nutné k tomu, aby daná  $\delta$ -konfigurace mohla být typu  $S$ .

a) Nechť body  $A_u, B_u, C_u$  dané  $\delta$ -konfigurace v rovině  $\alpha$ , (o které chceme zjistit, je-li typu  $S$ ) jsou vlastní. Pak musí být: 1a) trojúhelník  $A_u B_u C_u$  ostroúhlý (je průnikem pravoúhlého trojhranu  $SA_u, SB_u, SC_u$  s rovinou  $\alpha$ ).

Nechť kružnice  $k$  má poloměr  $r$  a střed  $S^0$  ( $S^0$  je orthocentrum trojúhelníka  $A_u B_u C_u$ ; označíme-li  $V$  průsečík jeho výšky z bodu  $A_u$  se stranou  $B_u C_u$ , je  $r = \sqrt{S^0 A_u \cdot S^0 V}$ ). Sestrojme  $H_u \in n \perp o, n \cap o = N$ . Jsou-li  $o, H_u$  antipolárně sdužené, pak platí: 2a)  $S^0 \in n$ , 3a)  $\sqrt{S^0 N \cdot S^0 H_u} = r$ .

b) Jsou-li v dané  $\delta$ -konfiguraci body  $A_u, B_u$  vlastní a bod  $C_u$  nevlastní, pak: 1b) směr určující bod  $C_u$  musí být kolmý k přímce  $A_u B_u$ , 2b)  $S^0 \in A_u B_u$ .

Sestrojíme body  $N, S^0$  podle vztahů  $H_u \in n \perp O, n \cap O = N, n \cap A_u B_u = S^0$ . Páry  $N_u, o; A_u, B_u C_u; B_u, A_u C_u$  jsou pak antipolárně sdružené ke kružnici  $k$  se středem  $S^0$  a poloměrem  $r = \sqrt{S^0 N \cdot S^0 H_u}$ , platí-li rovnice: 3b)  $\overline{S^0 N} \cdot \overline{S^0 H_u} = \overline{S^0 A_u} \cdot \overline{S^0 B_u}$ .

c) Jsou-li v dané  $\delta$ -konfiguraci body  $B_u C_u$  nevlastní, je nutné, aby:  
1c)  $A_u B_u \perp A_u C_u$ . 2c)  $S^0 = A_u$ .

Sestrojíme přímku  $H_u \in n \perp o$ . Aby pár  $H_u, o$  byl antipolárně sdružen vzhledem ke kružnici  $k$ , musí platit: 3c)  $S^0 \in n$ .

Podmínky 1, 2, 3 jsou v případech a, b, c nutné a postačující k tomu, aby daná  $\delta$ -konfigurace byla typu  $S$ .

Zformulujeme větu 1 ještě jinak.

**Věta 2.** *Nechť je v rovině  $\alpha$  dána kružnice  $k$  a její antipolární trojúhelník  $A_u B_u C_u$ . Budiž  $H_u \in \alpha$  libovolný bod,  $h$  s ním harmonicky sdružená přímka vzhledem k trojúhelníku  $A_u B_u C_u$  a přímka  $a$  antipolára bodu  $H_u$  vzhledem ke kružnici  $k$ . Potom je  $\delta$  konfigurace v rovině  $\alpha$  typu  $S$ , právě když existuje bod  $H_u \in \alpha$  takový, že platí  $h = a = o$ .*


Věta 2. je ekvivalentní s větou 1.

3. Uvedeme konstrukci přímky  $o$  a  $\delta$ -konfigurace typu  $S$ .

a) Nechť žádná strana antipolárního trojúhelníka  $A_u B_u C_u$  kružnice  $k$  neprochází jejím středem  $S^0$ . Body  $A_u, B_u, C_u$  jsou vlastní. Antipoláry bodů přímky  $p \in A_u$  tvoří svazek, jehož střed  ${}^p I_a$  leží na antipoláře  $B_u C_u$  bodu  $A_u$  vzhledem ke kružnici  $k$ , je tedy společným bodem antipoláry bodu  ${}^p I = p \cap B_u C_u$  a přímky  $B_u C_u$ . Páry  ${}^p I, {}^p I_a$ , tvoří (vzhledem k proměnné přímce  $p \ni A_u$ ) involuci  $J_a$  na přímce  $B_u C_u$ . Harmonické poláry bodů přímky  $p$  vzhledem k trojúhelníku  $A_u B_u C_u$  tvoří svazek se středem  ${}^p I_h \in B_u C_u$ , při čemž platí  $({}^p I, {}^p I_h, B_u, C_u) = -1$ . Dvojice  ${}^p I, {}^p I_h$  vytvářejí (při proměnné přímce  $p \in A_u$ ) involuci  $J_h$  na přímce  $B_u C_u$ . Proto též dvojice  ${}^p I_a, {}^p I_h$  tvoří involuci, kterou označíme  $J$ . Sestrojíme přímku  $v$  a bod  $V$  podle vztahů  $A_u \in v \perp B_u C_u, v \cap B_u C_u = V$  (obr. 1).

Bodu  $V$  odpovídá v involuci  $J_a$  nevlastní bod přímky  $B_u C_u$ , takže pro střed  $\sigma_A$  involuce  $J$  platí relace  $(V, \sigma_A, B_u, C_u) = -1$ . Body  $B, C$ , tvoří zajisté pár involuce  $J$ , jejíž mocnost je tedy  $\overline{\sigma_A B_u} \cdot \overline{\sigma_A C_u}$  a lze sestavit samodružné body  $\overline{A}, \overline{\overline{A}}$  této involuce (podle rovnic  $\overline{\sigma_A \overline{A}} = \overline{\overline{A} \sigma_A} = \sqrt{\overline{\sigma_A B_u} \cdot \overline{\sigma_A C_u}}$ ). Protože antipolární trojúhelník kružnice  $k$  je ostroúhlý, leží  $V$  uvnitř úsečky  $\overline{B_u C_u}$  a bod  $\sigma_A$  vně této úsečky. Involuce  $J$  je hyperbolická a samodružné body  $\overline{A}, \overline{\overline{A}}$  jsou tudíž reálné. Antipoláry bodů přímky  $A_u \overline{A} (A_u \overline{\overline{A}})$  procházejí bodem  $\overline{\overline{A}}$  ( $\overline{A}$ ) a týmž bodem jdou i harmonické poláry bodů přímky  $A_u \overline{A} (A_u \overline{\overline{A}})$ . Existuje-li tedy hledaná přímka  $o$ , pak je to některá z přímek svazku se středem  $\overline{A}$  ( $\overline{\overline{A}}$ ).

Obdobným způsobem určíme body  $\bar{B}, \bar{\bar{B}}$  na přímce  $A_u C_u$ . Přímky  $\bar{A}\bar{B}, \bar{\bar{A}}\bar{\bar{B}}, \bar{A}\bar{B}$ , resp.  $\bar{\bar{A}}\bar{\bar{B}}$  poskytují čtyři alternativy pro hledanou přímku  $o$ . Bod  $H_u$  ke každé příslušející je určen vztahem  $A_u\bar{A} \cap B_u\bar{B}$ ,  $A_u\bar{\bar{A}} \cap B_u\bar{B}$ ,  $A_u\bar{A} \cap B_u\bar{\bar{B}}$ , resp.  $A_u\bar{\bar{A}} \cap B_u\bar{\bar{B}}$ .




Obr. 1.

Podobně sestrojené body  $\bar{C}, \bar{\bar{C}}$  leží na přímkách  $o$ . Důkaz plyne na příklad z harmonických vlastností čtyřrohu  $\bar{A}\bar{A}\bar{B}\bar{B}$ , jehož diagonální trojúhelník jest  $A_u B_u C_u$ .


Abychom získali  $\delta$ -konfiguraci typu  $S$ , zvolíme tedy kromě trojúhelníka  $A_u B_u C_u$  body  $O, A$  tak, aby platilo  $A_u \in OA$ ,  $O \neq A \neq A_u \neq O$ . Konstrukce zbývajících bodů  $B, C$  je již zřejmá.

b) Nechť jedna strana (na př.  $B_u C_u$ ) antipolárního trojúhelníka  $A_u B_u C_u$  dané kružnice  $k$  prochází jejím středem  $S^0$  (obr. 2). Pak  $A_u$  je nevlastní bod přímky kolmé k přímce  $B_u C_u$ . Samodružné body  $\bar{A}, \bar{\bar{A}}$  involuce  $J$  na přímce  $B_u C_u$  sestrojíme stejně jako v a). Bod  $V$  splývá s bodem  $S^0$ . Na přímce  $A_u B_u$  ( $A_u C_u$ ) je středem involuce  $J$  bod  $B_u$  ( $C_u$ ) a konstrukce samodružných bodů  $\bar{C}, \bar{\bar{C}}$  ( $\bar{B}, \bar{\bar{B}}$ ) se zjednoduší:  $B_u\bar{C} = \bar{\bar{C}}B_u = \bar{B}_u S$  ( $C_u\bar{B} = \bar{\bar{B}}C_u = \bar{C}_u S$ ). Podle kon-


strukce totiž platí  $S\bar{C} \perp \bar{S}\bar{C}$  ( $S\bar{B} \perp \bar{S}\bar{B}$ ); je tedy  $\bar{C}, \bar{C}$  ( $\bar{B}, \bar{B}$ ) pár odpovídajících si bodů involuce  $J_a$  a dále je  $B_u\bar{C} = \bar{C}B_u$ , ( $C_u\bar{B} = \bar{B}C_u$ ), takže pár  $\bar{C}, \bar{C}$  ( $\bar{B}, \bar{B}$ ) je párem bodů involuce  $J_b$ . Přímky  $o$  jsou tím stanoveny a  $\delta$ -konfiguraci typu  $S$  lze po volbě bodů  $O, A$  (s vlastnostmi jako v a)) snadno doplnit i zbývajícími body  $B, C$ .



Obr. 2.



Obr. 3.




Obr. 4.

c) Nechť je dána kružnice  $k$  a nechť jeden bod antipolárního trojúhelníka  $A_u B_u C_u$ , na příklad bod  $A_u$ , splývá se středem  $S^0$  kružnice  $k$  (obr. 3). Pak body  $B_u, C_u$  jsou nevlastní body k sobě kolmých průměrů kružnice  $k$ . Samodružné body  $\bar{B}, \bar{B}$  ( $\bar{C}, \bar{C}$ ) na přímce  $A_u C_u$  ( $A_u B_u$ ) jsou průsečíky přímky  $A_u C_u$  ( $A_u B_u$ )

s kružnicí  $k$  a určují čtyři přímky, jejichž nevlastní body jsou  $\bar{A}, \bar{A}$ . Doplnění  $\delta$ -konfigurace typu  $S$  (když jsme zvolili body  $O, A$  jako  $v, a$ ) nečiní již obtíže.

Poznámka 3. Je-li známa délka úsečky  $\overline{O'A'} = d$ , lze ještě sestavit stopníky  $X, Y, Z$  přímek  $x' = O'A', y' = O'B', z' = O'C'$  podle pravidel centrálního promítání a tím určit též souřadnicovou soustavu  $(O', A', B', C')$  (obr. 4). Sestrojíme dělicí bod  $D$  přímky  $x$  ( $D \in k, DS^0 \perp A_u S^0$ ) a na přímkách  $DA, DO$  najdeme body  $'A, 'O$ , pro něž platí relace  $'A'O \parallel DA_u, \overline{'A'O} = d$ . Pro bod  $X$  pak platí:  $X = 'A'O \cap A_u O$ . Pro body  $Y, Z$  pak platí:  $XY \parallel A_u B_u, XZ \parallel A_u C_u$  ( $YZ \parallel B_u C_u$ ).



Obr. 5.

#### 4. Vyřešíme některé úlohy centrální axonometrie.


**Příklad 1.** V rovině  $\alpha$  zvolme současně nespývající přímky  $x, y, z$  jdoucí týmž bodem  $O$ , na přímkách  $x, y$  ( $x \neq y$ ) zvolme po dvou bodech  $A, A_u$ , resp.  $B, B_u$  tak, že body  $O, A, A_u; O, B, B_u$  jsou od sebe různé a body  $A_u, B_u$  jsou vlastní. Jest nalézt body  $C \in z, C_u \in z$  tak, aby vznikla  $\delta$ -konfigurace typu  $S$  (obr. 4).

Řešení. Označme  $AB \cap A_u B_u = \bar{C}$  a stanovme  $\bar{C}$  podle vztahu  $(\bar{C}, \bar{C}, A_u, B_u) = -1$  (na obr. 4 není sestaven). Body  $\bar{C}, \bar{C}$  jsou samodružné body involuce  $J$  na přímce  $A_u B_u$ ; střed  $\sigma_c$  úsečky  $\overline{\bar{C}\bar{C}}$  je středem involuce  $J$ ; bod  $V$  určený podle vztahu  $(\sigma_c, V, A_u, B_u) = -1$  je patou kolmice, vedené bodem  $C_u$  k přímce  $A_u B_u$ . Je-li bod  $C_u$  vlastní, je kružnice  $k$  určena antipolárním trojúhelníkem  $A_u B_u C_u$ . Je-li  $C_u$  nevlastní, je  $S^0 \in A_u B_u$  a pár  $A_u, B_u$  antipolární vzhledem ke kružnici  $k$ . Lze tedy určit střed promítání  $S$  a bod  $C \in z$  buď




podle pravidel centrálního promítání (z rovnic  $\overline{O'C'} = \overline{O'A'} = \overline{O'B'}$ ), nebo na základě perspektivity trojúhelníků  $ABC$ ,  $A_u B_u C_u$  vzhledem k ose  $o$ .

**Příklad 2.** V rovině  $\alpha$  jsou dány různé přímky  $x, y, z$ , jdoucí bodem  $O$  a kružnice  $k$  o středu  $S^0$  ( $S^0 \neq O$ ). Sestrojit body  $A \in x, A_u \in x, B \in y, B_u \in y, C \in z, C_u \in z$  takové, aby  $\delta$ -konfigurace  $(O, A, B, C, A_u, B_u, C_u)$  byla typu  $S$  (obr. 5).



Obr. 6.




Obr. 7.

**Řešení.** Protože je trojúhelník  $A_u B_u C_u$  vzhledem ke  $k$  antipolární, procházejí jeho strany antipóly  $P, Q, R$  přímkou  $x, y, z$  ke kružnici  $k$ . Tyto body leží na antipoláře  $a$  bodu  $O$ . Zvolíme-li libovolný bod  $X \in a$  a sestrojíme jeho antipoláru  $p \ni P$  ke kružnici  $k$  a body  $\zeta = z \cap p, X = x \cap \zeta Q$ , pak páry  $X, X$  tvoří na přímce  $x$  involuci  $J$ , jejíž každý samodružný bod je hledaným bodem  $A_u$ . Párem involuce  $J$  je  $O, (a \cap x)$ . Je-li  $X$  nevlastní bod přímky  $x$ , pak  $p = PS^0 \perp x$  a přímka  $\zeta Q$  ( $\zeta = z \cap p$ ) protne přímku  $x$  ve středu  $X$  involuce  $J$ . Má-li být úloha řešitelná, musí být  $J$  hyperbolická, t. j. osa  $z$  uvnitř úhlu  $POQ$ . Hledané body  $^1A_u, ^2A_u$  sestrojíme podle rovnic  $\overline{X^1A_u} = \overline{^2A_u X} = \sqrt{\overline{X(O \cap x)} \cdot \overline{XO}}$ . Stejně bychom sestrojili body  $B_u \in y, C_u \in z$ . Zvolíme-li dále libovolný bod  $A \in x$  a sestrojíme-li osu  $o$  a body  $B \in y, C \in z$  tak, aby trojúhelníky  $ABC, A_u B_u C_u$  byly perspektivní pro osu  $o$ , sestrojili jsme  $\delta$ -konfiguraci typu  $S$ . Tuto úlohu řešil N. F. Četveruchin [3]. Jeho řešení je zde zjednodušeno.


**Příklad 3.** Sestrojit centrální axonometrii tělesa daného podle obr. 6.  
a) Zvolíme vlastní body  $A_u, B_u, C_u, O, A$  a podle odst. 3a) sestrojíme body

$\bar{A}, \bar{A}, \bar{B}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{C}$ . Určíme pak body  $B = OB_u \cap \bar{A}\bar{C}$ ,  $C = OC_u \cap \bar{B}\bar{A}$  v  $\delta$ -konfiguraci typu  $S$ . Další konstrukce je patrna z obr. 7.

b) c) Základní body  $\delta$ -konfigurace typu  $S$ , t. j. body  $O, A, A_u, B_u, C_u$  volíme a body  $\bar{A}, \bar{A}, \bar{B}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{C}, B, C$  sestrojujeme podle odst. 3b)c). Tak byly v obr. 8 sestrojeny body  $\bar{A}, \bar{B}$  a pomocí nich body  $C = OC_u \cap \bar{A}\bar{B}$  a  $B =$



Obr. 8.



Obr. 9.

$= OB_u \cap \bar{A}\bar{C}$ ; v obr. 9 byly sestrojeny body  $\bar{C}, \bar{A}$  a pomocí nich body  $B = \bar{A}\bar{C} \cap OB_u$ ,  $C = OC_u \cap \bar{A}\bar{B}$ . Další konstrukce jsou patrné z obr. 8 a 9. Axonometrie a), b), c) se někdy také nazývají trojúhelníková perspektiva, nárožní perspektiva a průčelná perspektiva.

Všimněme si nakonec geometrického významu bodů  $\bar{A}, \bar{A}, \bar{B}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{C}$ . Tyto body jsou úběžníky přímk  $B'C', A'C', A'B'$ , tedy úběžníky směru půlicích úhly přímk  $O'A', O'B', O'C'$ .

#### LITERATURA

- [1] *H. M. Бескин*: Аналог теоремы Польке-Шварца в центральной аксонометрии, ДАН СССР, 50, 1945, 41—44.
- [2] *H. M. Бескин*: Основное предложение аксонометрии, Сб. Вопросы современной начертательной геометрии, Москва-Ленинград 1947, 55—126.
- [3] *Н. Ф. Четверухин*: Основная теорема аксонометрии и построение аксонометрических систем в центральной проекции, Сб. Методы начертательной геометрии и ее приложения, Москва 1955, 105—111.
- [4] *V. Havel*: Základní věty centrální axonometrie, Čas. pro přest. mat. 82(1957), 175—181.
- [5] *E. Kruppa*: Zur axonometrischen Methode, Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissenschaften, II. a, 119, Wien, 1910, 487—506.

- [6] *E. Müller*: Vorlesungen über darstellende Geometrie, I, Die linearen Abbildungen, bearbeitet von *E. Kruppa*, Leipzig-Wien, 1923, 181.  
 [7] *E. Stiefel*: Lehrbuch der darstellenden Geometrie, Basel, 1947.  
 [8] *E. Stiefel*: Zum Satz von Pohlke, Commentarii Math. Helv. 10, 1938, 208—223.

## Резюме

### ОБ ОСНОВНОЙ ТЕОРЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКСОНОМЕТРИИ

ЛАДИСЛАВ ДРС (Ladislav Drs), Прага.

(Поступило в редакцию 12/III 1956 г.)

В отделе 1 настоящей работы содержится доказательство основной теоремы центральной аксонометрии (теорема 1). В этой теореме приводятся условия, которым удовлетворяет определенная в работе конфигурация семи точек ( $\delta$ -конфигурация), если только она является центральной проекцией прямоугольного координатного трехгранника с равными масштабами по осям в пространстве и с несобственными точками координатных осей ( $\delta$ -конфигурация типа  $S$ ). Эту теорему сформулировал Э. Круппа. В отделах 2, 3 построены  $\delta$ -конфигурации типа  $S$  на основании теоремы 2, которая эквивалентна теореме 1, но более удобна для построений.

В примерах отдела 4 производится построение  $\delta$ -конфигурации типа  $S$  в случае, когда даны лишь некоторые из ее элементов, и показывается, каким образом можно использовать  $\delta$ -конфигурацию типа  $S$  при решении задач в разного рода перспективах.

## Résumé

### ÜBER DEN HAUPTSATZ DER ZENTRALEN AXONOMETRIE

LADISLAV DRS, Praha.

(Eingelangt 12. 3. 1956.)

Der Absatz 1 dieser Arbeit enthält einen Beweis des Hauptsatzes zentraler Axonometrie. In diesem Satz sind die Bedingungen enthalten, welche im Absatz definierte  $\delta$ -Konfiguration erfüllen muss, soll sie eine Zentralprojektion eines rechtwinkligen Koordinatensystems sein ( $\delta$ -Konfiguration vom Typus  $S$ ).

Die Absätze 2, 3 enthalten Konstruktionen der  $\delta$ -Konfiguration vom Typus  $S$  und im Absatz 4 löst man einige Aufgaben über diese  $\delta$ -Konfigurationen und über verschiedene Arten von Perspektiven.