

Josef Vala

O Cartanově parametru na nepřímkových plochách

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 85 (1960), No. 3, 300--310

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117334>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1960

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O CARTANOVĚ PARAMETRU NA NEPŘÍMKOVÝCH PLOCHÁCH

JOSEF VALA, Brno

(Došlo dne 26. června 1959)

Bud' $\frac{dv}{du} = B(u, v)$ diferenciální rovnice vrstvy čar na ploše Ψ vztažené na asymptotiky. Tuto vrstvu nazývám u -parametrisující vrstvou B_u , jestliže podél každé asymptotiky $v = v_0$ tečny k čarám vrstvy tvoří přímkovou plochu, na níž existuje Riecatiho soustava (R -soustava) čar (tj. soustava čar vytínající na tvořících přímkách projektivní bodové řady), která obsahuje čáru $v = v_0$, pro níž u je Cartanovým parametrem ve smyslu M. BARNERA [1]. Analogicky jsou definovány vrstvy B_v . Existuje-li na Ψ nekonečně mnoho vrstev, které jsou jak B_u tak B_v , tvoří úplná soustava těchto čar hypergeodetický systém. Zvláštní pozornost je věnována plochám koincidenčním.

Pojem Cartanova parametru nerozvinutelné přímkové plochy Φ projektivního prostoru S_3 , přesněji řečeno R -soustavy asymptotik plochy Φ , byl zaveden E. CARTANEM v práci [4]. M. BARNER zobecnil pojem Cartanova parametru pro libovolný R -systém plochy Φ v práci [1]. B. SEGRE ve svých přednáškách [6] použil původní Cartanovy definice ke studiu čar na některých nepřímkových plochách, zvláště plochách koincidenčních.

V této práci se vychází z výsledků B. Segreho, jejichž rozšíření je umožněno citovaným zobecněním pojmu Cartanova parametru, které podal M. Barner.

a) Přímková nerozvinutelná plocha Φ necht' je vytvořena jako soustava přímek spojujících dvojice korespondujících bodů řídících čar C_y, C_z opsaných body $y(u), z(u)$, kde u je proměnný parametr v jistém intervalu. Předpokládejme, že existují a jsou spojitě všechny derivace y', z', y'', z'' , atd., které jsou v dalším uvedeny, a že je $(y, z, y', z') \neq 0$. Pak

$$(1) \quad x = y(u) + v z(u)$$

je bod vytvořující při proměnných u, v plochu Φ , k níž necht' náleží soustava diferenciálních rovnic

$$(1a) \quad y'' = \alpha_{11}y + \alpha_{12}z + \beta_{11}y' + \beta_{12}z', \quad z'' = \alpha_{21}y + \alpha_{22}z + \beta_{21}y' + \beta_{22}z',$$

kde, jak lze dokázat, volbou faktoru homogenity lze vždy docílit, aby bylo

$$(2a) \quad \beta_{11} + \beta_{22} = 0.$$

Křivky $v = \text{konst.}$ plochy Φ vytvářejí na Φ soustavu R (Doppelverhältnisschar, Riccatiho soustavu) čar a ve smyslu citované práce M. Barnera nutná a postačující podmínka pro to, aby parametr u byl Cartanovým parametrem této soustavy R , za předpokladu (2a) je

$$(2b) \quad \alpha_{11} + \alpha_{22} = 0 \quad (\text{Barner [1], str. 55 a 52}).$$

Uvedme, že podmínkami (2ab) je Cartanův parametr souřadnicové soustavy R dán až na lineární transformace tvaru

$$u = \frac{\alpha_1 u^* + \alpha_2}{\gamma_1 u^* + \gamma_2}; \quad \alpha_1, \alpha_2, \gamma_1, \gamma_2 = \text{konst}, \quad \alpha_1 \gamma_2 - \gamma_1 \alpha_2 \neq 0,$$

spojíme-li je se změnou faktoru homogenity

$$y^* = \frac{(\alpha_1 \gamma_3 - \gamma_1 \alpha_3)^{\frac{1}{2}}}{\gamma_1 u - \alpha_1} y, \quad z^* = \frac{(\alpha_1 \gamma_3 - \gamma_1 \alpha_3)^{\frac{1}{2}}}{\gamma_1 u - \alpha_1} z. \quad (\text{Barner [1], str. 55.})$$

b) Nepřímková plocha Ψ nechť je vztažena na asymptotiky a vytvořena bodem $x = x(u, v)$; je integrální plochou soustavy diferenciálních rovnic

$$(3) \quad x_{uu} = \beta x_v + p_{11} x, \quad x_{vv} = \gamma x_u + p_{22} x.$$

Současně platí

$$(3a) \quad (x, x_u, x_v, x_{uv}) = \text{konst.}$$

Podmínky integrability soustavy (3), jak známo, jsou:

$$(4a) \quad (2p_{11} + \beta)_v = 2\beta\gamma_u + \gamma\beta_u,$$

$$(4b) \quad (2p_{22} + \gamma)_u = 2\gamma\beta_v + \beta\gamma_v,$$

$$(4c) \quad \begin{aligned} & \beta(2p_{22} + \gamma)_v + 2\beta_v(2p_{22} + \gamma) - \beta_{vvv} = \\ & = \gamma(2p_{11} + \beta)_u + 2\gamma_u(2p_{11} + \beta) - \gamma_{uuu}. \end{aligned}$$

(Segre [6], str. 90, Lane [5], str. 120.)

Poznámka. Diferenciální rovnice plochy Ψ vztažené na asymptotiky mají obecně tvar

$$x_{uu} = \alpha x_u + \beta x_v + p_{11} x, \quad x_{vv} = \gamma x_u + \delta x_v + p_{22} x.$$

Vhodnou normalisací souřadnic $x(u, v)$ (G. BOL [2], str. 107) lze vždy dosáhnouti splnění relace (3a); jestliže je splněna, pak nutně platí $\alpha = \delta = 0$.

Definice 1. Transformací T asymptotických parametrů u, v plochy Ψ rozumějme transformaci (podle G. Boly „Sterntransformation“)

$$(5) \quad u = f(u^*), \quad v = g(v^*),$$

je-li spojena s normalisací faktoru homogenity

$$(5a) \quad x^* = f_{u^*}^{-\frac{1}{2}} g_{v^*}^{-\frac{1}{2}} x.$$

Snadným výpočtem vychází, že po transformaci T plocha Ψ je integrální plochou soustavy diferenciálních rovnic

$$x_{u^*u^*}^* = \beta^* x_{v^*v^*}^* + p_{11}^* x^*, \quad x_{v^*v^*}^* = \gamma^* x_{u^*u^*}^* + p_{22}^* x^*,$$

kde

$$(6) \quad \beta^* = f'^2 g'^{-1} \beta, \quad \gamma^* = f'^{-1} g'^2 \gamma, \quad p_{11} = f'^{-2} (p_{11}^* + f' - f^2 - \beta^* g), \\ p_{22} = g'^{-2} (p_{22}^* + g' - g^2 - \gamma^* f),$$

$$f = \frac{1}{2} \frac{f''}{f'}, \quad g = \frac{1}{2} \frac{g''}{g'}, \quad f' = \frac{df}{du^*}, \quad g' = \frac{dg}{dv^*}, \quad \text{atp.} \quad (\text{Bol [3], str. 1}).$$

Z uvedené soustavy diferenciálních rovnic pak snadno plyne:

$$(6a) \quad 2p_{11} + \beta_v = f'^{-2} (2p_{11}^* + \beta_{v^*}^*) + 2f'^{-2} (-f^2 + f'), \\ 2p_{22} + \gamma_u = g'^{-2} (2p_{22}^* + \gamma_{u^*}^*) + 2g'^{-2} (-g^2 + g'), \\ (2p_{11} + \beta_v)_v = f'^{-2} g'^{-1} (2p_{11}^* + \beta_{v^*}^*)_{v^*}, \\ (2p_{22} + \gamma_u)_u = f'^{-1} g'^{-2} (2p_{22}^* + \gamma_{u^*}^*)_{u^*}, \\ \beta_u = -2f'^{-4} f'' g' \beta^* + f'^{-3} g' \beta_{u^*}^*, \quad \gamma_u = f'^{-1} f'' g'^{-2} \gamma^* + g'^{-2} \gamma_{u^*}^*, \\ \beta_v = f'^{-2} g'^{-1} g'' \beta^* + f'^{-2} \beta_{v^*}^*, \quad \gamma_v = -2f' g'^{-4} g'' \gamma^* + f' g'^{-3} \gamma_{v^*}^*.$$

T_u , resp. T_v necht' je onen zvláštní případ transformace T , kde $f(u^*) = \frac{\alpha_1 u^* + \alpha_3}{\gamma_1 u^* + \gamma_3}$,

g je libovolná funkce proměnné v^* , resp. $g(v^*) = \frac{\beta_2 v^* + \beta_3}{\gamma_2 v^* + \gamma_3}$, f je libovolná funkce

proměnné u^* , při čemž $\alpha_1, \alpha_3, \beta_2, \beta_3, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 = \text{konst.}$; $\alpha_1 \gamma_3 - \alpha_3 \gamma_1 \neq 0$, $\beta_2 \gamma_3 - \beta_3 \gamma_2 \neq 0$. Přímým výpočtem snadno dostaneme, že transformace T je transformací T_u , resp. T_v tehdy a jen tehdy, platí-li $f' - f^2 = 0$, resp. $g' - g^2 = 0$.

c) Jestliže koeficienty soustavy (3) splňují kromě podmínek (4abc) ještě podmínku $(2p_{11} + \beta_v)_v = 0$, pak plochu označme Ψ_1 , podobně, je-li splněna podmínka $(2p_{22} + \gamma_u)_u = 0$, pak plochu označme Ψ_2 . Je zřejmé, jestliže plocha Ψ je současně plochou Ψ_1 i Ψ_2 , pak je koincidenční plochou $\Psi_{1,2}$ a obráceně. (Bol [3], str. 38—9.)

Geometricky lze plochy Ψ_1 a Ψ_2 charakterisovat tím, že v každém jejich bodě kanonická tečna 2. druhu splývá s jednou z asymptotických tečen plochy.

Z rovnic (6a) snadno vyplývá: Na ploše Ψ_1 lze zvoliti asymptotické parametry u^* , v^* (čili transformaci T) tak, že platí $2p_{11}^* + \beta_{v^*}^* = 0$; nalezení těchto parametrů vyžaduje řešení dif. rovnice

$$2\varphi[f(u^*)]f'^4 = 2f'''f' - 3f''^2, \quad \text{kde} \quad \varphi(u) = 2p_{11} + \beta_v.$$

Podobně na ploše \mathcal{Y}_2 lze zvoliti parametry u^*, v^* tak, že platí $2p_{22}^* + \gamma_{u^*}^*$; nalezení těchto parametrů předpokládá řešení dif. rovnici

$$2\bar{\varphi}[g(v^*)] g'^4 = 2g'''g' - 3g''^2, \quad \text{kde } \bar{\varphi}(v) = 2p_{22} + \gamma_u.$$

Důležitost volby těchto parametrů bude objasněna v odstavci d).

Jestliže asymptotické parametry u, v na ploše \mathcal{Y}_1 jsou již tak voleny, že platí $2p_{11} + \beta_v = 0$, pak tato relace je dle (6a) invariantní pouze při transformaci T_u . Podobně, platí-li pro plochu \mathcal{Y}_2 vztaženou na asymptotické parametry u, v : $2p_{22} + \gamma_u = 0$, pak tato relace je invariantní pouze při transformaci T_v .

d) Každá přímková plocha, dotýkající se nepřímkové plochy \mathcal{Y} podél její asymptotiky $v = v_0$ je vytvořena bodem

$$(7) \quad \xi = y + rz,$$

kde

$$(7a) \quad y = x(u, v_0), \quad z = A(u, v_0)x(u, v_0) + \lambda_1(u, v_0)x_u(u, v_0) + \lambda_2(u, v_0)x_v(u, v_0),$$

při čemž u a r jsou parametry.

Definice 2. Označením $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$ rozumějme soustavu R -čar plochy (7), jejíž čáry jsou dány rovnicí $r = \text{konst}$.

Poznámka 1. Je zřejmé, že každá soustava $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$ leží na přímkové ploše $\Phi(v_0, B)$, která

1. se dotýká plochy \mathcal{Y} podél její asymptotiky $v = v_0$,
2. jejíž tvořící přímky se dotýkají čar systému $\frac{dv}{du} = \frac{\lambda_2(u, v)}{\lambda_1(u, v)} = B(u, v)$.

v bodech asymptotiky $v = v_0$.

Z této definice je zřejmé, že přímková plocha $\Phi(v_0, B)$ závisí pouze na poměru $\frac{\lambda_2(u, v)}{\lambda_1(u, v)} = B(u, v)$ koeficientů λ_1, λ_2 .

Definice 3. Vrstvu čar $\frac{dv}{du} = \frac{\lambda_2(u, v)}{\lambda_1(u, v)} = B(u, v)$ nazývávejme u -parametrisující vrstvou čar (soustavou B_u -čar), splňuje-li $B(u, v)$ podmínku

$$(8) \quad 2\beta \frac{\partial B}{\partial u} = B^2(2p_{11} + \beta_v) + B\beta_u - \beta^2.$$

Jestliže plocha \mathcal{Y} je vztažena na jiné asymptotické parametry u^*, v^* , pak stejným způsobem lze na ní definovat vrstvu čar $\frac{dv^*}{du^*} = B^*(u^*, v^*)$.

Poznámka 2. Jestliže plocha $\Phi(v_0, B)$ vytvořená bodem (7) má splňovatí podmínku $(y, z, y', z') = \text{konst} \neq 0$, je nutné, aby bylo $\lambda_{2u} = 0$, jak vychází snadným počtem. V odstavcích d), e) budeme vždy předpokládat, že tato podmínka je splněna, tj. že λ_2 je funkcí pouze parametru v ; $\lambda_2 = \lambda_2(v)$.

Věta 1. Pro soustavy $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$ platí pro všechna v_0 simultanně: u je Cartanovým parametrem pro každou $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$, jakmile B splňuje podmínku (8).

Důkaz. Derivováním rovnic (7a) s přihlédnutím k (3) vychází:

$$(9) \quad \begin{aligned} y &= x, \\ y_u &= x_u, \\ y_{uu} &= \beta x_v + p_{11} x, \\ z &= Ax + \lambda_1 x_u + \lambda_2 x_v, \\ z_u &= x(A_u + \lambda_1 p_{11}) + x_u(A + \lambda_{1u}) + x_v(\lambda_1 \beta) + x_{uv} \lambda_2, \\ z_{uu} &= x[A_{uu} + p_{11} A + 2\lambda_{1u} p_{11} + \lambda_1 p_{11u} + \lambda_2(\beta p_{22} + p_{11v})] + \\ &\quad + x_u[2A_u + \lambda_1 p_{11} + \lambda_{1uu} + \lambda_2 \beta \gamma] + \\ &\quad + x_v[\beta A + 2\beta \lambda_{1u} + \lambda_1 \beta_u + \lambda_2(\beta_v + p_{11})] + \\ &\quad + x_{uv}(\lambda_1 \beta). \end{aligned}$$

Jestliže do (1a) položíme za $y, y', y'',$ resp. z, z', z'' výrazy (9) pro $y, y_u, y_{uu},$ resp. $z, z_u, z_{uu},$ obdržíme dvě rovnice, které jsou splněny identicky tehdy a jen tehdy, platí-li soustavy

$$(9a) \quad \begin{aligned} p_{11} &= \alpha_{11} + \alpha_{12} A + \beta_{12}(A_u + \lambda_1 p_{11}), \\ 0 &= \alpha_{12} \lambda_1 + \beta_{11} + \beta_{12}(A + \lambda_{1u}), \\ \beta &= \alpha_{12} \lambda_2 + \beta_{12} \lambda_1 \beta, \\ 0 &= \beta_{12} \lambda_2, \\ A_{uu} + p_{11} A + 2\lambda_{1u} p_{11} + \lambda_1 p_{11u} + \lambda_2(\beta p_{22} + p_{11v}) &= \\ &= \alpha_{21} + \alpha_{22} A + \beta_{22}(A_u + \lambda_1 p_{11}), \\ 2A_u + \lambda_1 p_{11} + \lambda_{1uu} + \lambda_2 \beta \gamma &= \alpha_{22} \lambda_1 + \beta_{21} + \beta_{22}(A + \lambda_{1u}), \\ \beta A + 2\beta \lambda_{1u} + \lambda_1 \beta_u + \lambda_2(\beta_v + p_{11}) &= \alpha_{22} \lambda_2 + \beta_{22} \lambda_1 \beta, \\ \lambda_1 \beta &= \beta_{22} \lambda_2. \end{aligned}$$

Odtud snadno dostaneme:

$$(10) \quad \begin{aligned} \beta_{11} + \beta_{22} &= 0, \\ \alpha_{11} + \alpha_{22} &= \frac{\lambda_2^2}{\lambda_1^2} \left[2\beta \frac{\lambda_{1u} \lambda_2}{\lambda_1^2} + \frac{\lambda_2^2}{\lambda_1^2} (2p_{11} + \beta_v) + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \beta_u - \beta^2 \right]. \end{aligned}$$

Dosadíme-li $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = B$ ($\lambda_{2u} = 0$), dostaneme pro $\alpha_{11} + \alpha_{22} = 0$ podmínku (8).

Věta 1 byla dokázána za předpokladu $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \neq 0$ (čímž vylučujeme, že uvažovaný systém čar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$ je systémem asymptotik.

Jestliže však $\lambda_1 = 0$, pak tvořící přímky plochy $\Phi(v_0, B)$ jsou tečnami asymptotik $u = \text{konst.}$ plochy Ψ v bodech asymptotiky $v = v_0$. Soustavu $R(v_0, A, 0, \lambda_2)$ tvoří pak podle (7), (7a) čáry vytvořené body

$$(11) \quad \xi = x(u, v_0) + r[A(u, v_0) x(u, v_0) + \lambda_2(u, v_0) x_v(u, v_0)].$$

Větu 1 pak nahrazuje

Věta 2. *Parametr u ve vyjádření (11) soustavy $R(v_0, A, 0, \lambda_2)$ je jejím Cartanovým parametrem (při každé hodnotě $v = v_0 = \text{konst.}$), platí-li $2p_{11} + \beta_v = 0$.*

Důkaz. Z rovnic (9a) vychází pro $\lambda_1 = 0$, za předp. $\lambda_2 \neq 0$,

$$\beta_{11} + \beta_{22} = 0, \quad \alpha_{11} + \alpha_{22} = 2p_{11} + \beta_v.$$

Podmínka $\alpha_{11} + \alpha_{22} = 0$ vyjadřuje, že plocha Ψ je plochou Ψ_1 .

Věta 3. *Nutná podmínka, aby u byl Cartanovým parametrem systému $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$ a aby tento systém R byl soustavou asymptotik, je, že Ψ je plochou Ψ_1 , na níž jsou parametry voleny tak, že platí $2p_{11} + \beta_v = 0$.*

Důkaz. Aby systém $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$ byl systémem asymptotik (za předp. $\lambda_{2u} = 0$), je nutno a stačí, aby bylo $\beta_{11} = \beta_{12} = \beta_{21} = \beta_{22} = 0$, což lze dokázat snadným výpočtem. Odtud pak dle (9a) snadno dostaneme:

$$\lambda_1 = 0, \quad 2A_u + \lambda_2 \beta_v = 0, \quad \alpha_{11} + \alpha_{22} = 2p_{11} + \beta_v.$$

Poznámka 3. Ve všech větách vpředu uvedených se předpokládá $\lambda_2 \neq 0$, tj. že uvedený R -systém neleží na ploše tečen asymptotiky $v = v_0$.

e) **Věta 4.** *Je-li T transformací parametrů u, v podle definice 1 v nové parametry u^*, v^* , pak každá u -parametrisující vrstva čar plochy Ψ se transformuje v u^* -parametrisující vrstvu čar plochy Ψ tehdy a jen tehdy, jestliže T je transformací T_u .*

Důkaz. u -parametrisující vrstva čar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$ na ploše Ψ necht' má v nové soustavě rovnici $\frac{dv^*}{du^*} = B^*(u^*, v^*)$, kde zřejmě platí

$$(12) \quad B(u, v) = f'^{-1}g' B^*(u^*, v^*).$$

Podle definice 3 je funkce $B(u, v)$ integrálem dif. rovnice (8). Do této rovnice dosadíme za $B(u, v)$ z rovnice (12) a za $\beta, \beta_u, \beta_v, 2p_{11} + \beta_v$ z (6), (6a). Po snadné úpravě pak vychází parciální dif. rovnice pro $B^*(u^*, v^*)$:

$$(13) \quad 2\beta^* \frac{\partial B^*}{\partial u^*} = B^{*2}(2p_{11}^* + \beta_{v^*}^*) + B^* \beta_{u^*}^* - \beta^{*2} + 2B^{*2}(f' - f^2).$$

Vrstva čar $\frac{dv^*}{du^*} = B^*(u^*, v^*)$ je u^* -parametrisující vrstvou čar tehdy a jen tehdy, platí-li ve (13) $f' - f^2 = 0$, transformace T je tedy transformací T_u .

Uvažujme kongruenci K přímek

$$(14) \quad \xi = x + r\{A(u, v)x + \varphi(v)[B(u, v)]^{-1}x_u(u, v) + \varphi(v)x_v(u, v)\}.$$

Přímky této kongruence jsou tečnami vrstvy čar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$, která necht' je u -parametrisující vrstvou čar na ploše Ψ . Plochy $u = \text{konst.}$, $v = \text{konst.}$ kon-

gruence K nazýváme parametrickými v -plochami, resp. u -plochami kongruence K . Podle věty 1 čáry $r = \text{konst.}$ vytvářejí na každé parametrické u -ploše ($v = v_0$) soustavu $R(v_0, A, \varphi B^{-1}, \varphi)$, pro kterou je parametr u Cartanovým parametrem.

Nechť $T(\xi)$ je transformace T parametrů u, v , spojená s normalisací faktoru při ξ podle rovnice

$$\xi^* = f_u^{-\frac{1}{2}} g_v^{-\frac{1}{2}} \xi.$$

Je-li $T_u(\xi)$ zvláštním případem transformace $T(\xi)$ pro $f(u^*) = \frac{\alpha_1 u^* + \alpha_3}{\gamma_1 u^* + \gamma_3}$, $\alpha_1, \alpha_3, \gamma_1, \gamma_3 = \text{konst.}$, $\alpha_1 \gamma_3 - \gamma_1 \alpha_3 \neq 0$, g je libovolná funkce parametru v^* , pak platí

Věta 5. *Budiž dána kongruence K tečen u -parametrisující vrstvy čar $\frac{dv}{du} = B^*(u, v)$ plochy Ψ rovnicí (14). Při transformaci $T_u(\xi)$ parametrů u, v tvoří čáry $r = \text{konst.}$ na každé přímkové u^* -ploše kongruenci K (tj. na ploše podél níž $dv^* = 0$) parametrický R -systém, pro nějž u^* je opět Cartanovým parametrem.*

Důkaz. Podle definice 1 snadno vychází

$$\begin{aligned} x_u &= \frac{1}{2} f'^{-\frac{3}{2}} f'' g'^{\frac{1}{2}} x^* + f'^{-\frac{1}{2}} g'^{\frac{1}{2}} x_{u^*}^*, \\ x_v &= \frac{1}{2} f'^{\frac{1}{2}} g'^{-\frac{3}{2}} g'' x^* + f'^{\frac{1}{2}} g'^{-\frac{1}{2}} x_v^*. \end{aligned}$$

Dosazením do rovnice (14) a po úpravě pak plyne

$$(15) \quad \begin{aligned} \xi^* &= x^* + r \{ x^* [A^* + \frac{1}{2} \varphi^* B^{*-1} f'^{-1} f'' g'^{-1} + \frac{1}{2} \varphi^* g'^{-2} g''] + \\ &+ x_{u^*}^* [g'^{-1} \varphi^* B^{*-1}] + x_v^* [g'^{-1} \varphi^*], \end{aligned}$$

kde $B^{*-1} = f'^{-1} g' B^{-1}$, $A(u, v) = A^*(u^*, v^*)$, $\varphi(v) = \varphi^*(v^*)$. Čáry $\frac{dv^*}{du^*} = B^*(u^*, v^*)$ tvoří podle věty 4 u^* -parametrisující vrstvu. Výraz $g'^{-1} \varphi^*$ závisí pouze na parametru v^* . Správnost věty je pak zřejmá podle věty 1 a poznámky 2.

f) Každá přímková plocha dotýkající se plochy Ψ podél její asymptotiky $u = u_0$ je vytvořena bodem $\xi = y + rz$, kde

$$(16) \quad \begin{aligned} y &= x(u_0, v), \\ z &= \bar{A}(u_0, v) x(u_0, v) + \bar{\lambda}_1(u_0, v) x_u(u_0, v) + \bar{\lambda}_2(u_0, v) x_v(u_0, v). \end{aligned}$$

Definice 2a. Označením $R(u_0, \bar{A}, \bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2)$ rozumějme soustavu R -čar plochy (16), jejíž čáry jsou dány rovnicí $r = \text{konst.}$ Každá soustava $R(u_0, \bar{A}, \bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2)$ leží na přímkové ploše $\Phi(u_0, \bar{B})$, která

1. dotýká se plochy Ψ podél její asymptotiky $u = u_0$,
2. její tvořící přímky se dotýkají čar systému $\frac{dv}{du} = \frac{\bar{\lambda}_2(u, v)}{\bar{\lambda}_1(u, v)} = \bar{B}(u, v)$ v bodech asymptotiky $u = u_0$.

Vrstvu čar $\frac{dv}{du} = \bar{B}(u, v)$ nazýváme v -parametrisující vrstvou plochy Ψ , splňuje-li $\bar{B}(u, v)$ podmínku

$$(17) \quad 2\gamma \frac{\partial \bar{B}}{\partial v} = -(2p_{22} + \gamma_u) - \bar{B}\gamma_v + \bar{B}^2\gamma^2.$$

Pro plochy $\Phi(u_0, \bar{B})$, v -parametrisující vrstvy čar $\frac{dv}{du} = \bar{B}(u, v)$ a soustavy $R(u_0, \bar{A}, \bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2)$ lze odvoditi věty analogické větám 1 až 5.

g) **Definice 4.** Vrstvu čar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$ na ploše Ψ nazýváme (u, v) -parametrisující vrstvou čar, vyhovuje-li $B(u, v)$ podmínkám (8), (17), tj. soustavě parciálních diferenciálních rovnic

$$(18) \quad \begin{aligned} 2\beta \frac{\partial B}{\partial u} &= B^2(2p_{11} + \beta_v) + B\beta_u - \beta^2, \\ 2\gamma \frac{\partial B}{\partial v} &= -(2p_{22} + \gamma_u) - B\gamma_v + B^2\gamma^2. \end{aligned}$$

Podle této definice a předcházejících odstavců je zřejmé, že (u, v) -parametrisující vrstva čar je současně u -parametrisující i v -parametrisující vrstvou čar na ploše Ψ .

Soustava (18) je úplně integrabilní, platí-li tyto podmínky:

$$(19a) \quad \beta\gamma(2p_{11} + \beta_v)_v - (2p_{11} + \beta_v)(2p_{22} + \gamma_u)_u = 0,$$

$$(19b) \quad \beta\gamma(2p_{22} + \gamma_u)_u - (2p_{22} + \gamma_u)(2p_{11} + \beta_v)_v = 0,$$

$$(19c) \quad -(2p_{11} + \beta_v)(2p_{22} + \gamma_u) + \beta\gamma[\log(\beta\gamma)]_{uv} + \beta^2\gamma^2 = 0.$$

Jestliže koeficienty $\beta, \gamma, p_{11}, p_{22}$ diferenciálních rovnic plochy Ψ [(3)] vyhovují mimo rovnic (4) ještě podmínkám (19), pak — a jen tehdy — existuje na ploše nekonečně mnoho (u, v) -parametrisujících vrstev čar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$. Podobně lze definovat na ploše Ψ , vztahené na asymptotické parametry u^*, v^* , — (u^*, v^*) -parametrisující vrstvu čar $\frac{dv^*}{du^*} = B^*(u^*, v^*)$.

Věta 6. Jestliže na ploše Ψ existuje nekonečně mnoho (u, v) -parametrisujících vrstev čar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$, pak jejich úplná soustava tvoří systém hypergeodetický.

Důkaz. Z rovnic (18) snadno vychází

$$\begin{aligned} \frac{d^2v}{du^2} &= \frac{\partial B}{\partial u} + \frac{\partial B}{\partial v} B = \left(\frac{dv}{du}\right)^3 \frac{\gamma}{2} + \left(\frac{dv}{du}\right)^2 \left[\frac{1}{2\beta} (2p_{11} + \beta_v) - \frac{\gamma_v}{2\gamma} \right] + \\ &+ \left(\frac{dv}{du}\right) \left[\frac{\beta_u}{2\beta} - \frac{1}{2\gamma} (2p_{22} + \gamma_u) \right] - \frac{\beta}{2}. \end{aligned}$$

h) Souřadnice $x = x(u, v)$ koincidenční plochy $\Psi_{1,2}$ necht' vyhovují soustavě diferenciálních rovnic

$$(20) \quad x_{uu} = x_u + (cu + h)x, \quad x_{vv} = x_v + (cv + k)x,$$

$c, h, k = \text{konst.}$ (Segre [6], str. 102). Podle rovnic (3) tedy zřejmě platí:

Věta 7. *Na koincidenční ploše $\Psi_{1,2}$ o rovnicích (20) existuje nekonečně mnoho (u, v) -parametrisujících vrstev čar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$ tehdy a jen tehdy, je-li $c = 0$, $h \cdot k = \frac{1}{4}$.*

Důkaz. Rovnice (4abc) a (19ab) jsou splněny pro všechny hodnoty c, h, k , rovnice (19c) pouze pro $c = 0, h \cdot k = \frac{1}{4}$. Integrací soustavy (18) snadno dostaneme

$$\log [\sqrt{2h}B - 1] - \log [\sqrt{2h}B + 1] = u + \frac{v}{2h} + C, \quad C = \text{konst.}$$

Při transformaci T parametrů u, v plochy $\Psi_{1,2}$ platí podle (6) a (6a)

$$(21) \quad \begin{aligned} \beta^* &= f'^2 g'^{-1}, \quad \gamma^* = f'^{-1} g'^2, \\ 2(cf + h) &= f'^{-2}(2p_{11}^* + \beta_{v^*}^*) + 2f'^{-2}(-f^2 + f'), \\ 2(cg + k) &= g'^{-2}(2p_{22}^* + \gamma_{u^*}^*) + 2g'^{-2}(-g^2 + g'). \end{aligned}$$

Věta 8. *Na koincidenční ploše $\Psi_{1,2}$, vztážené na asymptotické parametry u^*, v^* , pro níž jsou splněny podmínky (21), existuje nekonečně mnoho (u^*, v^*) -parametrisujících vrstev čar $\frac{dv^*}{du^*} = B^*(u^*, v^*)$, vyhovují-li funkce f, g relacím*

$$2f'^2(cf + h) - 2(-f^2 + f') = mf'^2, \quad 2g'^2(cg + k) - 2(-g^2 + g') = m^{-1}g'^2; \\ m = \text{konst} \neq 0.$$

Důkaz. Rovnice (4abc), (19ab), kde místo u je třeba dosadit u^* atp., jsou pro funkce $\beta^*, \gamma^*, p_{11}^*, p_{22}^*$ splněny podle (6a), (20), (21). Dosadíme-li z rovnic (21) do (19c), kde opět místo u píšeme u^* atp., dostaneme po snadné úpravě:

$$[2f'^2(cf + h) - 2(-f^2 + f')] f'^{-2} = [2g'^2(cg + k) - 2(-g^2 + g')]^{-1} g'^2.$$

Výraz na levé straně závisí pouze na proměnné u^* , pravá strana pouze na proměnné v^* . Odtud ihned vycházejí hledané relace.

Pracováno v semináři diferenciální geometrie prof. dr. J. KLAPKY.

Literatura

- [1] *M. Barner*: Doppelverhältnisscharen auf Regelflächen, Math. Zeitschr. Bd. 62, 1955
- [2] *G. Bol*: Projektive Differentialgeometrie, I. Teil, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1950.
- [3] *G. Bol*: Projektive Differentialgeometrie, II. Teil, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1954.
- [4] *E. Cartan*: Sur les développantes d'une surface réglée, Bull. Acad. roumaine, t. 14, 1931.
- [5] *E. P. Lane*: A treatise on projective differential geometry, The university of Chicago Press, 1942.
- [6] *B. Segre*: Proprietà locali e globali di varietà e di trasformazioni differenziabili con speciale riguardo ai casi analitici ed algebrici, Roma-Instituto Matematico dell'università, 1956.

Резюме

О ПАРАМЕТРЕ КАРТАНА НА НЕЛИНЕЙЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

ИОСЕФ ВАЛА (Josef Vala), Брно

В работе рассматриваются свойства семейств линий $\frac{dv}{du} = B(u, v)$ (семейство B_u), где $B(u, v)$ является решением дифференциального уравнения (8), на нелинейчатой поверхности Ψ , координаты поверхности Ψ являются решением дифференциальных уравнений (3). Касательные к линиям семейства B_u в точках u -линии ($v = v_0$) определяют линейчатую поверхность $\Phi(v_0, B)$, (7), на которой можно найти системы R , которые содержат линию $v = v_0$ (системы $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$, где $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = B$), так что u является параметром Картаана (в смысле обобщения М. Барнера) на поверхности $\Phi(v_0, B)$.

Далее рассматриваются изменения семейства B_u и системы $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$ при трансформации T , (5), (5а) параметров u и v . (Системы R -линий на поверхности представляют однопараметрическую систему линий, которые пересекают образующие этой поверхности в проективном ряде точек.) Подобно можно определять семейства B_u на поверхности Ψ .

Далее рассматривается случай, когда на поверхности Ψ существует бесконечное множество семейств B_u так, что эти семейства B_u являются семействами B_v . Особенно простым является изучение в том случае, когда поверхность Ψ является коинцидентной поверхностью.

Zusammenfassung

DER CARTANISCHE PARAMETER AUF DEN FLÄCHEN, DIE KEINE REGELFLÄCHEN SIND

JOSEF VALA, BRNO

In dieser Arbeit werden einige Eigenschaften der Kurvenschar $\frac{dv}{du} = B(u, v)$ (der u -parametrisierenden Kurvenschar B_u) auf der Fläche Ψ , die keine Regelfläche ist, studiert. $B(u, v)$ ist eine Lösung der partiellen Differentialgleichung (8). Die Ableitungsgleichungen der Fläche Ψ sind in der Form (3) gegeben. Die Tangenten der Kurven der B_u -Schar in den Punkten der u -Kurve ($v = v_0$) bilden eine Regelfläche $\Phi(v_0, B)$ (7). Auf dieser kann man R -Systeme, die die Linie $v = v_0$ (Systeme $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$, wo $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = B$ ist) enthalten, so wählen, daß der Parameter u im Sinne der Verallgemeinerung von M. Barner ein Cartanischer Parameter auf der Fläche $\Phi(v_0, B)$ ist.

Weiter studiert man die Änderungen der B_u -Scharen und der Systeme $R(v_0, A, \lambda_1, \lambda_2)$ bei der Transformation T , (5), (5a), der Parameter u, v . (Unter der Bezeichnung R -System versteht man ein solches einparametrisches System von Linien auf der Regelfläche, die die Erzeugenden dieser Regelfläche in den projektiven Punktreihen schneiden.) Ähnlich kann man die B_v -Scharen auf der Fläche Ψ definieren.

Weiter studiert man den Fall, wo auf der Fläche unendlich viele Scharen B_u , die gleichzeitig B_v -Scharen sind, existieren. Besonders einfach ist der Fall, wenn die Fläche Ψ eine Koinzidenzfläche ist.