

Václav Havel

O rozkladu singulárních lineárních transformací

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 85 (1960), No. 4, 439--447

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117346>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1960

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O ROZKLADU SINGULÁRNÍCH LINEÁRNÍCH TRANSFORMACÍ

VÁCLAV HAVEL, Brno

(Došlo dne 18. září 1959)

Prof. dr. Jiřímu Klapkovi k šedesátinám

Článek obsahuje algebraické i geometrické podmínky k tomu, aby existoval rozklad dané singulární lineární transformace n -rozměrného eukleidovského prostoru v podobnost (shodnost) a projekci.

1. Předmětem vyšetřování bude nejprve n -rozměrný (reálný eukleidovský) prostor \mathbb{E} . Dokážeme větu, která zobecňuje, resp. prohlubuje dřívější výsledky E. STIEFELA, H. HADWIGERA a H. NAUMANNA; viz [2], str. 213—214, [3], str. 97 a [6], str. 78.

Věta 1. *Nechť \mathcal{A} je soustava vektorů $a_1 = \overrightarrow{OA_1}, \dots, a_n = \overrightarrow{OA_n}$, vytvářejících v \mathbb{E} m -rovinu; $2 \leq m < n$. Označme g_1, \dots, g_n podle velikosti uspořádaná charakteristická čísla Gramovy matice soustavy \mathcal{A} . Soustavu \mathcal{A} lze pokládat za paralelní průmět určité soustavy nenulových vektorů navzájem kolmých a stejně dlouhých, tehdy a jen tehdy, je-li splněna tato podmínka: Jsou-li čísla g_{n-m+1}, \dots, g_n nenulová, pak se navzájem rovnají. O ortogonální průmět jde přitom právě v tom případě, když všechna nenulová charakteristická čísla se navzájem rovnají.*

Podotkněme, že Gramova matice dané soustavy vektorů w_1, \dots, w_n je tvaru

$$\begin{vmatrix} w_1w_1 & w_1w_2 & \dots & w_1w_n \\ w_2w_1 & w_2w_2 & \dots & w_2w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_nw_1 & w_nw_2 & \dots & w_nw_n \end{vmatrix},$$

kde w_iw_j znamená vnitřní (skalární) součin vektorů w_i, w_j .

Charakteristická čísla této Gramovy matice jsou kořeny $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ rovnice

$$\begin{vmatrix} w_1w_1 - \lambda & w_1w_2 & \dots & w_1w_n \\ w_2w_1 & w_2w_2 - \lambda & \dots & w_2w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_nw_1 & w_nw_2 & \dots & w_nw_n - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

K účelům důkazu rozdělme tvrzení věty 1 na dvě části:

a) Necht $n \geq 2m - 1$. Pak soustava \mathfrak{A} je v \mathbf{E} vždy paralelním průmětem soustavy nenulových vektorů navzájem kolmých a stejně dlouhých.

b) Necht $n < 2m - 1$. Pak soustava \mathfrak{A} je v \mathbf{E} paralelním průmětem soustavy nenulových vektorů navzájem kolmých a stejně dlouhých právě tehdy, když platí relace

$$(1) \quad g_1 \geq \dots \geq g_{n-m} \geq g_{n-m+1} = \dots = g_m > g_{m+1} = \dots = g_n = 0.$$

Tvrzení o ortogonální projekci je ovšem pro oba případy společné: O ortogonální projekci běží právě v případě

$$(2) \quad g_1 = \dots = g_m < g_{m+1} = \dots = g_n = 0.$$

Necht \mathfrak{A} je pevná soustava vektorů $\alpha_1 = \overrightarrow{OA_1}, \dots, \alpha_n = \overrightarrow{OA_n}$, vytvářejících v \mathbf{E} m -rovinu \mathbf{A} , přičemž $2 \leq m < n$. K zjednodušení formulace nazveme e -reperem kteroukoliv soustavu vektorů $\overrightarrow{OE_1}, \dots, \overrightarrow{OE_n}$ navzájem kolmých, majících společnou délku $e > 0$. V \mathbf{E} zvolme pravoúhlý souřadnicový systém o počátku O a označme v něm $a_{i,1}, \dots, a_{i,n}$ složky vektoru α_i ; $i = 1, \dots, n$.

A) Necht soustava \mathfrak{A} je v \mathbf{E} paralelním průmětem e -reperu $\mathfrak{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ při směru promítání \mathbf{S} . Zvolme jiný e -reper $\mathfrak{E}' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$. Potom platí rovnice

$$e'_i = t_{i,1}e_1 + \dots + t_{i,n}e_n \quad (i = 1, \dots, n),$$

kde matice $T = \|t_{i,j}\|$ n -tého řádu je ortogonální.

Necht soustava \mathfrak{A}' tvořená n vektory $\alpha'_i = (a'_{i,1}, \dots, a'_{i,n})$ je paralelním průmětem e -reperu \mathfrak{E}' při promítání směrem \mathbf{S} do \mathbf{A} . Potom platí rovnice

$$\alpha'_i = t_{i,1}\alpha_1 + \dots + t_{i,n}\alpha_n \quad (i = 1, \dots, n),$$

anebo v maticovém zápisu $\mathbf{A}' = \mathbf{TA}$, kde $\mathbf{A} = \|a_{i,j}\|$, $\mathbf{A}' = \|a'_{i,j}\|$. Označme τ tu ortogonální transformaci prostoru \mathbf{E} , při níž je vektoru e_i přiřazen vektor e'_i pro všechna $i = 1, \dots, n$; obdobně označme $\tilde{\tau}$ tu afinní transformaci m -roviny \mathbf{A} , při níž je vektoru α_i přiřazen vektor α'_i pro každé $i = 1, \dots, n$. Jako závěr vyslovíme pak

Tvrzení 1. *Je-li soustava \mathfrak{A} paralelním průmětem e -reperu \mathfrak{E} při promítání směrem \mathbf{S} a je-li τ ortogonální transformace (neměňící počátek O), pak soustava $\tilde{\tau}\mathfrak{A}$ je paralelním průmětem e -reperu $\tau\mathfrak{E}$ rovněž při směru promítání \mathbf{S} .*

B) Gramova matice soustavy \mathfrak{A} , tj. matice $\mathbf{AA}^* = \|a_i a_j\|$ je symetrická a lze ji tedy uvést na diagonální tvar prostřednictvím vhodné ortogonální matice \mathbf{M} řádu n -tého:¹⁾

$$\mathbf{M}(\mathbf{AA}^*) \mathbf{M}^* = (\mathbf{MA})(\mathbf{MA})^*.$$

Označme dále \mathfrak{A} soustavu řádkových vektorů $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ matice $\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{MA}$. Bez omezení obecnosti předpokládejme, že jde o takové pořadí, při němž $|a_1| \geq$

¹⁾ Hvězdičkou značíme matici transponovanou.

$\geq \dots \geq |a_n|$. Z diagonálního tvaru matice $\bar{\mathbf{A}}$ pak vyplývá, že vektory $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ jsou navzájem kolmé a právě posledních $n - m$ z nich je nulových.

Dokážeme

Tvrzení 2. Je-li $n \geq 2m - 1$, pak existuje soustava vektorů $\bar{e}_1 = \overrightarrow{O\bar{E}_1}, \dots, \bar{e}_m = \overrightarrow{O\bar{E}_m}$ navzájem kolmých a stejně dlouhých, které jsou v \mathbf{E} kolmými průměty soustavy vektorů $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m$ při projekci do m -roviny $O\bar{E}_1 \dots \bar{E}_m$.

Důkaz. Mějme soustavu vektorů $\bar{e}_1 = (d, 0, \dots, 0), \bar{e}_2 = (0, d, 0, \dots, 0), \dots, \bar{e}_m = (\underbrace{0, \dots, 0}_{m-1}, d, 0, \dots, 0)$, kde $0 < d < |a_m|$. Položme $\bar{a}_j = (\underbrace{0, \dots, 0}_{j-1}, d, \underbrace{0, \dots, 0}_{m-j}, d_{j,1}, \dots, d_{j,n-m})$; $j = 1, \dots, m$.

Je-li $n \geq 2m$, pak lze vždy sestrojit navzájem kolmé vektory $\delta_1, \dots, \delta_m$ tak, že $d^2 + \delta_1^2 = \bar{a}_1^2, \dots, d^2 + \delta_m^2 = \bar{a}_m^2$. Vyplývá to z toho, že počet m vektorů δ_j není větší než počet $n - m$ jejich složek. Je-li $n = 2m - 1$, pak zvolme $d = |a_m|$, vektor δ_m prohláše za nulový a sestrojme vektory $\delta_1, \dots, \delta_{m-1}$ tak, aby $d^2 + \delta_1^2 = \bar{a}_1^2, \dots, d^2 + \delta_{m-1}^2 = \bar{a}_{m-1}^2$. Takové vektory lze vždy sestrojit, neboť jejich počet $m - 1$ rovná se počtu jejich složek. Soustava $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m$ je shodná se soustavou $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m$ a její kolmou projekcí do m -roviny prvních m souřadnicových os je právě soustava $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_m$. Odtud důkaz.

C) Navažme na předchozí odstavec a doplníme vektory $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_m$ v d -reper $\bar{\mathcal{E}} = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$. Pak soustava $\bar{\mathcal{U}}$ je paralelním průmětem reperu $\bar{\mathcal{E}}$ při určitém směru promítání \mathbf{S} , takže podle tvrzení 1 je též soustava \mathcal{U} paralelním průmětem některého d -reperu při téže směru promítání \mathbf{S} .

Je známo, že charakteristická čísla Gramovy matice \mathbf{AA}^* rovnají se charakteristickým číslům Gramovy matice $\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{A}}^*$ (matice $\bar{\mathbf{A}}$ je definována v části B), tj. číslům $\bar{a}_1^2, \dots, \bar{a}_m^2$. Platí-li $\bar{a}_1^2 = \dots = \bar{a}_m^2$, lze položit $\bar{e}_1 = \bar{a}_1, \dots, \bar{e}_m = \bar{a}_m$ a vektory e_1, \dots, e_m doplnit v $|a_1|$ -reper. Protože soustava $\bar{\mathcal{U}}$ je ortogonálním průmětem tohoto reperu (směr \mathbf{S} je nyní kolmý k \mathbf{A}), je podle tvrzení 1 též soustava \mathcal{U} ortogonálním průmětem určitého $|a_1|$ -reperu. Mají-li aspoň dva z vektorů $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m$ různé délky, pak směr \mathbf{S} již nemůže být kolmý k \mathbf{A} . Část a) věty 1 je tím dokázána.

D) Necht' platí podmínka $n < 2m - 1$. Reper \mathcal{E}' z části A) zvolme speciálně tak, aby jeho prvních $n - m$ vektorů bylo kolmých k \mathbf{A} ; tyto vektory označme n_1, \dots, n_{n-m} . Zbývající vektory z \mathcal{E}' leží pak v \mathbf{A} a náleží též soustavě $\mathcal{U}' = \tilde{\tau}\mathcal{U}$ (viz část A)). Označme tedy $\eta_1, \dots, \eta_{n-m}$ prvních $n - m$ vektorů z \mathcal{U}' . Pak směr promítání \mathbf{S} je současně rovnoběžný s vektory $n_1 - \eta_1, \dots, n_m - \eta_m$. Speciálně pro směr \mathbf{S} kolmý k \mathbf{A} jsou vektory η_1, \dots, η_m nulové. Položme $a_{i,m+1} = \dots = a_{i,n} = 0$ a uijme označení zavedené v části A). Budeme vyšetřovat matice $\hat{\mathbf{A}} = \|a_{i,j}\|, \hat{\mathbf{A}}' = \|a'_{i,j}\|; i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$. Jest $\hat{\mathbf{A}}' = T\hat{\mathbf{A}}$ a matici $\hat{\mathbf{A}}'$ lze psát ve tvaru $\hat{\mathbf{A}}' = \left\| \begin{matrix} \hat{\mathbf{P}} \\ \hat{\mathbf{B}} \end{matrix} \right\|$ s tímto významem matic $\hat{\mathbf{P}}, \hat{\mathbf{B}} : \hat{\mathbf{P}}$

je matice, jejíž řádkové vektory vzniknou z $\eta_1, \dots, \eta_{n-m}$ vynecháním posledních $n - m$ složek. $\hat{\mathbf{B}}$ je matice, jejíž řádkové vektory vzniknou z posledních m vektorů soustavy \mathfrak{M}' vynecháním posledních $n - m$ složek; řádkové vektory matice \mathbf{B} jsou navzájem kolmé a mají společnou délku e . Platí tedy $\hat{\mathbf{B}}\hat{\mathbf{B}}^* = \hat{\mathbf{B}}^*\hat{\mathbf{B}} = e^2\mathbf{J}$, kde \mathbf{J} je diagonální jednotková matice m -tého řádu. Dále platí relace $(\hat{\mathbf{A}})^*(\hat{\mathbf{A}}) = \hat{\mathbf{A}}^*\hat{\mathbf{T}}\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{A}}^*\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{P}}^*\hat{\mathbf{P}} + \hat{\mathbf{B}}^*\hat{\mathbf{B}}$, a z toho dále $\hat{\mathbf{A}}^*\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{P}}^*\hat{\mathbf{P}} + e^2\mathbf{J}$.

Charakteristická čísla matice $\hat{\mathbf{A}}^*\hat{\mathbf{A}}$ vzniknou tedy z charakteristických čísel matice $\hat{\mathbf{P}}^*\hat{\mathbf{P}}$ vždy přičtením čísla e^2 . Seřadíme charakteristická čísla matice $\hat{\mathbf{P}}^*\hat{\mathbf{P}}$ podle velikosti; pak prvních $n - m$ z nich je nenulových a zbývající jsou nulové.²⁾ Tedy charakteristická čísla matice $\hat{\mathbf{A}}^*\hat{\mathbf{A}}$ jsou

$$c_1 + e^2 \geq \dots \geq c_{n-m} + e^2 \geq \underbrace{e^2 = \dots = e^2}_m.$$

Avšak nenulová charakteristická čísla matic $\mathbf{A}^*\mathbf{A}$, $\mathbf{A}\mathbf{A}^*$ se po řadě rovnají, takže pro charakteristická čísla $g_1 \geq \dots \geq g_n$ matice $\mathbf{A}\mathbf{A}^*$ platí relace (1), jak bylo dokázat. Jde-li o promítání ortogonální, pak vektory $\eta_1, \dots, \eta_{n-m}$ jsou nulové a platí $c_1 = \dots = c_{n-m} = 0$, takže platí relace (2). Nejde-li o promítání ortogonální, pak relace (2) neplatí.

Protože charakteristická čísla Gramovy matice $\mathbf{A}\mathbf{A}^*$ nejsou závislá na volbě pravouhého souřadnicového systému v \mathbf{E} , nebyla ani volba $a_{i,m+1} = \dots = a_{i,n} = 0$ na úkor obecnosti.

E) Nechť platí $n < 2m - 1$. Pro charakteristická čísla Gramovy matice dané soustavy \mathfrak{M} nechť je splněna podmínka (1). Podle B) stanovíme soustavu vektorů $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Při vhodném pořadí platí pak $g_1 = \bar{a}_1^2, \dots, g_n = \bar{a}_n^2$, takže relaci (1) lze přepsat do tvaru

$$|\bar{a}_1| \geq \dots \geq |\bar{a}_{n-m}| \geq |\bar{a}_{n-m+1}| = \dots = |\bar{a}_m| > |\bar{a}_{m+1}| = \dots = |\bar{a}_n| = 0.$$

Položme $\bar{e}_{n-m+1} = \bar{a}_{n-m+1}, \dots, \bar{e}_m = \bar{a}_m$ a společnou délku těchto vektorů označme d . Užijme větu 1, kde za n, m položíme hodnoty $2n - 2m, n - m$. Potom plyne v případě $n - m > 1$ tento závěr (který je pro $n - m = 1$ snadno patrný): V $(2n - 2m)$ -rovině \mathbf{R} kolmé současně k vektorům $\bar{e}_{n-m+1}, \dots, \bar{e}_m$ lze sestavit soustavu vektorů $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{n-m}$ navzájem kolmých a o společné délce d tak, že při směru \mathbf{S} (určeném v \mathbf{R} $(n - m)$ -rovinou současně kolmou k vektorům $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{n-m}$) se vektory $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_m$ promítají do vektorů $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_{n-m}$. Pak soustava \mathfrak{M} je při směru \mathbf{S} průmětem d -reperu $\mathfrak{E} = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$. Je-li navíc splněna podmínka $|\bar{a}_1| = \dots = |\bar{a}_m|$, pak směr \mathbf{S} je kolmý k \mathbf{A} ; jinak nikoliv. Část b) věty 1 je dokázána.

2. Následující větu lze snadno dokázat jako bezprostřední důsledek věty 1:

²⁾ Jsou-li \mathbf{M}, \mathbf{N} matice téhož řádu, pak maticím \mathbf{MN}, \mathbf{NM} náleží po řadě též charakteristická čísla. Doplníme tedy $\hat{\mathbf{P}}$ nulovými sloupci na matici \mathbf{P} řádu m a užijeme známého faktu, že charakteristická čísla Gramovy matice \mathbf{PP}^* jsou nezáporná.

Věta 2. Afinní transformaci α prostoru \mathbf{E} na m -rovinu $\mathbf{A} \subset \mathbf{E}$ ($2 \leq m < n$) lze rozložit v podobnost a paralelní projekci tehdy a jen tehdy, jestliže při libovolném výběru vektorů w_1, \dots, w_n navzájem kolmých, nenulových a stejně dlouhých splňují charakteristická čísla $g_1 \geq \dots \geq g_n$ Gramovy matice soustavy $\alpha w_1, \dots, \alpha w_n$ podmínku z věty 1. O projekci kolmou jde přitom právě v případě, kdy všechna nenulová charakteristická čísla se navzájem rovnají.

F) Nechť α je afinní transformace prostoru \mathbf{E} na m -rovinu $\mathbf{A} \subset \mathbf{E}$, přičemž $2 \leq m < n$. Zvolme v \mathbf{A} $(m - 1)$ -rozměrnou sféru k a stanovme jí příslušnou válcovou nadplochu $\alpha^{-1}k$. Dále zvolme v \mathbf{A} bod B a stanovme k němu příslušnou $(n - m)$ -rovinu $\mathbf{C} = \alpha^{-1}B$. Nakonec zvolme m -rovinu \mathbf{R} kolmou k \mathbf{C} . Pak $h = \mathbf{R} \cap \alpha^{-1}k$ je $(m - 1)$ -rozměrný elipsoid v \mathbf{R} . Nalezneme nutnou i postačující podmínku k tomu, aby elipsoid h byl v \mathbf{E} ortogonálním průmětem $(m - 1)$ -rozměrné sféry k (ležící v některé m -rovině \mathbf{K}). Protože parciální zobrazení α_K je pak podobností, je z toho vidět, že jde též o nutnou a postačující podmínku k tomu, aby existoval žádaný rozklad transformace α . Nejprve odvodíme pomocnou větu.

Věta 3. Nechť je dán $(m - 1)$ -rozměrný elipsoid a nechť r_1, \dots, r_m je soustava jeho hlavních poloměrů,³⁾ přičemž

$$(3) \quad |r_1| = \dots = |r_s| > |r_{s+1}| \geq \dots \geq |r_m| \quad (1 \leq s \leq m).$$

Tento elipsoid lze pokládat za ortogonální průmět určité $(m - 1)$ -rozměrné sféry tehdy a jen tehdy, když platí podmínka

$$(4) \quad n \geq 2m - s.$$

Důkaz. Položme $r_j = (\overbrace{0, \dots, 0}^{j-1}, |r_j|, \overbrace{0, \dots, 0}^{n-j})$, $e_j = (\overbrace{0, \dots, 0}^{j-1}, |r_j|, \overbrace{0, \dots, 0}^{m-j}, h_{j,1}, \dots, h_{j,n-m})$, $h_j = (h_{j,1}, \dots, h_{j,n-m})$; $j = 1, \dots, m$. Vektory e_1, \dots, e_m jsou navzájem kolmé a mají společnou délku $|r_1|$ tehdy a jen tehdy, když vektory h_1, \dots, h_m jsou navzájem kolmé, přičemž $r_1^2 + h_1^2 = r_1^2, \dots, r_m^2 + h_m^2 = r_m^2$. Avšak existence vektorů h_1, \dots, h_m závisí právě na počtu $m - s$ nenulových z nich a počtu $n - m$ složek: Vektory h_1, \dots, h_m existují právě tehdy, když $m - s \leq n - m$. Odtud důkaz.

K větě 3 připojíme ještě větu, jejíž důkaz je zcela analogický.

Věta 3'. Nechť je dán $(m - 1)$ -rozměrný elipsoid s hlavními poloměry r_1, \dots, r_m , přičemž

$$|r_1| \geq \dots \geq |r_{m-t}| > |r_{m-t+1}| = \dots = |r_m| \quad (1 \leq t \leq m).$$

Podmínka $n \geq 2m - t$ je pak nutná i stačí k tomu, aby existovala $(m - 1)$ -rozměrná sféra, která je ortogonálním průmětem daného elipsoidu.

Větu 3' však potřebovat nebudeme. Vrátime se k větě 3; z ní a z F) plyne tento důležitý výsledek:

³⁾ Hlavní poloměry (jakožto vektory) jsou sdružené a navzájem kolmé.

Věta 4. *Nechť α je afinní transformace prostoru \mathbf{E} na m -rovinu $\mathbf{A} \subset \mathbf{E}$, přičemž $2 \leq m < n$; necht \mathbf{V} , resp. v jsou úplné vzory bodu, resp. $(m - 1)$ -rozměrné sféry z \mathbf{A} ; $(m - 1)$ -rozměrný elipsoid, který je průnikem nadplochy v s m -rovinou \mathbf{R} kolmou k \mathbf{V} , necht má hlavní poloměry r_1, \dots, r_m , uspořádané tak že platí (3). Rozklad transformace α v podobnost a paralelní projekci existuje potom právě tehdy, platí-li podmínka (4).*

3. Obrátme pozornost k rozšířenému n -rozměrnému prostoru $\mathbf{E}^+ \supset \mathbf{E}$. Mějme dány neafinní lineární transformaci λ prostoru \mathbf{E}^+ na vlastní m -rovinu $\mathbf{A} \subset \mathbf{E}^+$; $2 \leq m < n$. Označme \mathbf{S} singulární $(n - m - 1)$ -rovinu vzhledem k λ . Dále definujeme nadrovinu \mathbf{N} jako úplný vzor nevlastní $(m - 1)$ -roviny $\mathbf{B} \subset \mathbf{A}$ při λ . Nalezneme nutnou a postačující podmínku k tomu, aby se transformace λ dala rozložit v centrální projekci a shodnost.

G) Příklad $m = n - 1$ vede k jednoduchému závěru. Nadrovina \mathbf{N} má pak tuto vlastnost: Je-li \mathbf{L} libovolná vlastní nadrovina neprocházející bodem \mathbf{S} , pak parciální zobrazení λ_L nadroviny \mathbf{L} na \mathbf{A} je afinní transformací právě tehdy, když nadroviny \mathbf{L} , \mathbf{N} jsou rovnoběžné. Probíhá-li $\mathbf{L} \neq \mathbf{N}$ nadroviny rovnoběžné s \mathbf{N} , pak se parciální zobrazení λ_L od sebe liší pouze homotetiemi o středu \mathbf{S} . Z toho již vyplývá věta, kterou nyní vyslovíme.

Věta 5a. *Nechť λ je neafinní lineární transformace prostoru \mathbf{E}^+ na vlastní nadrovinu $\mathbf{A} \subset \mathbf{E}^+$. Tuto transformaci lze rozložit v centrální projekci a shodnost tehdy a jen tehdy, platí-li podmínka: 1. Existuje nadrovina \mathbf{L} , která indukuje afinní parciální zobrazení λ_L .*

Lze ukázat, že podmínku 1 lze vyjádřit ještě dvěma dalšími způsoby: 2. Transformace λ převádí absolutní polaritu prostoru \mathbf{E}^+ ve sférickou anti-polaritu m -roviny \mathbf{A} . 3. Přebádá-li transformace λ dvojici perspektivních $(n - 1)$ -simplexů $\{A_i\}_1^n$, $\{B_i\}_1^n$ opět ve dvojici perspektivních $(n - 1)$ -simplexů $\{A'_i\}_1^n$, $\{B'_i\}_1^n$ a jsou-li $\{C_i\}_1^n$, $\{D'_i\}_1^n$ úběžníkové simplexu s vrcholy $C_i \in A_i B_i$, resp. $D'_i \in A'_i B'_i$, pak simplexu $\{C_i\}_1^n$, $\{D'_i\}_1^n$ jsou podobné.⁴⁾

Pro $n = 3$ stanovil podmínku 2 L. HOFMANN a podmínku 3 E. A. MČEDLÍŠVILI; viz [1], str. 40 a [4], str. 167–168.

H) Necht $m < n - 1$. Pak má nadrovina \mathbf{N} tuto vlastnost: Je-li \mathbf{L} libovolná vlastní m -rovina disjunktní s \mathbf{S} , pak parciální zobrazení λ_L je afinní právě tehdy, když \mathbf{L} je rovnoběžno s \mathbf{N} . Speciálně vedou k podobnostem λ_L nejvyšší ty m -roviny \mathbf{L} , které jsou rovnoběžné s \mathbf{N} (a ovšem disjunktní s \mathbf{N}). Zvolme tedy kteroukoliv $(m - 1)$ -rozměrnou sféru k v \mathbf{A} a kteroukoliv nadrovinu $\mathbf{M} \neq \mathbf{N}$ rovnoběžnou s \mathbf{N} . Položme $v = \lambda^{-1}k \cap \mathbf{M}$; útvar v je válcovou varietou, je to lineární obal nevlastní $(n - m - 2)$ -roviny $\mathbf{S}' = \mathbf{S} \cap \mathbf{M}$ s libovolným z $(m - 1)$ -rozměrných elipsoidů v \mathbf{M} , jemuž odpovídá v transformaci λ sféra k . Konečně zvolme v \mathbf{M} některou m -rovinu \mathbf{R} kolmou v \mathbf{M} k \mathbf{S} a označme h

⁴⁾ Jde o simplexu s vlastními vrcholy, perspektivní podle vlastního středu. Úběžníkem rozumí se vzor anebo obraz nevlastního bodu při λ .

$(m - 1)$ -rozměrný elipsoid splňující podmínky $h \subset \mathbf{R}$, $\lambda h = k$. Necht r_1, \dots, r_m jsou hlavní poloměry elipsoidu h uspořádané tak, že platí (3). Podle věty 3a (kde n nahradíme hodnotou $n - 1$) je h v \mathbf{M} kolmým průmětem některé $(m - 1)$ -rozměrné sféry v \mathbf{M} tehdy a jen tehdy, platí-li podmínka

$$(5) \quad n - 1 \geq 2m - s.$$

Existují-li podobnosti λ_L , pak existuje mezi nimi též shodnost; získáme ji při vhodné volbě nadroviny \mathbf{M} . Z našich úvah vyplývá tento výsledek:

Věta 5b. *Necht λ je neafinní lineární transformace prostoru \mathbf{E}^+ na vlastní m -rovinu $\mathbf{A} \subset \mathbf{E}^+$; $2 \leq m < n - 1$. Pak transformaci λ lze rozložit v centrální projekci a shodnost právě tehdy, platí-li (5); význam hodnoty s je stanoven v předchozím.*

I. Případ $m < n - 1$ vyšetříme ještě druhým způsobem. Zvolme ortogonální zobrazení ω převádějící m -rovinu \mathbf{A} v m -rovinu \mathbf{A}' ležící v nadrovině $\mathbf{M} \neq \mathbf{N}$ rovnoběžné s \mathbf{N} . Parciální zobrazení $(\lambda\omega)_M = \lambda'$ je afinní transformací nadroviny M na m -rovinu \mathbf{A}' se singulární nevlastní $(n - m - 2)$ -rovinou $\mathbf{S}' = \mathbf{S} \cap \mathbf{M}$. Žádaný rozklad transformace λ ve shodnost a centrální projekci existuje pak právě tehdy, lze-li transformaci λ' rozložit v podobnost a paralelní projekci. Platí tedy tato věta:

Věta 5b'. *Necht λ je neafinní lineární transformace prostoru \mathbf{E}^+ na m -rovinu $\mathbf{A} \subset \mathbf{E}^+$; $2 \leq m < n - 1$. Je-li w_1, \dots, w_{n-1} libovolná soustava nenulových vektorů navzájem kolmých a stejně dlouhých v nadrovině \mathbf{M} a jsou-li $g_1 \geq \dots \geq g_{n-1}$ charakteristická čísla Gramovy matice soustavy $\lambda'w_1, \dots, \lambda'w_{n-1}$, pak transformaci λ lze rozložit ve shodnost a centrální projekci právě tehdy, když platí tato podmínka: Jsou-li čísla g_{n-m}, \dots, g_m nenulová, pak se navzájem rovnají. Význam \mathbf{M} a λ' stanoven před zněním věty.*

4. Afinní transformaci prostoru \mathbf{E} na přímku a lze vždy rozložit v podobnost a paralelní projekci. Rovněž tak neafinní lineární transformaci prostoru \mathbf{E}^+ na vlastní přímku lze vždy rozložit ve shodnost a centrální projekci. Jednoduchý důkaz obou tvrzení zde neuvádíme.

Problematiku tohoto článku lze rozšířit na pseudo-eukleidovské prostory, v nichž je definována metrika $\rho(X, Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i (x_i - y_i)^2}$; $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$, $\varepsilon_i = \pm 1$; viz např. [5].

Na závěr uvedme neřešený problém rozkladu nesingulární afinní transformace prostoru \mathbf{E} v podobnost a afinní m -transformaci, resp. problém rozkladu nesingulární afinní lineární transformace prostoru \mathbf{E}^+ ve shodnost a lineární m -transformaci.⁵⁾ Dosud je známo řešení pouze pro speciální hodnoty m .

⁵⁾ Lineární m -transformace má dva maximální podprostory samodružných bodů, a to m -rovinu a $(n - m - 1)$ -rovinu; u afinní m -transformace je zmíněná $(n - m - 1)$ -rovina nevlastní.

Literatura

- [1] *L. Hofmann*: Die achsonometrischen Sätze von Kruppa und Pohlke's Satz im nicht-euklidischen Raume. Sitzber. Ak. Wiss. Wien, Math.-nat. Kl., IIa, 135 (1926), 33—60.
- [2] *E. Stiefel*: Zum Satz von Pohlke. Comm. Math. Helv. 10 (1937/38), 208—225.
- [3] *H. Hadwiger*: Über ausgezeichnete Vektorsterne und reguläre Polytope. Comm. Math. Helv. 13 (1940—41), 90—107.
- [4] *Е. А. Мчедлцивили*: Проективные основания начертательной геометрии. Труды Груз. полит. инст. Тбилиси 19 (1949), 115—190.
- [5] *R. Steinbeck*: Note on the theorem of Hadwiger. Pac. Journ. of Math. 6 (1956), 775—777.
- [6] *H. Naumann*: Über Vektorsterne und Parallelprojektionen regulärer Polytope. Math. Zeitschr. 67 (1957), 75—82.

Резюме

О РАЗЛОЖЕНИИ ОСОБЕННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ (Václav Havel), Брно

В статье доказываются следующие теоремы для n -мерного евклидова пространства:

Аффинное преобразование α данного пространства на его t -плоскость можно разложить на подобие и параллельное проектирование если и только если для любого выбора n векторов w_i , перпендикулярных друг другу и одинаковой (ненулевой) длины, характеристические числа $g_1 \geq \dots \geq g_n$ матрицы Грама системы αw_i выполняют следующее условие: Если значения g_{n-m+1}, \dots, g_m — ненулевые, то они равны между собой. Притом с ортогональным проектированием мы имеем дело тогда и только тогда, если все ненулевые характеристические числа равны между собой.

Пусть α -аффинное преобразование данного пространства на его t -плоскость, пусть притом \mathbf{V} , соотв. v -полные прообразы точки, соотв. $(t-1)$ -мерной сферы из данной t -плоскости; пусть $(t-1)$ -мерный эллипсоид, являющийся пересечением гиперповерхности \mathbf{V} с t -плоскостью \mathbf{R} , перпендикулярной к \mathbf{V} , имеет главные радиусы r_j ; $|r_1| = \dots = |r_s| > |r_{s+1}| \geq \dots \geq |r_m|$, $1 \leq s \leq t$. Тогда разложение преобразования α на подобие и параллельное проектирование существует если и только если $n \geq 2t - s$.

На основании этих результатов далее выводятся также необходимые и достаточные условия того, чтобы данное особенное линейное преобразование расширенного пространства можно было разложить на тождество и проектирование.

Проблематика статьи непосредственно примыкает к некоторым проблемам московского геометрического семинара проф. Н. Ф. Четверухина.

Zusammenfassung

ÜBER DIE ZERLEGUNG DER SINGULÄREN LINEAREN TRANSFORMATIONEN

VÁCLAV HAVEL, Brno

In diesem Artikel werden folgende Sätze für den n -dimensionalen euklidischen Raum bewiesen:

Eine (singuläre) Affinität α des gegebenen Raumes auf seine m -Ebene lässt sich gerade dann in eine Ähnlichkeit und Parallelprojektion zerlegen, wenn ein beliebiges n -Bein von gleichlangen orthogonalen Vektoren w_i folgende Bedingung erfüllt: Sind $g_1 \geq \dots \geq g_n$ die Eigenwerte der Gramschen Matrix von $\alpha w_1, \dots, \alpha w_n$ und sind g_{n-m+1}, \dots, g_m von Null verschieden, so ist $g_{n-m+1} = \dots = g_m$. Um die Orthogonalprojektion handelt es sich dabei gerade im Falle der Gleichheit aller nichtverschwinden Eigenwerte.

Es sei α eine (singuläre) Affinität des gegebenen Raumes auf seine m -Ebene, dabei seien \mathbf{V} bzw. v volle Urbilde eines Punktes bzw. einer $(m-1)$ -dimensionalen Sphäre aus der gegebenen m -Ebene; endlich seien r_1, \dots, r_m mit $|r_1| = \dots = |r_s| > |r_{s+1}| \geq \dots \geq |r_m|$ ($1 \leq s \leq m$) die Halbachsen eines solchen $(m-1)$ -dimensionalen Ellipsoides, das als Durchschnitt von v mit einer m -Ebene $\mathbf{R} \perp \mathbf{V}$ entsteht. Dann kann man α in eine Ähnlichkeit und Parallelprojektion gerade im Falle $n \geq 2m - s$ zerlegen.

Auf Grund dieser Resultate sind weiter auch die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Existenz einer entsprechenden Zerlegung (auf Ähnlichkeit und Projektion) der gegebenen singulären Kollineation des n -dimensionalen projektiven Raumes gewonnen.

Der Gegenstand des Artikles hängt eng mit einigen Problemen des geometrischen Seminars von Prof. N. F. Četveruchin (Moskva) zusammen.