

Antonín Sochor

Poznámky o linearitě zobrazení E_m do E_m

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 87 (1962), No. 3, 290--295

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117441>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1962

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

POZNÁMKY O LINEARITĚ ZOBRAZENÍ E_m DO E_m

ANTONÍN SOCHOR, Praha

(Došlo dne 14. prosince 1960, v nové úpravě dne 14. března 1961)

V této práci jsou udány postačující podmínky pro to, aby prosté zobrazení E_m do E_m , $m \geq 2$, bylo lineární.

Ve speciální teorii relativity se při odvozování Lorentzových transformací vychází z požadavku, aby pohyb hmotné částice, který se jeví rovnoměrným a přímočarým jednomu pozorovateli P , byl rovnoměrným a přímočarým pohybem i vzhledem ke každému pozorovateli \bar{P} , který se vzhledem k P pohybuje rovnoměrně a přímočaře. Jedním ze základních poznatků, ze kterých vychází speciální teorie relativity, jest, že pohyb kterékoli hmotné částice se může dít pouze rychlostí menší než je rychlost světla c .

Užíváme-li k popisu pohybů prostoročasu, tj. čtyřrozměrného aritmetického prostoru E_4 (se speciální metrikou), jsou trajektorie rovnoměrně přímočaře se pohybujících hmotných částic přímkami v E_4 , které lze popsat rovnicemi

$$x_k = V_k x_0 + A_k \quad (k = 1, 2, 3),$$

kde x_0 je čas, x_1, x_2, x_3 prostorové souřadnice, V_k složky rychlosti ve směru k -té osy a A_k složky radiusvektoru, který udává polohu hmotného bodu v čase $x_0 = 0$. Tyto přímký splňují podle hořejšího požadavek $V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 < c^2$, který lze pro případ, že hmotný bod má v čase $x_0 = 0$ polohu $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, vyjádřit také takto: Jsou to přímký, pro jejichž každý bod $[x_1, \dots, x_m] \neq [0, \dots, 0]$ platí podmínka

$$(1) \quad \sum_{k=2}^m x_k^2 < c^2 x_1^2.$$

Lorentzovy transformace jsou tedy prostá zobrazení E_4 na E_4 , která převádějí každou přímkou rovnoběžnou s některou přímkou z kužele (1) v přímkou.

Tato práce vznikla zobrazením otázky, je-li zobrazení splňující tuto podmínku již lineární.

Je ukázáno, že předpokládáme-li spojitost uvažovaného zobrazení aspoň na jedné přímce, je toto zobrazení lineární již tehdy, přejdou-li všechny přímký rovnoběžné s jistými konečně mnoha přímkami v přímkou. Na příkladě je ukázáno, že za těchto zeslabených předpokladů nelze požadavek spojitosti na jedné přímce vynechat.

Pro případ, že všechny přímky rovnoběžné s přímkami z nějakého kužele přejdou v přímky, je linearita uvažovaného zobrazení dokázána bez předpokladu spojitosti.

Zaveďme toto

Označení. Buď F prosté zobrazení prostoru E_m do E_m , $m \geq 2$. Buď \mathfrak{P} množina všech přímek P takových, že pro každou přímku Q , rovnoběžnou s P , je $F(Q)$ přímka. Dále buď \mathfrak{R} množina všech rovin, obsahujících tři různé přímky z \mathfrak{P} , procházející týmž bodem.

Lemma 1. Jsou-li P, Q různoběžky z \mathfrak{P} , jsou $F(P), F(Q)$ opět různoběžky.

Důkaz. Podle předpokladu jsou $F(P), F(Q)$ přímky. Protože zobrazení F je prosté, je $F(P) \neq F(Q)$; zřejmě $F(P) \cap F(Q) \neq \emptyset$.

Lemma 2. Je-li $q \in \mathfrak{R}$, je $F(q)$ část roviny.

Důkaz. Buďte A, B, C různé přímky z \mathfrak{P} , ležící v q a procházející týmž bodem. Přímky $F(A), F(B)$ určují podle lemmatu 1 jakousi rovinu σ . Buď x libovolný bod množiny $q - C$. Bodem x prochází přímka R rovnoběžná s C ; $F(R)$ je přímka, mající společný bod jak s $F(A)$ tak i s $F(B)$, při čemž tyto body jsou různé. Je tedy $F(x) \in F(R) \subset \sigma$. Je-li $x \in C$, existuje přímka S rovnoběžná s A taková, že $x \in S$. Podle předpokladu je $S \in \mathfrak{P}$, takže $Q = F(S)$ je přímka. Podle toho, co jsme právě dokázali, je $y \in \sigma$ pro každý bod $y \in Q$, $y \neq F(x)$. Odtud plyne ihned, že $F(x) \in Q \subset \sigma$.

Lemma 3. Jestliže P, Q jsou dvě různé rovnoběžky z \mathfrak{P} a jestliže $P \cup Q \subset \sigma \in \mathfrak{R}$, pak $F(P), F(Q)$ jsou opět rovnoběžky.

Důkaz. Podle lemmatu 2 leží přímky $F(P), F(Q)$ v téže rovině; protože F je prosté zobrazení, je $F(P) \cap F(Q) = \emptyset$.

Lemma 4. Necht' $A, B, C \in \mathfrak{P}$. Budiž dán rovnoběžník o stranách rovnoběžných s A, B a jedné úhlopříčce rovnoběžné s C ; druhou úhlopříčku označme písmenem D . Potom je $F(D)$ část přímky.

Důkaz. Buďte x, y, z libovolné tři body přímky D . Sestrojme dva rovnoběžníky s vrcholem x a protějšími vrcholy po řadě y, z takové, že strany procházející bodem x jsou rovnoběžné s A, B . Podle lemmat 1 a 3 jsou obrazy těchto rovnoběžníků opět rovnoběžníky, které mají dvě strany totožné a jejichž úhlopříčky neprocházející bodem $F(x)$ jsou rovnoběžné. Odtud plyne, že i úhlopříčky procházející bodem $F(x)$ jsou rovnoběžné a tedy totožné. To znamená, že body $F(x), F(y), F(z)$ leží na jedné přímce.

Lemma 5. Necht' $q, \sigma \in \mathfrak{R}$, $P = q \cap \sigma \in \mathfrak{P}$. Potom pro každou přímku Q rovnoběžnou s P je přímka $F(Q)$ rovnoběžná s $F(P)$.

Důkaz. Jestliže Q leží v q nebo v σ , použijeme lemmatu 3. Necht' tedy $Q \cap (q \cup \sigma) = \emptyset$. Buď q_1 rovina rovnoběžná s q a procházející přímkou Q . Potom je $P_1 = q_1 \cap \sigma$ přímka rovnoběžná s P a podle lemmatu 3 je $F(P_1)$ přímka rovnoběžná s $F(P)$. Snadno se zjistí, že je též $q_1 \in \mathfrak{R}$. Odtud a z lemmatu 3 plyne, že jsou přímky $F(P_1)$ a $F(Q)$ a tedy i přímky $F(P)$ a $F(Q)$ rovnoběžné.

Označení. Je-li P k -rozměrný prostor se zvolenou souřadnou soustavou a jsou-li a_1, \dots, a_k reálná čísla, pak symbolem $[a_1, \dots, a_k]$ nebo $\{a_j\}_{j=1}^k$ označíme bod o souřadnicích a_j ; ze souvislosti bude vždy patrné, který prostor a která souřadná soustava se míní.

Buď dále $\varrho \in \mathfrak{R}$ a buďte A, B dvě různoběžky z \mathfrak{P} , které leží v ϱ . Zvolme v ϱ takovou souřadnou soustavu, aby přímka A (resp. B) byla množina těch bodů, jejichž druhá (resp. první) souřadnice je nula. V rovině, určené přímkami $F(A), F(B)$ určíme takovou souřadnou soustavu, aby platilo $F([0, 0]) = [0, 0]$, $F([1, 0]) = [1, 0]$, $F([0, 1]) = [0, 1]$, což lze, neboť přímky $F(A)$ a $F(B)$ jsou podle lemmatu 1 různoběžné.

Definujme nyní na množině všech reálných čísel funkce Φ, Ψ předpisem $F([a, 0]) = [\Phi(a), 0]$, $F([0, a]) = [0, \Psi(a)]$.

Lemma 6. Pro všechna reálná a, b je

$$\Phi\left(\frac{1}{2}(a + b)\right) = \frac{1}{2}(\Phi(a) + \Phi(b)).$$

Důkaz. Můžeme předpokládat, že $a \neq b$. Existuje přímka $C \in \mathfrak{P}$ taková, že $A \neq C \neq B$, $C \subset \varrho$ a že $A \cap B \cap C \neq \emptyset$. Nad úsečkou o koncových bodech $[a, 0]$, $[b, 0]$ sestrojme rovnoběžník o stranách rovnoběžných s B, C . Bod $[\frac{1}{2}(a + b), 0]$ je pak průsečíkem obou úhlopříček. Podle lemmat 1 a 3 přejde při zobrazení F tento rovnoběžník opět v rovnoběžník; úhlopříčky se protínají v bodě $[\frac{1}{2}(\Phi(a) + \Phi(b)), 0] \in F(A)$. Podle lemmatu 4 je tento bod obrazem bodu $[\frac{1}{2}(a + b), 0]$.

Lemma 7. Pro všechna reálná a, b je $\Phi(a + b) = \Phi(a) + \Phi(b)$.

Důkaz. Z definice funkce Φ plyne ihned, že $\Phi(0) = 0$. Podle lemmatu 6 je tedy $\Phi(a) = \Phi(\frac{1}{2}(2a + 0)) = \frac{1}{2}\Phi(2a) + \frac{1}{2}\Phi(0) = \frac{1}{2}\Phi(2a)$, takže $\Phi(a + b) = \Phi(\frac{1}{2}(2a + 2b)) = \frac{1}{2}\Phi(2a) + \frac{1}{2}\Phi(2b) = \Phi(a) + \Phi(b)$.

Lemma 8. Pro každé racionální a je $\Phi(a) = a$. (Plyne snadno ze vztahu $\Phi(1) = 1$ a z lemmatu 7.)

Lemma 9. Buď C taková přímka, že $A \neq C \neq B$, $C \in \mathfrak{P}$, $C \subset \varrho$, $A \cap B \cap C \neq \emptyset$ (taková přímka C existuje). Buď c takové číslo, že přímka, procházející body $[c, 0]$ a $[0, 1]$, je rovnoběžná s C . Potom existuje takové reálné k , že pro všechna a je $\Psi(a) = k \cdot \Phi(ca)$.

Důkaz. Zvolme $a \neq 0$. Přímka, procházející body $[ac, 0]$ a $[0, a]$, je rovnoběžná s přímkou C ; její obraz je přímka, procházející body $[\Phi(ac), 0]$ a $[0, \Psi(a)]$, a podle lemmatu 3 je rovnoběžná s přímkou $F(C)$. Poměr $\Psi(a) : \Phi(ac)$ nezávisí tedy na a .

Věta 1. Buď $m \geq 2$. Necht' existují přímky $A_1, \dots, A_m \in \mathfrak{P}$ s těmito vlastnostmi:

1. Všechny přímky A_i procházejí jedním bodem x , ale neleží v téže $(m - 1)$ -rozměrné nadrovině.
2. Rovina, určená přímkami A_{i-1}, A_i , patří do \mathfrak{R} pro $i = 1, \dots, m$ (klademe $A_0 = A_m$).

3. Zobrazení F je spojitě na přímce A_1 .

Potom je zobrazení F lineární.

Důkaz. Zvolme takový souřadný systém, aby bod x byl počátkem a přímky A_i souřadnými osami. Buď v_i vektor o počátečním bodě $y = F(x) = F([0, \dots, 0])$ a koncovém bodě $F([\{\delta_{ij}\}_{j=1}^m])$. Definujme funkce Φ_i vztahem $F([\{a\delta_{ij}\}_{j=1}^m]) = y + \Phi_i(a) v_i$ (a reálné, $i = 1, \dots, m$). Je-li P přímka rovnoběžná s některou přímkou A_i , jsou podle předpokladu 2 a podle lemmatu 5 (pro $m = 2$ podle lemmatu 3) přímky $F(P), F(A_i)$ rovnoběžné. Odtud snadno plyne, že pro libovolná reálná a_1, \dots, a_m je

$$(2) \quad F([a_1, \dots, a_m]) = y + \sum_{i=1}^m \Phi_i(a_i) v_i.$$

Pomocí spojitosti zobrazení F na přímce A_1 a pomocí lemmatu 8 zjistíme, že $\Phi_1(a) = a$ pro každé a . Položme nyní v lemmatu 9 $A = A_1, B = A_2$. Existují taková k, c , že $\Phi_2(a) = k \Phi_1(ac) = kca$. Dosaďme-li sem $a = 1$, dostaneme vztah $kc = 1$, takže $\Phi_2(a) = a$ pro všechna a . Stejně se nahlédne, že $\Phi_3(a) = a$ atd. Podle (2) je tedy $F([a_1, \dots, a_m]) = y + \sum_{i=1}^m a_i v_i$. Tím je věta dokázána.

Věta 2. Buď $c > 0$. Buď \mathfrak{P}_0 množina všech přímek, jejichž každý bod různý od počátku leží v kuželi $\sum_{i=2}^m x_i^2 < cx_1^2$. Předpokládejme, že $\mathfrak{P}_0 \subset \mathfrak{P}$. Potom je F lineární.

Důkaz. Zvolme takovou souřadnou soustavu, aby přímky

$$A_i = \{x_1 = \dots = x_{i-1} = x_{i+1} = \dots = x_m = 0\} \quad (i = 1, \dots, m)$$

patřily do \mathfrak{P}_0 a aby přímky

$$C_i = \{x_1 = \dots = x_{i-1} = x_{i+2} = \dots = x_m = 0, x_i + x_{i+1} = 1\} \\ (i = 1, \dots, m)$$

patřily do \mathfrak{P} . Taková volba je možná. Buď nyní v_i vektor o počátečním bodě $y = F([0, \dots, 0])$ a koncovém bodě $F([\{\delta_{ij}\}_{j=1}^m])$. Definujme funkce Φ_i předpisem $F([\{a\delta_{ij}\}_{j=1}^m]) = y + \Phi_i(a) v_i$. Položme v lemmatu 9 $A = A_1, B = A_2, C = C_1$. Podle volby přímky C je $c = 1$, takže $\Phi_2(a) = k \Phi_1(a)$; dosaďme-li sem $a = 1$, vidíme, že $\Phi_2(a) = \Phi_1(a)$. Stejně se dokáže, že $\Phi_3(a) = \Phi_1(a)$ atd. Pišme tedy $\Phi_i(a) = \Phi(a)$. Každá rovina, obsahující nějakou přímku z \mathfrak{P}_0 , patří zřejmě do \mathfrak{R} ; odtud snadno plyne, že pro $m > 2$ je každá z přímek A_i průnikem dvou rovin z \mathfrak{R} . Podobnou úvahou jako v důkaze předešlé věty zjistíme, že pro libovolná reálná a_1, \dots, a_m platí

$$(3) \quad F([a_1, \dots, a_m]) = y + \sum_{i=1}^m \Phi(a_i) v_i.$$

Zvolme nyní reálné a ; dokážeme, že

$$(4) \quad (\Phi(a))^2 = \Phi(a^2).$$

Můžeme předpokládat, že $a \neq 0$. Snadno se zjistí, že aspoň jedna z úhlopříček rovnoběžníka o vrcholech $[0, \dots, 0]$,

$$x_1 = [\{\delta_{1j}\}_{j=1}^m], \quad x_2 = [a\delta_{2j}\}_{j=1}^m], \quad [\{\delta_{1j} + a\delta_{2j}\}_{j=1}^m]$$

leží v \mathfrak{P} . Buď P přímka, procházející body x_1, x_2 . Podle lemmatu 4 je $F(P)$ část přímky Q , která prochází body $F(x_1) = y + v_1, F(x_2) = y + v_2 \Phi(a)$. Přímka P je určena rovnicemi $ax_1 + x_2 = a, x_3 = \dots = x_m = 0$; bod $Z = [a\delta_{1j} + (a - a^2)\delta_{2j}\}_{j=1}^m$ leží tedy na P . Přímka Q je množina bodů $y + \alpha v_1 + \beta v_2$, kde $\alpha \Phi(a) + \beta = \Phi(a)$. Protože $F(Z) = y + \Phi(a)v_1 + \Phi(a - a^2)v_2 \in Q$, je $(\Phi(a))^2 + \Phi(a - a^2) = \Phi(a)$. Odtud a z lemmatu 7 plyne ihned (4).

Je-li nyní $x < y$, existuje reálné číslo a takové, že $x - y = a^2$. Podle lemmatu 7 a podle (4) je tedy $\Phi(y) - \Phi(x) = (\Phi(a))^2 > 0$. Vidíme, že zobrazení Φ zachovává uspořádání; odtud a z lemmatu 8 ihned plyne, že Φ je identita. Podle (3) je tedy zobrazení F lineární.

Následující příklad ukazuje, že věta 1 neplatí bez předpokladu spojitosti.

Příklad. Ze známého Zornova lemmatu snadno plyne, že existuje množina $M \subset \mathbf{E}_1$ s těmito vlastnostmi:

- $1 \in M$;
- žádný prvek množiny M nelze vyjádřit jako lineární kombinaci s racionálními koeficienty jiných prvků z M ;
- každé reálné číslo lze vyjádřit jako lineární kombinaci s racionálními koeficienty prvků z M .

Zvolme čísla $x_1, x_2 \in M$ tak, aby bylo $1 \neq x_1 \neq x_2 \neq 1$; buď K množina všech lineárních kombinací s racionálními koeficienty prvků množiny $M - \{1, x_1, x_2\}$. Každé $x \in \mathbf{E}_1$ lze jednoznačně vyjádřit ve tvaru $x = k_0 + k_1x_1 + k_2x_2 + z$, kde k_i jsou racionální a $z \in K$. Položme nyní $\Phi(x) = k_0 + k_2x_1 + k_1x_2 + z$ a pro každý bod $[x, y] \in \mathbf{E}_2$ definujme $F([x, y]) = [\Phi(x), \Phi(y)]$. Zřejmě $\Phi(\Phi(x)) = x, F(F([x, y])) = [x, y]$; odtud plyne, že F je prosté zobrazení \mathbf{E}_2 na \mathbf{E}_2 .

Buďte α, β racionální čísla, $|\alpha| + |\beta| > 0$, a buď P přímka $\alpha x + \beta y = 0$. Dokážeme, že zobrazení F převádí každou přímku Q , která je rovnoběžná s P , zase v přímku. Buď tedy Q přímka $\alpha x + \beta y = \gamma$ ($\gamma \in \mathbf{E}_1$) a buď $[x_0, y_0] \in Q$. Existují racionální čísla r_i, s_i a prvky t, v množiny K tak, že

$$x_0 = r_0 + r_1x_1 + r_2x_2 + t, \quad y_0 = s_0 + s_1x_1 + s_2x_2 + v;$$

zřejmě $\gamma = \alpha r_0 + \beta s_0 + (\alpha r_1 + \beta s_1)\bar{z}_1 + (\alpha r_2 + \beta s_2)\bar{z}_2 + \alpha t + \beta v$. Snadno se přesvědčíme, že $\Phi(\gamma) = \alpha \Phi(x_0) + \beta \Phi(y_0)$; to však znamená, že bod $F([x_0, y_0])$ leží na přímce Q_1 o rovnici $\alpha x + \beta y = \Phi(\gamma)$. Dokázali jsme, že $F(Q) \subset Q_1$. Stejně se zjistí, že množina $F(Q_1)$ je částí přímky o rovnici $\alpha x + \beta y = \Phi(\Phi(\gamma))$; protože $\Phi(\Phi(\gamma)) = \gamma$, je $F(Q_1) \subset Q$ a tedy $Q_1 = F(F(Q_1)) \subset F(Q)$. Odtud a ze vztahu $F(Q) \subset Q_1$ plyne, že $F(Q) = Q_1$.

Vidíme, že existuje nekonečně mnoho přímek, které procházejí počátkem a patří do \mathfrak{P} . Označme ještě symbolem R množinu všech $[x, y] \in \mathbf{E}_2$, kde x, y jsou racionální. Množina R je hustá v \mathbf{E}_2 a pro každý bod $[x, y] \in R$ je $F(x, y) = [x, y]$. Protože zobrazení F není identické, není spojitě a není tedy ani lineární.

Резюме

ЗАМЕТКА О ЛИНЕЙНОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ E_m В E_m

АНТОНИН СОХОП (Antonín Sochor), Прага

В этой работе исследованы условия, достаточные для того, чтобы простое отображение E_m в E_m , $m \geq 2$, было линейным. Оказывается, что если предположить непрерывность обсуждаемого отображения хотя бы на одной прямой, то это отображение окажется линейным уже в том случае, если все прямые, параллельные с определенным конечным количеством прямых, перейдут в прямые. Приводится пример, показывающий, что при таких условиях нельзя выпустить требование непрерывности.

Обозначим через \mathfrak{F}_0 множество всех прямых A , для которых справедлива импликация

$$(1) \quad x \in A, x = [x_1, \dots, x_m] \neq [0, \dots, 0] = \rangle \sum_{k=2}^m x_k^2 < c^2 x_1^2,$$

где c — произвольное положительное число. Достаточным условием для линейности отображения является то, чтобы все прямые, параллельные какой-либо прямой из \mathfrak{F}_0 , перешли снова в прямые.

Результаты этой работы можно применять в теории относительности, потому что преобразования Лоренца являются отображениями E_4 в E_4 , которые переводят каждую прямую, параллельную какой-либо прямой из конуса (1), в прямую.

Summary

ON THE LINEARITY OF MAPPINGS OF E_m INTO E_m

ANTONÍN SOCHOR, Praha

The author investigates conditions sufficient for a one-to-one mapping F of E_m into E_m ($m \geq 2$) to be linear. If $F(P)$ is a straight line whenever P is parallel with some of a certain finite number of straight lines P_1, \dots, P_m and if F is continuous on P_1 , then F is linear (see theorem 1). An example shows that the assumption of continuity may not be omitted.

Let c be a positive number and let \mathfrak{F}_0 be the set of all straight lines P such that

$$\sum_{k=2}^m x_k^2 < c^2 x_1^2$$

for each point $x \in P$, where $x = [x_1, \dots, x_m] \neq [0, \dots, 0]$. If $F(Q)$ is a straight line whenever Q is parallel with some $P \in \mathfrak{F}_0$, then F is linear (see theorem 2).

This result may be applied to the relativity theory since the assumptions of theorem 2 are evidently fulfilled whenever F is a Lorentz transformation.