

Jiří Štěpánek

Zobecnění Taylorova a Laurentova rozvoje

*Časopis pro pěstování matematiky*, Vol. 92 (1967), No. 4, 436--442

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117608>

## Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1967

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

ZOBECNĚNÍ TAYLOROVA A LAURENTOVA ROZVOJE


Jiří ŠTĚPÁNEK, Praha

(Došlo dne 14. dubna 1966)

Práce navazuje na článek [1]. Je v ní sestrojen rozvoj jednoznačné analytické funkce v jejím polygonu konvergence, a sice tak, že koeficienty řady jsou vyjádřeny pomocí integrálů. Na základě toho je zde podáno zobecnění Laurentova rozvoje.

Mějme dánu analytickou funkci elementem

$$(1) \quad \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k$$



Obr. 1.

a sestrojme v Gaussově rovině pro tuto funkci jednoduše souvislou oblast  $H$ , tzv. hvězdu, tímto způsobem: Na spojnici bodu  $z_0$  s každým singulárním bodem analytické funkce zvolíme polopřímku neobsahující bod  $z_0$  a mající singulární bod za počáteční. Množina všech těchto polopřímek-paprsků tvoří pak hranici hvězdy  $H$  (viz obr. 1).<sup>1)</sup>

Analytickým pokračováním elementu (1) v hvězdě  $H$  dostaneme podle věty o monodromii jednoznačnou větev naší funkce, kterou označíme  $f$ .

Sestrojme pro funkci  $f$  její polygon konvergence  $P$  o „středu“  $z_0$  jako průnik otevřených polorovin, obsahujících bod  $z_0$  a majících hranice v kolmicích vztyčených ve všech signulárních bodech na paprsky hvězdy (viz obr. 1)<sup>2)</sup>. Polygon konvergence je konvexní množina, která obsahuje vždy konvergenční kruh elementu (1). Je-li funkce  $f$  meromorfní, je hranice  $P$  (označení  $hP$ ) složena z úseček, polopřímek nebo přímek. Tvoří-li singulární body funkce jistý hladký oblouk, pak tento oblouk je úpatnicí příslušného oblouku  $hP$  pro střed  $z_0$ . Každý bod  $hP$ , v němž neexistuje tečna, nazveme vrcholem.

<sup>1)</sup> Viz [1].

<sup>2)</sup> Viz [1], kde polygon konvergence je označen  $PK$ .


Polygon konvergence  $P$  funkce  $f$  může být omezený nebo neomezený. Je-li  $P$  neomezený, sestrojíme jeho omezenou část tak, že část hranice  $hP$  doplníme jedním nebo několika kruhovými oblouky o středu  $z_0$  na jednoduchou uzavřenou křivku (viz obr. 2).

V dalším budeme pod pojmem polygonu konvergence  $P$  funkce  $f$  rozumět vždy buď omezený  $P$  nebo jeho omezenou část.


Vyjádříme nyní funkci  $f$  jistou řadou, která konverguje v  $P$ . Přitom koeficienty tohoto rozvoje budou dány pomocí integrálů.

**Věta 1.** *Funkce  $f$  je regulární v každém (otevřeném) kruhu  $R$  opsaném nad úsečkou s krajními body  $z_0, \alpha$ , kde  $\alpha \in hP$ .*

**Důkaz.** Je-li  $z_1$  singulární bod funkce  $f$ , pak  $z_1 \notin P$ . Je-li  $z_1 \in R - \bar{P}$ , pak kolmice na spojnici bodů  $z_0, z_1$  protne nutně úsečku  $z_0\alpha$  v bodě různém od  $\alpha$ , což je ve sporu s definicí polygonu konvergence (viz obr. 3, kde  $\alpha$  je vrchol  $P$ ).



Obr. 2.



Obr. 3.


Nechť  $\Omega$  je sjednocení všech kruhů  $R$  z věty 1 pro  $\alpha \in hP$  a množiny  $(z_0)$ . Množina  $\Omega$  je omezená, jednoduše souvislá oblast, přičemž  $P \subset \Omega$ . Budeme v dalším předpokládat, že hranice oblasti  $\Omega$ , tj.  $h\Omega$ , je uzavřená Jordanova po částech hladká křivka.

**Poznámka 1.** Je-li funkce  $f$  racionální a  $P$  omezený, pak  $hP$  je složena z úseček

a křivka  $h\Omega$  je zřejmě složena z kruhových oblouků opsaných nad úsečkami o krajních bodech  $z_0, \alpha$ , kde  $\alpha$  je vrchol  $hP$  (viz obr. 3).

Z věty 1 ihned plyne, že funkce  $f$  je regulární v  $\Omega$ .

**Věta 2.** *Nechť  $\zeta \in h\Omega$  a  $L$  je otevřená polorovina obsahující bod  $z_0$ , jejíž hranicí je přímka jdoucí bodem  $\zeta$  a kolmá na spojnici bodů  $z_0, \zeta$ . Pak průnik všech polorovin  $L$  je  $P$  polygon konvergence funkce  $f$ .*



Obr. 4.

Důkaz. Je-li  $f$  meromorfní, je důkaz podle věty 1 a poznámky 1 evidentní, neboť  $h\Omega$  obsahuje vždy singulární body  $z_i$  funkce  $f$ . Kolmice v bodě  $\zeta \in h\Omega, \zeta \neq z_i$ ; protíná  $hP$  pouze ve vrcholu. Je-li částí hranice  $hP$  oblouk (různý od úsečky), pak důkaz plyne ihned z toho, že množina příslušných singulárních bodů funkce  $f$  je úpatnicí tohoto oblouku pro střed  $z_0$ , tj. kolmice v bodě  $\zeta$  na spojnici bodů  $z_0, \zeta$  je tečnou  $hP$  (viz obr. 4). Je-li konečně částí hranice  $hP$  kruhový oblouk, je tento oblouk totožný se svou úpatnicí.

Sestrojíme omezenou jednoduše souvislou oblast  $\Omega_\delta \subset \Omega$ , jejíž hranice  $h\Omega_\delta$  je homotetická s  $h\Omega$  podle středu  $z_0$  a poměru  $\delta$  ( $0 < \delta < 1$ ). Zvolme v  $\Omega_\delta$  libovolný bod  $z$ . Podle Cauchyova integrálního vzorce platí

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{h\Omega_\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Vyjádříme nyní  $1/(\zeta - z)$  ve tvaru jisté řady. Nechť  $z_{1/2}$  je půlicí bod úsečky o krajních bodech  $z_0, z$ , tj.

$$(2) \quad z_{1/2} = \frac{1}{2}(z + z_0).$$

Jest pak

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_{1/2} - (z - z_{1/2})} = \frac{1}{\zeta - z_{1/2}} \frac{1}{1 - \frac{z - z_{1/2}}{\zeta - z_{1/2}}}.$$

Je-li tedy

$$(3) \quad \left| \frac{z - z_{1/2}}{\zeta - z_{1/2}} \right| < 1,$$

pak můžeme psát

$$(4) \quad \frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_{1/2})^n}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}}.$$

**Věta 3.** Řada (4) konverguje v polygonu konvergence  $P$  funkce  $f$ .

Důkaz. Nerovnost (3) je ekvivalentní s nerovností

$$|z - z_{1/2}|^2 < |\zeta - z_{1/2}|^2 \quad \text{čili} \quad |z|^2 - 2\operatorname{Re}(z_{1/2} \cdot \bar{z}) < |\zeta|^2 - 2\operatorname{Re}(z_{1/2} \cdot \bar{\zeta}).$$

Označíme-li

$$z = x + iy, \quad z_0 = x_0 + iy_0, \quad \zeta = \zeta_1 + \zeta_2$$

dostaneme po úpravě

$$(5) \quad (\zeta_1 - x_0)x + (\zeta_2 - y_0)y + x_0\zeta_1 + y_0\zeta_2 - \zeta_1^2 - \zeta_2^2 < 0.$$

Nerovnost (5) vyjadřuje polorovinu, jejíž hranicí je přímka kolmá na spojnici bodů  $z_0, \zeta$ . V této polorovině leží vždy bod  $z_0$ , neboť

$$\begin{aligned} (\zeta_1 - x_0)x_0 + (\zeta_2 - y_0)y_0 + x_0\zeta_1 + y_0\zeta_2 - \zeta_1^2 - \zeta_2^2 &= \\ &= -(x_0 - \zeta_1)^2 - (y_0 - \zeta_2)^2 < 0. \end{aligned}$$

Protože  $\zeta \in h\Omega_\delta$ , je průnik všech těchto polorovin podle věty 2 omezená konvexní oblast  $P_\delta$ , jejíž hranice  $hP_\delta$  je homotetická s hranicí  $hP$  pro střed  $z_0$  a poměr  $\delta$ . Vzhledem k tomu, že  $\delta$  můžeme volit libovolně blízko 1, plyne odtud, že řada (4) konverguje v polygonu konvergence  $P$  funkce  $f$ .

Poznámka 2. „Proměnný střed“ řady (4), tj. bod  $z_{1/2}$  (daný rovnicí (2)) leží zřejmě vždy v oblasti  $\omega$ , jejíž hranice  $h\omega$  je homotetická s  $hP$  podle středu  $z_0$  a poměru  $1/2$ . Znakem  $\omega_\delta$  označme oblast, jejíž hranice  $h\omega_\delta$  je homotetická s  $h\omega$  pro střed  $z_0$  a poměr  $\delta$ .

**Věta 4.** Řada (4) konverguje stejnoměrně vzhledem k  $\zeta \in h\Omega_\delta$ .

Důkaz. Pro  $n$ -tý člen řady (4) dostaneme podle poznámky 2 odhad

$$\left| \frac{(z - z_{1/2})^n}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}} \right| = \left| \frac{(z_0 - z_{1/2})^n}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}} \right| < \delta^n \frac{1}{\varrho},$$

kde  $0 < \delta < 1$  a  $\varrho$  je vzdálenost hranic  $h\omega_\delta$  a  $hP_\delta$ . Odtud plyne ihned naše tvrzení.

Vynásobme nyní řadu (4) výrazem  $1/(2\pi i)f(\zeta)$  (omezeným na  $h\Omega_\delta$ ); dostaneme

$$\frac{1}{2\pi i} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}} (z - z_{1/2})^n.$$

Integraci přes  $h\Omega_0$  odtud plyne

$$(6) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_{1/2})(z - z_{1/2})^n$$

kde


$$(7) \quad a_n(z_{1/2}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{h\Omega_0} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(z_{1/2})}{n!}.$$

Dostali jsme tak

**větu 5.** *Nechť  $P$  je polygon konvergence funkce  $f$  o středu  $z_0$ . Pak funkci  $f$  lze rozvést v  $P$  v řadu (6), jejíž koeficienty jsou dány vzorcí (7), přičemž  $z_{1/2} = \frac{1}{2}(z + z_0)$ .<sup>3)</sup>*

Vyjádření koeficientů  $a_n(z_{1/2})$  ve tvaru integrálním nám umožní naše výsledky ještě dále zobecnit.

Nechť  $f$  je jednoznačná analytická funkce a  $z_0$  libovolný bod. Sestrojíme uzavřený kruh  $K$  o středu  $z_0$  a poloměru  $\rho \geq 0^4$ ) a uvažujme pouze singulární body funkce  $f$



Obr. 5.

ležící vně  $K$ . Předpokládejme přitom, že nejbližší singulární bod k hranici  $hK$  má od  $hK$  kladnou vzdálenost. Spojme všechny singulární body ležící vně  $K$  s bodem  $z_0$  a sestrojíme na tyto spojnice v singulárních bodech kolmice. Průnik všech otevřených polorovin obsahujících bod  $z_0$ , jejichž hranice jsou tyto kolmice, označme  $P^*$ . Množina  $P^*$  je konvexní oblast, která obsahuje kruh  $K$  (a tedy i všechny singulární body ležící v  $K$ ). Není-li oblast  $P^*$  omezená, sestrojíme její omezenou část tak, že část hranice  $hP^*$  doplníme jedním nebo několika kruhovými oblouky

o středu  $z_0$  na jednoduchou uzavřenou křivku. Tuto omezenou část označíme zase  $P^*$ .

Utvořme nyní dvojnásobně souvislou oblast  $P^* - K$ , kterou nazveme prstencový polygon konvergence funkce  $f$  o středu  $z_0$  (viz obr. 5). Vyjádříme funkci  $f$  řadou, která konverguje v  $P^* - K$ . Za tím účelem sestrojíme sjednocení  $\Omega^*$  všech kruhů, opsaných nad úsečkami o krajních bodech  $z_0, \alpha$ , kde  $\alpha \in hP^*$ . Funkce  $f$  je regulární v dvojnásobně souvislé oblasti  $\Omega^* - K$  s hranicí  $h(\Omega^* - K) = h\Omega^* \cup hK$ . Dále sestrojíme oblasti  $\Omega_j^* \subset \Omega^*$  a  $K_j \supset K$ , jejichž hranice  $h\Omega_j^*$ , resp.  $hK_j$  jsou homotetické

<sup>3)</sup> Srovnej s větou 1 v [1], kde bod  $z_{1/2}$  jest označen písmenem  $\zeta$ .

<sup>4)</sup> Připouštíme tedy možnost, že  $K = (z_0)$ .

s  $h\Omega^*$ , resp.  $hK$  podle středu  $z_0$  a poměru  $\delta$ , resp.  $1/\delta$  ( $0 < \delta < 1$ )<sup>5</sup>), přičemž nechť  $\Omega_\delta^* \supset K_\delta$ .

Zvolme nyní v dvojnásobně souvislé oblasti  $\Omega_\delta^* - K_\delta$  libovolný bod  $z$ . Podle Cauchyova integrálního vzorce dostaneme

$$(8) \quad f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{h\Omega_\delta^*} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{hK_\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

První integrál v (8) rozvedeme jako dříve v „zobecněnou Taylorovu řadu“ o proměnném středu  $z_{1/2} = \frac{1}{2}(z + z_0)$ , tj. v řadu

$$(9) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_{1/2}) (z - z_{1/2})^n$$

jejíž koeficienty jsou dány vzorci

$$(10) \quad a_n(z_{1/2}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{h\Omega_\delta^*} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Tato řada konverguje v oblasti  $P^*$ .

Rozvedme druhý integrál v (8) v řadu podle celých záporných mocnin  $z - z_0$ , tj. v řadu

$$(11) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z_0) (z - z_0)^{-n}$$

jejíž koeficienty jsou dány vzorci

$$(12) \quad a_{-n}(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{hK_\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} d\zeta \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Tato řada konverguje vně kruhu  $K_\delta$ . Dosadíme-li rozvoje (9) a (11) do (8), dostáváme

**větu 6.** *Nechť  $P^* - K$  je prstencový polygon konvergence funkce  $f$  o středu  $z_0$ . Pak funkci  $f$  lze rozvést v  $P^* - K$  v řadu*

$$(13) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_{1/2}) (z - z_{1/2})^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z_0) (z - z_0)^{-n}$$

jejíž koeficienty jsou dány vzorci (10) a (12), přičemž  $z_{1/2} = \frac{1}{2}(z + z_0)$ .

**Poznámka 3.** Rozvoj (13) je zobecněním rozvoje (6), který dostaneme z (13) v případě, že kruh  $K$  má poloměr  $\varrho = 0$  a  $z_0$  není singulární bod funkce  $f$ . Je-li  $\varrho = 0$  a  $z_0$  je singulární bod, je (13) rozvoj funkce  $f$  v prstencovém polygonu konvergence  $P^* - (z_0)$ . Řada (13) je tedy zobecnění Laurentovy řady.

<sup>5</sup>)  $hK_\delta$  je kružnice.

## Literatura

- [1] Jiří Štěpánek: Rozvoj analytické funkce v „Taylorovu“ řadu s proměnným středem. Čas. pro přst. mat. 81 (1956).

Adresa autora: Malostranské nám. 25, Praha 1 (Matematicko-fyzikální fakulta KU).

## Резюме

### ОБОБЩЕНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ТЭЙЛОРА И ЛОРАНА

ЙИРЖИ ШТЕПАНЕК (Jiří Štěpánek), Прага

Работа примыкает к статье того же автора [1]. В ней построено другим способом разложение однозначной аналитической функции в т. наз. полигоне сходимости с центром  $z_0$ :  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_{1/2}) \cdot (z - z_{1/2})^n$ ,  $z_{1/2} = \frac{1}{2}(z + z_0)$  причем коэффициенты  $a_n$  выражены в интегральной форме

$$a_n(z_{1/2}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{h\Omega_0} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}} d\zeta.$$

Это выражение дает возможность „обобщить“ разложения Лорана аналитической функции в т. наз. кольцеобразном полигоне сходимости.

## Summary

### GENERALIZATION OF TAYLOR AND LAURENT EXPANSION

JIRÍ ŠTĚPÁNEK, Praha

The paper is a continuation of the author's article [1]. In this paper an expansion of a single-valued analytic function in a so called polygon of convergence with a centre  $z_0$  is constructed in a different way, i.e.  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_{1/2}) (z - z_{1/2})^n$ ,  $z_{1/2} = \frac{1}{2}(z + z_0)$ , where the coefficients  $a_n$  are expressed in the integral form

$$a_n(z_{1/2}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{h\Omega_0} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_{1/2})^{n+1}} d\zeta.$$

This expression then allows to, “generalize” the Laurent expansion of an analytic function in the so called annular polygon of convergence.