

Josef Čučka

O bodové deformaci kongruencí rovin v pětirozměrném projektivním prostoru

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 97 (1972), No. 2, 151--162

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117760>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1972

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O BODOVÉ DEFORMACI KONGRUENCÍ ROVIN V PĚTIROZMĚRNÉM PROJEKTIVNÍM PROSTORU

JOSEF ČUČKA, Brno

(Došlo dne 18. června 1970)

V práci, k níž dal podnět prof. K. SVOBODA v semináři o soustavách Pfaffových rovnic, jsou studovány Cartanovou metodou pohyblivého reperu některé otázky související s bodovou deformací dvou dvojparametrických systémů rovin – dále stručněji nazývaných kongruencemi L, L' – vnořených do pětirozměrných projektivních prostorů P_5, P'_5 .

Ukazuje se, že některé poznatky dnes již dobře zpracované teorie přímkových kongruencí v P_3 (např. [1]), mají své analogické protějšky v dále studovaném případě kongruencí rovin v P_5 .

V §1 je pro další účely vhodně specialisován průvodní reper kongruence L a zavedeny bodové formy φ_i .

V §2 je zcela přirozeným způsobem modifikován pojem bodové deformace užívaný akademikem E. ČEČHEM. Obsah paragrafu je shrnut ve větě 1 a existenční větě 2.

V §3 je objasněn geometrický smysl rovnosti bodových forem kongruencí L, L' . Věta 4 poukazuje na vztah mezi bodovou deformací kongruencí L, L' a projektivní deformací prvního řádu příslušných fokálních ploch.

Na rozdíl od indexů j, k, l , jejichž průběh je vždy vyznačen, probíhá index „ i “ zásadně čísla 1, 2, 3.

1. Reperem pětirozměrného projektivního prostoru P_5 budeme rozumět libovolnou uspořádanou šestici lineárně nezávislých aritmetických bodů A_j ($j = 1, \dots, 6$), pro něž je

$$(1) \quad [A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6] = 1.$$

O funkcích vyskytujících se dále budeme předpokládat, že jsou analytické.

Základní derivační formule jsou

$$(2) \quad dA_j = \sum_k \omega_j^k A_k \quad (j, k = 1, \dots, 6),$$

kde relativní komponenty ω_j^k vyhovují rovnicím struktury

$$(3) \quad d\omega_j^k = \sum_l \omega_j^l \wedge \omega_l^k \quad (j, k, l = 1, \dots, 6).$$

Hlavní parametry značme u, v . Pfaffovy formy ω_j^l splňují rovnici

$$\sum_j \omega_j^j = 0 \quad (j = 1, \dots, 6).$$

Nechť vrcholy A_1, A_2, A_3 reperu incidují s běžnou rovinou p kongruence L . Pak

$$\begin{aligned} d[A_1 A_2 A_3] &= [dA_1 A_2 A_3] + [A_1 dA_2 A_3] + [A_1 A_2 dA_3] = \\ &= \sum_i \omega_i^i [A_1 A_2 A_3] + \sum_i \sum_l \omega_i^l [A_j A_k A_l], \end{aligned}$$

kde i, j, k jsou cyklické permutace z prvků 1, 2, 3 a $l = 4, 5, 6$.

Variace (tj. diferencování jen podle vedlejších parametrů) je

$$\delta[A_1 A_2 A_3] = \sum_i e_i^i [A_1 A_2 A_3],$$

kde jako obvykle

$$e_m^n = \omega_m^n(\delta),$$

takže formy

$$(4) \quad \omega_i^{3+j} \quad (j = 1, 2, 3)$$

jsou hlavní a z nich lze vybrat právě dvě nezávislé; nechť jsou to

$$\omega_1^4 \equiv \omega^1, \quad \omega_2^5 \equiv \omega^2.$$

Zbývající formy (4) lze vyjádřit jako jejich kombinace s koeficienty závisujícími obecně na hlavních i vedlejších parametrech.

Ohniskem roviny (A_1, A_2, A_3) příslušným k fokálnímu směru (např. $q^1 \omega^1 + q^2 \omega^2 = 0$) rozumíme bod F této roviny, který při jejím pohybu ve fokálním směru splňuje relaci $[A_1 A_2 A_3 dF] = 0$. Jak známo [6], existují v každé rovině kongruence tři ohniska, o nichž budeme v dalším předpokládat, že neleží v jediné přímce.

Volme nyní vrcholy A_1, A_2, A_3 reperu v ohniscích roviny p příslušných k fokálním směrům

$$\omega^1 = 0, \quad \omega^2 = 0, \quad \omega^1 + r\omega^2 \equiv \omega^3 = 0,$$

kde

$$(5) \quad r \neq 0.$$

Rovnicím

$$[A_1 A_2 A_3 dA_i]_{\omega^i=0} = 0$$

lze vzhledem k (2) ($j = 1, 2, 3; k = 1, \dots, 6$) vyhovět, když

$$(6) \quad \omega^i \wedge \omega_i^{3+j} = 0 \quad (j = 1, 2, 3).$$

Užitím Cartanova lemmatu nabývají (6) tvaru

$$(7) \quad \omega_i^{3+j} = a_i^{3+j} \omega^i \quad (j = 1, 2, 3; a_1^4 = a_2^5 = 1).$$

Omezme se na případ, kdy každé ze tří ohnisek A_i opisuje regulární plochu (tzv. plochu fokální).

Tečné roviny fokálních ploch $\{A_i\}$ v bodech dotyků A_i leží v prostorech

$$(8) \quad (A_1, A_2, A_3, \sum_j a_i^{3+j} A_{3+j}) \quad (j = 1, 2, 3; a_1^4 = a_2^5 = 1).$$

Zvolíme reper tak, aby tyto tečné prostory byly

$$(A_1, A_2, A_3, A_4), \quad (A_1, A_2, A_3, A_5), \quad (A_1, A_2, A_3, a_3^6 A_6), \quad a_3^6 \neq 0,$$

to jest

$$a_i^{3+j} = 0 \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j).$$

Odtud a ze (7) vyplývá

$$\omega_i^{3+j} = 0 \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j).$$

Vnějšíším diferencováním rovnic (7) pro $i = j = 3$ vychází

$$\begin{aligned} & \omega^1 \wedge \{da_3^6 + a_3^6(\omega_1^1 + \omega_6^6 - \omega_3^3 - \omega_4^4)\} + \\ & + \omega^2 \wedge \{da_3^6 r + a_3^6 r(\omega_2^2 + \omega_6^6 - \omega_3^3 - \omega_5^5)\} = 0. \end{aligned}$$

Bez újmy na obecnosti zvolíme $a_3^6 = 1$.

Vnějšíším diferencováním zbývajících rovnic (7) dostaneme

$$(9) \quad \omega^i \wedge \omega_j^i - \omega^j \wedge \omega_{3+j}^{3+i} = 0 \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j)$$

a vidíme, že formy

$$\omega_1^1 + \omega_6^6 - \omega_3^3 - \omega_4^4, \quad \omega_j^i, \quad \omega_{3+j}^{3+i} \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j)$$

jsou hlavní.

Vzhledem k (6) a nerovnostem

$$\omega^i \wedge \omega^j \neq 0 \quad (j = 1, 2, 3; i \leq j + 1)$$

můžeme na (9) aplikovat Cartanovo lemma a obdržíme

$$(10) \quad \omega_i^j = a_i^j \omega^i + \alpha_i^j \omega^j, \quad \omega_{3+i}^{3+j} = \beta_i^j \omega^i - a_i^j \omega^j \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j).$$

Přihlédneme k rovnostem

$$(11) \quad d\omega^i = (\omega_i^i - \omega_{3+i}^{3+i}) \wedge \omega^i,$$

kteře okamžitě plynou z podmínek integrability (3) a prodloužíme (10). Získáme tím rovnice tvaru

$$\begin{aligned}\omega^i \wedge \Delta a_i^j + \omega^j \wedge \Delta \alpha_i^j + \omega_i^l \wedge \omega_l^j &= 0, \\ \omega^i \wedge \Delta \beta_i^j - \omega^j \wedge \Delta a_i^j + \omega_{3+i}^{3+l} \wedge \omega_{3+l}^{3+j} &= 0, \quad (j, l = 1, 2, 3; i \neq j \neq l \neq i)\end{aligned}$$

kde

$$\begin{aligned}(12) \quad \Delta a_i^j &= da_i^j + a_i^j(\omega_j^j - \omega_{3+i}^{3+i}) + \omega_{3+i}^j, \\ \Delta \alpha_i^j &= d\alpha_i^j + \alpha_i^j(2\omega_j^j - \omega_i^i - \omega_{3+j}^{3+j}), \\ \Delta \beta_i^j &= d\beta_i^j + \beta_i^j(\omega_i^i + \omega_{3+j}^{3+j} - 2\omega_{3+i}^{3+i}) \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j)\end{aligned}$$

jsou další hlavní formy.

Ze vztahů (12)₁ poznáváme, že lze reper dále specialisovat volbou

$$a_i^j = 0 \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j),$$

přičemž se stávají formy

$$\omega_{3+i}^j \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j)$$

hlavními formami.

Z definice hodnoty vnějšího diferenciálu a hodnoty vnějšího součinu plyne z (11)

$$(13) \quad \delta \omega^i = \omega^i(e_i^i - e_{3+i}^{3+i}).$$

Uveďme ještě kvůli přehlednosti variace relativních invariantů a derivační formule reperu.

$$\begin{aligned}(14) \quad \delta \alpha_i^j &= \alpha_i^j(e_i^i + e_{3+j}^{3+j} - 2e_j^j), \quad \delta \beta_i^j = \beta_i^j(2e_{3+i}^{3+i} - e_i^i - e_{3+j}^{3+j}) \\ &\quad (j = 1, 2, 3; i \neq j), \\ \delta r &= r(e_5^5 + e_1^1 - e_2^2 - e_4^4) = r(e_5^5 + e_3^3 - e_2^2 - e_6^6).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(15) \quad dA_1 &= \omega_1^1 A_1 + \alpha_1^2 \omega^2 A_2 + \alpha_1^3 \omega^3 A_3 + \omega^1 A_4, \\ dA_2 &= \alpha_2^1 \omega^1 A_1 + \omega_2^2 A_2 + \alpha_2^3 \omega^3 A_3 + \omega^2 A_5, \\ dA_3 &= \alpha_3^1 \omega^1 A_1 + \alpha_3^2 \omega^2 A_2 + \omega_3^3 A_3 + \omega^3 A_6, \\ dA_4 &= \omega_4^1 A_1 + \omega_4^2 A_2 + \omega_4^3 A_3 + \omega_4^4 A_4 + \beta_1^2 \omega^1 A_5 + \beta_1^3 \omega^1 A_6, \\ dA_5 &= \omega_5^1 A_1 + \omega_5^2 A_2 + \omega_5^3 A_3 + \beta_2^1 \omega^2 A_4 + \omega_5^5 A_5 + \beta_2^3 \omega^2 A_6, \\ dA_6 &= \omega_6^1 A_1 + \omega_6^2 A_2 + \omega_6^3 A_3 + \beta_3^1 \omega^3 A_4 + \beta_3^2 \omega^3 A_5 + \omega_6^6 A_6.\end{aligned}$$

Nyní lze snadno ověřit, že bodové formy

$$(16) \quad \varphi_1 = \alpha_2^3 \alpha_3^2 \omega^2 \omega^3, \quad \varphi_2 = \alpha_1^3 \alpha_3^1 \omega^1 \omega^3, \quad \varphi_3 = \alpha_1^2 \alpha_2^1 \omega^1 \omega^2$$

a formy

$$\psi_1 = \alpha_1^2 \alpha_2^3 \alpha_3^1 \omega^1 \omega^2 \omega^3, \quad \psi_2 = \alpha_2^1 \alpha_3^2 \alpha_1^3 \omega^1 \omega^2 \omega^3$$

jsou invariantní (tj. $\delta\varphi_i = \delta\psi_j = 0$). Z identity

$$\varphi_1 \varphi_2 \varphi_3 = \psi_1 \psi_2$$

je ovšem ihned vidět, že nejsou nezávislé.

2. Předně připomeňme [1] pojem bodové deformace.

Budiž dána

- kongruence $L \subset P_5$ rovin $p = p(u, v)$,
- kongruence $L' \subset P'_5$ rovin $p' = p'(u', v')$,
- regulární korespondence $C : L \rightarrow L'$, $Cp(u, v) = p'(u', v')$
rovnice $u' = u'(u, v)$, $v' = v'(u, v)$.

Řekneme, že C^b je bodové rozšíření korespondence C , jestliže je pro každou dvojici odpovídajících si rovin $p \in L$, $Cp = p' \in L'$ dána kolineace

$$\pi = \pi(u, v) : p(u, v) \rightarrow p' \{u'(u, v); v'(u, v)\}.$$

Dostáváme tak bodovou korespondenci $C^b : V_4(L) \rightarrow V'_4(L')$ mezi čtyřrozměrnými bodovými varietami $V_4(L)$, $V'_4(L')$.

Korespondence C se nazývá bodovou deformací, jestliže existuje takové bodové rozšíření C na C^b , že lze pro každou dvojici (u, v) najít kolineaci $K(u, v) : P_5 \rightarrow P'_5$ takovou, že platí:

Je-li $A \in p(u, v)$ bod a Γ libovolná křivka ($A \in \Gamma \subset V_4(L)$), pak křivky $C^b\Gamma$ a $K(u, v)\Gamma$ mají v bodě C^bA analytický styk prvního řádu, tj. při

$$(17) \quad KA = C^bA$$

platí rovnost

$$(18) \quad K dA = d(C^bA) + \mathfrak{D}C^bA,$$

kde \mathfrak{D} je jistá hlavní forma. Říkáme pak, že K realizuje (v rovině $p(u, v)$) bodovou deformaci.

Jde nám nyní o nalezení podmínek při jejichž splnění budou kongruence $L \subset P_5$, $L' \subset P'_5$ v bodové deformaci.

Ke kongruenci L přiřadíme ovšem reper s derivačními formulami (15) a ke kongruenci L' zcela analogický reper čárkovaný.

Korespondence C nechť je určena relacemi

$$(19) \quad \omega'^k = \sum_l b_k^l \omega^l \quad (k, l = 1, 2),$$

kde

$$(20) \quad |b_k^l| \neq 0 \quad (k, l = 1, 2).$$

Pak je ovšem

$$\omega'^3 = b_1^1 \omega^1 + b_1^2 \omega^2 + r'(b_2^1 \omega^1 + b_2^2 \omega^2).$$

Bodové rozšíření C^b korespondence $C : L \rightarrow L'$ nechť je dáno kolineací $\pi : p \rightarrow p'$ určenou rovnicemi

$$\pi A_i = \sum_j c_i^j A'_j \quad (j = 1, 2, 3)$$

s determinantem

$$(21) \quad |c_i^j| \neq 0 \quad (j = 1, 2, 3).$$

Předpokládejme, že kolineace K

$$KA_i = c_i^k A'_k \quad (k = 1, 2, 3)$$

$$KA_{3+i} = c_{3+i}^l A'_l \quad (l = 1, \dots, 6)$$

realizuje bodovou deformaci kongruencí L, L' .

Nechť je křivka Γ opisována bodem

$$A = \sum_i x^i(t) A_i(u, v),$$

kde

$$u = u(t), \quad v = v(t).$$

Pak

$$dA = \sum_j \sum_i \{(dx^i + x^j \omega_j^i) A_i + x^i \omega^i A_{3+i}\} \quad (j = 1, 2, 3)$$

a

$$(22) \quad K dA = \sum_i \sum_j \sum_k \{c_i^j (dx^i + x^k \omega_k^i) + c_{3+i}^j x^i \omega^i\} A'_j \quad (j = 1, \dots, 6; k = 1, 2, 3).$$

Dále je

$$(23) \quad C^b A = KA = \sum_i \sum_j c_i^j x^i A'_j \quad (j = 1, 2, 3)$$

a

$$(24) \quad d(C^b A) = \sum_i \sum_j \sum_k \{[c_i^j dx^i + x^i (dc_i^j + c_i^k \omega_k^j)] A'_j + c_k^j x^k \omega^j A'_{3+j}\} \\ (j, k = 1, 2, 3).$$

Dosadíme z (22), (23) a (24) do (18) a porovnáme koeficienty u $x^l A'_l$ ($l = 4, 5, 6$).

Dostaneme

$$(25) \quad \omega^i c_{3+i}^{3+j} = \omega^j c_i^j \quad (j = 1, 2, 3).$$

S uvážením (19) porovnejme v (25) koeficienty nyní u forem ω^1, ω^2 . Získáme tak systém rovnic

$$(26) \quad \begin{aligned} c_1^1 b_1^2 &= c_2^1 b_1^1 = c_1^2 b_2^2 = c_2^2 b_2^1 = 0, \\ c_1^3 (b_1^2 + r' b_2^2) &= 0, \quad c_2^3 (b_1^1 + r' b_2^1) = 0, \\ c_4^6 &= c_1^3 (b_1^1 + r' b_2^1), \quad c_5^6 = c_2^3 (b_1^2 + r' b_2^2), \\ c_6^6 &= c_3^3 (b_1^1 + r' b_2^1), \quad c_6^6 r = c_3^3 (b_1^2 + r' b_2^2), \\ c_4^4 &= c_1^1 b_1^1, \quad c_6^4 = c_3^1 b_1^1, \quad c_6^4 r = c_3^1 b_1^2, \quad c_5^4 = c_2^1 b_1^1, \\ c_4^5 &= c_1^2 b_2^1, \quad c_5^5 = c_2^2 b_2^2, \quad c_6^5 = c_3^2 b_2^1, \quad c_6^5 r = c_3^2 b_2^2. \end{aligned}$$

Po přihlédnutí k podmínkám (20), (21), (5) a analogické $r' \neq 0$, lze diskusí systému (26) ukázat, že je řešitelný jen když

$$(27) \quad b_1^2 = b_2^1 = 0,$$

nebo $b_1^1 = b_2^2 = 0$. Výběr jedné z těchto dvou možností je geometricky nepodstatný a my zvolíme (27).

Všimněme si ještě rovnic (25). Lehce z nich plyne

$$(28) \quad (c_4^4 c_5^5 c_6^6 + c_4^5 c_5^6 c_6^4 + c_4^6 c_5^4 c_6^5) \omega^1 \omega^2 \omega^3 = (c_1^1 c_2^2 c_3^3 + c_1^2 c_2^3 c_3^1 + c_1^3 c_2^1 c_3^2) \omega'^1 \omega'^2 \omega'^3.$$

Korespondence $C : L \rightarrow L'$ tedy transformuje rozvinutelné variety (torsy) kongruence L do rozvinutelných variet kongruence L' . Taková korespondence se nazývá rozvinutelná (torsální).

Vraťme se nyní k relacím (26) a (27). Nahlédneme z nich platnost rovností

$$(29) \quad c_1^2 = c_1^3 = c_2^1 = c_2^2 = c_3^1 = c_3^2 = c_4^5 = c_4^6 = c_5^4 = c_5^5 = c_6^4 = c_6^5 = c_6^6 = 0.$$

Vztahy (19) vzhledem k (27) jsou nyní

$$(30) \quad \omega'^1 = b_1^1 \omega^1, \quad \omega'^2 = b_2^2 \omega^2$$

a po přihlédnutí ke (29) nabývá (28) tvaru

$$c_6^6 c_5^5 c_4^4 \omega^1 \omega^2 \omega^3 = c_3^3 c_2^2 c_1^1 \omega'^1 \omega'^2 \omega'^3.$$

Označme

$$\omega_k'^k - \omega_k^k = \tau_k^k.$$

Vnější diferencováním (30) vychází

$$\{db_1^1 + b_1^1(\tau_4^4 - \tau_1^1)\} \wedge \omega^1 = 0, \quad \{db_2^2 + b_2^2(\tau_5^5 - \tau_2^2)\} \wedge \omega^2 = 0$$

a tím se přesvědčujeme, že b_1^1, b_2^2 jsou relativní invarianty. Můžeme tedy klást

$$b_1^1 = b_2^2 = 1.$$

Pak ovšem

$$\tau_{3+k}^{3+k} - \tau_k^k = f_k \omega^k \quad (k = 1, 2)$$

jsou hlavní formy.

Dosáhli jsme tak bez obsahové újmy na obecnosti situace, kdy

$$(31) \quad \omega'^k = \omega^k \quad (k = 1, 2).$$

Systém (26) se tak zredukoval na

$$(32) \quad c_4^4 = c_1^1, \quad c_5^5 = c_2^2, \quad c_6^6 = c_3^3, \quad c_6^6 r = c_3^3 r'.$$

Z posledních dvou rovnic (32) ihned vyplývá

$$(33) \quad r = r'.$$

S použitím (29), (31), (32), (33) porovnávejme dále koeficienty v (18) nyní u $x^i A'_j$ ($j = 1, 2, 3$). Současně použijme vyjádření hlavních forem přichystaného v (15). Dostaneme

$$(34)_{1-3} \quad dc_i^i = c_i^i \tau_i^i + c_i^i \vartheta = c_{3+i}^i \omega^i$$

$$(34)_{4-9} \quad c_i^i \alpha_j^i \omega^i + c_{3+j}^i \omega^j = c_j^j \alpha_j^i \omega^i \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j).$$

Porovnáním koeficientů u forem ω^1, ω^2 v rovnicích (34)₄₋₉ máme ihned

$$c_4^2 = c_4^3 = c_5^1 = c_5^2 = c_6^1 = c_6^2 = 0$$

a

$$(35) \quad c_i^i \alpha_j^i = c_j^j \alpha_j^i \quad (j = 1, 2, 3; i \neq j).$$

Jelikož lze požadavku (21) vzhledem k (29) vyhovět právě když

$$(36) \quad c_1^1 c_2^2 c_3^3 \neq 0,$$

dospíváme ze systému rovnic (35) pro neznámé c_1^1, c_2^2, c_3^3 k podmínkám

$$(37) \quad \alpha_1^2 \alpha_2^1 = \alpha_1'^2 \alpha_2'^1, \quad \alpha_1^3 \alpha_3^1 = \alpha_1'^3 \alpha_3'^1, \quad \alpha_2^3 \alpha_3^2 = \alpha_2'^3 \alpha_3'^2, \\ \alpha_1^2 \alpha_2^3 \alpha_3^1 = \alpha_1'^2 \alpha_2'^3 \alpha_3'^1, \quad \alpha_2^1 \alpha_3^2 \alpha_1^3 = \alpha_2'^1 \alpha_3'^2 \alpha_1'^3,$$

které ovšem nejsou nezávislé.

Kolineace K realizující bodovou deformaci C je tedy určena rovnicemi

$$(38) \quad KA_i = c_i^i A'_i, \quad KA_{3+i} = c_{3+i}^i A'_i + c_i^i A'_{3+i},$$

kde koeficienty c_i^i, c_{3+i}^i jsou řešením systému rovnic (35) a (34)₁₋₃.

Shrnutím dosavadních úvah a porovnáním (37) a (16) je dokázána

Věta 1. Bodová deformace $C : L \rightarrow L'$ je rozvinutelná korespondence; kolineace K ji realizující transformuje ohniska A_1, A_2, A_3 do ohnisek A'_1, A'_2, A'_3 .

Kongruence L, L' jsou v bodové deformaci $C : L \rightarrow L'$ právě tehdy, platí-li

$$\varphi_1 = \varphi'_1, \quad \varphi_2 = \varphi'_2, \quad \varphi_3 = \varphi'_3$$

a aspoň jedna z rovností

$$\psi_1 = \psi'_1, \quad \psi_2 = \psi'_2.$$

Vyšetřujeme nyní, zda k dané kongruenci $L \subset P_5$ opravdu existuje korespondence C a kongruence $L' \subset P'_5$ – dále stručněji dvojice (C, L') – tak, že $C : L \rightarrow L'$ je bodovou deformací.

Bez újmy na obecnosti volme v relacích (35) $\alpha_i^j = \alpha_i'^j$ ($j = 1, 2, 3; i \neq j$) a pamatujeme na (31) a (33). Při dané kongruenci L je pak dvojice (C, L') určena systémem

$$(39) \quad \tau_i^j = 0 \quad (j = 1, \dots, 6; i \neq j)$$

s uzávěrem

$$(40) \quad \begin{aligned} \omega^1 \wedge \Omega_3 &= 0, & \omega^2 \wedge \Omega_4 &= 0, & \omega^3 \wedge \Omega_5 &= 0, \\ \omega^1 \wedge \tau_4^2 + \omega^2 \wedge \alpha_1^2 \Omega_1 &= 0 & \omega^2 \wedge \tau_5^1 - \omega^1 \wedge \alpha_2^1 \Omega_1 &= 0 \\ \omega^1 \wedge \tau_4^3 + \omega^3 \wedge \alpha_1^3 (\Omega_1 + \Omega_2) &= 0 & \omega^3 \wedge \tau_6^1 - \omega^1 \wedge \alpha_3^1 (\Omega_1 + \Omega_2) &= 0 \\ \omega^2 \wedge \tau_5^3 + \omega^3 \wedge \alpha_2^3 \Omega_2 &= 0 & \omega^3 \wedge \tau_6^2 - \omega^2 \wedge \alpha_3^2 \Omega_2 &= 0, \end{aligned}$$

kde

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \tau_2^2 - \tau_1^1, & \Omega_2 &= \tau_3^3 - \tau_2^2, & \Omega_3 &= \tau_4^4 - \tau_1^1, \\ \Omega_4 &= \tau_5^5 - \tau_2^2, & \Omega_5 &= \tau_6^6 - \tau_3^3. \end{aligned}$$

Snadno nahlédneme, že hlavní formy

$$\tau_4^2, \tau_4^3, \tau_5^1, \tau_5^3, \tau_6^1, \tau_6^2, \Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5,$$

stejně jako vnější kvadratické rovnice (40), jsou lineárně nezávislé. Při obvyklém označení je tedy

$$q = 11, \quad s_1 = 9, \quad s_2 = 11 - 9 = 2.$$

Cartanovo číslo

$$Q = s_1 + 2s_2 = 9 + 4 = 13.$$

Rozřešíme (40) užitím Cartanova lemmatu.

$$(41) \quad \begin{aligned} \Omega_3 &= f_1 \omega^1, & \Omega_4 &= f_2 \omega^2, & \Omega_5 &= f_3 \omega^3, \\ \tau_4^2 &= f_4 \omega^1 + f_5 \omega^2, & \tau_5^1 &= f_{13} \omega^2 + f_{14} \omega^1, \\ \alpha_1^2 \Omega_1 &= f_5 \omega^1 + f_6 \omega^2, & \alpha_2^1 \Omega_1 &= -f_{14} \omega^2 + f_{15} \omega^1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\tau_4^3 &= f_7\omega^1 + f_8\omega^2, & \tau_6^1 &= f_{16}\omega^3 + f_{17}\omega^1, \\
\alpha_1^3(\Omega_1 + \Omega_2) &= f_8\omega^1 + f_9\omega^2, & \alpha_3^1(\Omega_1 + \Omega_2) &= -f_{17}\omega^3 + f_{18}\omega^1, \\
\tau_5^3 &= f_{10}\omega^2 + f_{11}\omega^3, & \tau_6^2 &= f_{19}\omega^3 + f_{20}\omega^2, \\
\alpha_2^3\Omega_2 &= f_{11}\omega^2 + f_{12}\omega^3, & \alpha_3^2\Omega_2 &= -f_{20}\omega^3 + f_{21}\omega^2.
\end{aligned}$$

Dosadíme-li ze (41) do (40), najdeme mezi koeficienty f_k ($k = 1, \dots, 21$) osm lineárních relací, tedy $N = 21 - 8 = 13$. Protože $Q = N$ je systém (39) v involuci a je dokázána existenční

Věta 2. *Je-li dána kongruence $L \subset P_3$ pak dvojice (C, L) existuje a závisí na dvou funkcích dvou proměnných.*

3. Předně se budeme zabývat otázkou, kdy jsou dvojice fokálních ploch $\{A_i\}, \{A'_i\}$ v projektivních deformacích C_i prvního řádu [5], které budeme realizovat současně jednou kolineací \mathcal{K} , transformující ohniska A_i do ohnisek A'_i .

Rovnice kolineace \mathcal{K} předpokládejme ve tvaru

$$(42) \quad \mathcal{K}A_i = K_i^i A'_i$$

$$(43) \quad \mathcal{K}A_{3+i} = \sum_j K_{3+i}^j A'_j \quad (j = 1, \dots, 6),$$

kde

$$(44) \quad K_1^1 K_2^2 K_3^3 \neq 0.$$

Fokální plochy $\{A_i\}, \{A'_i\}$ jsou v projektivních deformacích $C_i: \{A_i\} \rightarrow \{A'_i\}$ prvního řádu realizovaných kolineací \mathcal{K} , platí-li při

$$\mathcal{K}A_i = K_i^i A'_i$$

relace $\mathcal{K}(dA_i) = d(K_i^i A'_i) + \vartheta_i K_i^i A'_i$, neboli

$$(45) \quad \mathcal{K}(dA_i) = K_i^i dA'_i + \gamma_i A'_i,$$

kde ϑ_i jsou vhodné Pfaffovy formy a $\gamma_i = dK_i^i + \vartheta_i K_i^i$.

Jest

$$dA_i = \sum_j \omega_i^j A_j, \quad dA'_i = \sum_j \omega_i'^j A'_j \quad (j = 1, \dots, 6),$$

tedy

$$(46) \quad \sum_j \omega_i^j (\mathcal{K}A_j) = K_i^i \sum_j \omega_i'^j A'_j + \gamma_i A'_i \quad (j = 1, \dots, 6).$$

Nyní dosadíme za $\mathcal{K}A_j$ do (46) ze (42), resp. (43), a za ω_i^j jejich vyjádření z matice

koeficientů (15). Porovnáním koeficientů u A'_j ($j = 1, \dots, 6$) a pak u ω^1 a ω^2 dospějeme po snadných výpočtech ke vztahům

$$K_4^2 = K_4^3 = K_4^5 = K_4^6 = K_5^1 = K_5^3 = K_5^4 = K_5^6 = K_6^1 = K_6^2 = K_6^4 = K_6^5 = 0$$

$$(47) \quad K_i^j \alpha_j^i = K_j^i \alpha_j'^i \quad (j = 1, 2, 3; \quad i \neq j)$$

$$(48) \quad K_{3+i}^{3+i} = K_i^i$$

$$(49) \quad K_i^i \tau_i^i + \gamma_i = K_{3+i}^i \omega^i.$$

System rovnic (47) je až na označení hledaných funkcí K_i^i identický se systémem (35). Obsahově jsou stejné i požadavky (44) a (36). Jest tedy

$$K_i^i = c_i^i$$

a vzhledem k (48)

$$K_{3+i}^{3+i} = c_i^i.$$

Rovnice (49) nabývají nyní tvaru

$$c_i^i \tau_i^i + \gamma_i = K_{3+i}^i \omega^i$$

a lze z nich určit K_{3+i}^i . Tím je dokázána

Věta 3. *Fokální plochy $\{A_i\}$, $\{A'_i\}$ kongruencí L, L' jsou v projektivních deformacích prvního řádu $C_i : \{A_i\} \rightarrow \{A'_i\}$ realizovaných současně jedinou kolineací \mathcal{K} právě tehdy, platí-li*

$$\varphi_i = \varphi'_i$$

a aspoň jedna z rovností

$$\psi_1 = \psi'_1, \quad \psi_2 = \psi'_2.$$

Rovnice kolineace \mathcal{K} jsou tvaru

$$\mathcal{K} A_i = c_i^i A'_i$$

$$\mathcal{K} A_{3+i} = c_{3+i}^i A'_i + c_i^i A'_{3+i}.$$

Z obsahů věty 1 a věty 2 vyplývá tvrzení, které podává

Věta 4. *Rozvinutelná korespondence $C : L \rightarrow L'$ mezi kongruencemi L, L' je bodovou deformací právě tehdy, jsou-li korespondence $C_i : \{A_i\} \rightarrow \{A'_i\}$ mezi fokálními plochami $\{A_i\}$, $\{A'_i\}$ projektivními deformacemi prvního řádu.*

Literatura

- [1] Švec A.: Projective differential geometry of line congruences, Praha 1965.
- [2] Finikov S. P.: Teorie párů kongruencí (rusky), Moskva 1956.
- [3] Ščerbakov R. N.: Kurs afinní a projektivní diferenciální geometrie (rusky), Tomsk 1960.
- [4] Svoboda K.: Über die Punktdeformation einer vollständig fokalen Pseudokongruenz, Mathematische Nachrichten, Band 38 (1968), Heft 3/4, str. 197—206.
- [5] Švec A. Projektivní deformace kongruencí (studijní pomůcka k semináři E. Čecha), Praha 1955.
- [6] Šepelenková L. M.: Projektivní deformace dvojparametrického systému $p-1$ rovin v $(2p-1)$ -rozměrném projektivním prostoru (rusky), Trudy tomsk. gosud. univ., Tom 161, (1962) str. 29—38.

Adresa autora: Hilleho 6, Brno (Vysoké učení technické).

Zusammenfassung

ÜBER DIE PUNKTDEFORMATION DER EBENENKONGRUENZEN IM FÜNFDIMENSIONALEN PROJEKTIVEN RAUM

JOSEF ČUČKA, Brno

In der Arbeit wird die Korrespondenz C zwischen zwei zweiparametrischen ebenen Gebilden L, L' (Kongruenzen von Ebenen), welche in die fünfdimensionalen projektiven Räume P_5, P'_5 eingebettet sind, erwägt. Es wird vorausgesetzt, dass die Kongruenz L , bzw. L' drei verschiedene nicht ausgeartete Brennflächen $\{A_i\}$, bzw. $\{A'_i\}$ besitzt. Mittels der Cartan'schen Methode des beweglichen Bezugssystems werden zu der Kongruenz L geometrisch bedeutsame invariante quadratische Formen φ_i , (die sog. Punktformen) und invariante kubische Formen ψ_1, ψ_2 aufgefunden.

Es wird bewiesen, dass die Gleichheit der Punktformen $\varphi_i = \varphi'_i$ und die Gültigkeit zumindest einer der Gleichung $\psi_1 = \psi'_1, \psi_2 = \psi'_2$ eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür sind, dass

- 1) die abwickelbare Korrespondenz $C : L \rightarrow L'$ eine Punktdeformation ist,
- 2) alle drei Brennflächenpaare $\{A_i\}, \{A'_i\}$ sich zugleich in der projektiven Deformation C_i erster Ordnung entsprechen.

Der Satz 2 sichert dass zu der gegebenen Kongruenz L das Paar (C, L') tatsächlich existiert und von zwei Funktionen zweier Variablen abhängt.