

Augustin Vondráček

Příspěvek ke konstrukci obecné rovinné kubiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 61 (1932), No. 4, 153--160

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/121302>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1932

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

Príspevek ke konstrukci obecné rovinné kubiky.

Napsal Dr. Aug. Vondráček.

(Došlo 9. června 1931.)

Úloha: sestrojiti obecnou (neracionálnou) křivku rovinnou k^3 3. st. z devíti daných bodů $A, B, C, D, E, F, G, H, K$ řeší se zpravidla převedením na určení této křivky svazkem paprskovým a projektivním s ním svazkem kuželoseček; k čtyřem z daných bodů jako základním svazku kuželoseček vyhledá se (užitím konstrukce projektivní geometrie k daným pěti paprskům svazku a pěti bodům roviny vyhledati bod, z něhož se oněch 5 bodů promítá svazkem s danými 5 paprsky projektivním) příslušný bod protilehlý jako střed svazku paprskového.

V následujícím chci naznačiti jiný konstruktivní postup, opírající se o jednoduchý vztah: prostorová bikvadratika 1. druhu promítá se z libovolného svého bodu na rovinu oním bodem neprocházející do rovinné obecné křivky k^3 . Jsme tedy před úlohou stanoviti dvě plochy 2. st., jejichž proniková křivka by se promítala z jednoho svého bodu O do kubiky, procházející danými body A, B, \dots, K .

1. Čtyři z daných bodů A, B, C, D buďte v nákresně (půd. π). Z kuželoseček svazku jimi určeného vezmeme dvě: kuželosečku k^2 jdoucí bodem K (obr. 1, kde k^2 je kružnicí) a kuželosečku l^2 , procházející průsečíkem P spojnic $\overline{EF} \equiv a$, $\overline{GH} \equiv b$ zbývajících čtyř bodů (v obr. 1 bez újmy obecnosti voleno tak, že l^2 je kuželosečka složená z \overline{AB} , \overline{CD}). Přímký a , b protnou l^2 ještě v bodech Q, R . Bod K buď ortog. průmětem přímký $k \perp \pi$.

Jednu z ploch 2. st., K^2 , jdoucí kuželosečkou k^2 a přímkou k , určíme napřed pevně, druhou L^2 kuželosečkou l^2 akomodujeme tak, aby žádanému projekčnímu vztahu mezi pronikovou křivkou obou ploch $k^4 \equiv (K^2, L^2)$ a konstruovanou kubikou k^3 bylo vyhověno.

Považujme body E, F, G, H za centrálné průměty z (neznámého zatím) bodu O na k . Každým z oněch 4 bodů (v prostoru) nechť prochází jedna površka plochy K^2 , opačné soustavy než

površka k ; ortogonální průměty těchto površk jsou KE, KF, KG, KH , stopníky $2, 3, 4, 5$ na k^2 . Na površce $k \perp \pi$ zvolme body $2', 3'$, v nichž nechť ony površky body E, F (v prostoru) protínají k .

Plocha K^2 (sborcená) je určena: kuželosečkou k^2 , přímkou k a projektivním přiřazením bodů na k s příslušnými tečnými rovinami, kolnými k π , tedy bodu $2'$ na k přísluší stopa tečné roviny $\overline{KE2}$ a tedy i stopník 2 na k^2 ; bodu $3'$ bod 3 , bod $K \equiv 1 \equiv 1'$ je samodružný, poněvadž tečná rovina v něm je určena površkou k a tečnou ke k^2 . Sklopením k do nákresny dostaneme $k'(1', 2', 3', \dots) \pi k^2(1, 2, 3, \dots)$, při čemž $1' \equiv 1$. Promítnutím bodů $2', 3'$ na př. z bodu 3 na k^2 do bodů $2^*, 3^*(1^* \equiv 1)$ přenesena ona promětnost na kuželosečku k^2 , sestrojena direkční osa $\Delta \equiv ((1, (23^*, 2^*3))$. Na to stanoveny na k body $4', 5'$, odpovídající stopníkům $4, 5$ površek, jdoucích body G, H (v prostoru).

Budeme-li měniti střed centrální projekce O na k , budou se body, jejichž centrálné průměty jsou stále dané body E, F, G, H , pohybovati po čtyřech přímkách $22', 33', 44', 55'$. Pro bod $O \equiv K$ (stopník površky k) přejdou ony body v stopníky $2, 3, 4, 5$.

2. Hledejme plochu L^2 . Libovolným bodem O na k a přímkou $a \equiv \overline{EF}$ je stanovena rovina, jež protne površky $22', 33'$ v bodech E, F (jejichž centrálné průměty jsou stejné označeny). Potom pěti body: P, Q, O, E, F je stanovena kuželosečka h^2 , protínající kuželosečku l^2 v bodech P, Q . Její tečna t v bodě P stanoví s p rovinu τ . Rovina (O, b) protne površky $44', 55'$ v bodech G, H , rovinu τ v přímce t' ; i je body O, G, H, P a tečnou t' v P určena nová kuželosečka h'^2 , jež protne b ještě v bodě S , obecně různém od R . Kuželosečkami $l'^2 \equiv \overline{SQ}, \overline{AB}, h^2, h'^2$ je určena jistá plocha L'^2 , která se proniká s pevnou plochou K^2 v křivce 4. st., jejíž centrálný průmět z O na nákresnu je jistá kubika, procházející sedmi z daných bodů A, B, E, F, G, H, K , neprocházející ale body C, D , nýbrž body C', D' , v nichž spojnice \overline{QS} by protínala kuželosečku k^2 .*) I je třeba hledat takovou plochu L^2 a tedy takový bod O na k , aby kuželosečka h'^2 procházela bodem R .

Z udaného postupu je patrné, že každému bodu O na k přísluší jeden bod S na stopě b , t. j. obě řady bodové jsou jednoduše projektivní. Ukážeme ještě, že oněm řadám přísluší projektivně i svazek tečných rovin τ o ose $p \equiv \overline{AB}$, t. j. $k(O, \dots) \pi b(S, \dots) \pi p(\tau, \dots)$.

*) Kdyby obecněji kuželosečka l^2 svazku $(ABCD)$ bodem $P \equiv (a, b)$ nebyla složenou, možno vzíti za stopy ploch L'^2 kuželosečky svazku určitého bodem P , tečnou p ke kuž. l^2 v něm, bodem Q a na př. bodem A . Každá kuželosečka l'^2 tohoto svazku bodem S protne kuželosečku k^2 mimo A v třech proměnlivých bodech B', C', D' bodové involuce kubické, na níž by se rozšířila involuce kvadratická bodů C', D' o středu Q v našem speciálním případě. Pro $S \equiv R$ ovšem $l'^2 \equiv l^2$.

sklopením promítající roviny ($O\ 33'$) ($f' \perp \overline{K3}$) sestrojen ortog. průmět F_1 centrálního průmětu bodu F . Bod O se ortog. promítá do bodu K , takže ortog. průmět kuželosečky h^2 v rovině (Q, a) je určen body P, Q, K, E_1, F_1 . Přímka $\overline{E_1F_1} \equiv m_1$ je ort. průmětem přímky m , protínající površky $\overline{22'}$, $\overline{33'}$ plochy K^2 a mající stopník $U \equiv (m_1, a)$. Je tedy m površkou hyperboloidu H^2 , určeného přímkami $\overline{22'}$, $\overline{33'}$, a . Zvolme na m bod M , jímž a přímkou p , jakožto stopou tečných rovin ploch L^2 , je určena rovina τ , protínající se s rovinou (O, a) v přímce \overline{PM} , jež protne kuželosečku h^2 ještě v bodě P' , který sestrojíme užitím přímky Pascalovy, označivše $P \equiv 1, Q \equiv 3, F \equiv 4, E' \equiv 5, O \equiv 6, P' \equiv 2$. I je bod $M \equiv (12, 45), L \equiv (34, 61), N \equiv (23, 56), \overline{LMN} \equiv d$ přímkou Pascalovou; spojnice \overline{NQ} protne \overline{PM} v bodě $P' \equiv 2$. Hledejme nyní takovou polohu roviny svazku a , pro kterou bod $P' \equiv P$, t. j. kuželosečka h^2 se bude roviny τ v bodě P dotýkati. Tu měníci se bod M přímky d bude probíhati kuželosečku ψ^2 v obr. 2 naznačenou, jakožto řez hyperboloidu H^2 s rovinou τ , bod L popíše přímku l v rovině $(Q, \overline{33'})$ o stopníku $II \equiv (\overline{Q3}, \overline{KP})$ a jdoucí bodem $3'$. Kuželosečka ψ^2 jde body P, M , bodem I , v němž površka $\overline{23}$ v π protíná p , body E^*, F^* , průsečíky površek $\overline{22'}$, $\overline{33'}$ s τ . Bod E^* se snadno sestrojí: rovina $(m, \overline{22'})$ jako tečná rovina plochy H^2 má stopu $\overline{U2}$, protínající p v bodě γ , $\overline{\gamma M}$ dá na $\overline{22'}$ bod E^* ; podobně sestrojen bod F^* .

Přímka d vyplní tudíž površky sborcené plochy 3. stupně s určujícími přímkami a, l a kuželosečkou ψ^2 , s a jako površkou dvojnou, protínající ψ^2 v P . Bod N přímky d popíše při tom v promítající rovině površky $\overline{22'}$ křivku 3. st. s dvojným bodem E v nákrese na a . Dvě površky oné pl. 3. st., procházející bodem E , stanoví v něm s a tečné roviny této plochy; stopy těchto rovin na rovině τ (t. j. průměty nekonečně blízkých bodů k bodu E , jako P' byl průmětem bodu N z Q) dají dvě přímky $\overline{XP}, \overline{YP}$, pro něž $P' \equiv P$.

Abychom ony dvě površky sestrojili, stanovme průsečnici $\overline{T\varepsilon}$ roviny (E, l) s rovinou τ . Stopou roviny (E, l) je přímka \overline{EII} , protínající p v bodě ε , průsečík T přímky l s τ určíme sklopením promítající roviny přímky l (${}^{03}K \perp \overline{KP}, {}^{03}K = \overline{K3}, {}^{03}II \equiv {}^{0l}$), jež protne rovinu τ v přímce s , jež současně s l sklopena (stanovena kóta bodu M na m , $\overline{MM'} \parallel p$ protne s v bodě M' , $\overline{M_1^0M'} \perp \overline{KP}$, $M_1^0M' =$ kóta bodu M , náčez $\overline{P^0M'} \equiv {}^{0s}$). Průsečík ${}^{0T} \equiv ({}^{0l}, {}^{0s})$ má ortog. průmět T^1 , $\overline{T\varepsilon}$ je hledanou průsečnicí, jež protne kuželosečku ψ^2 v bodech X, Y . Jedním z těchto průsečíků je ale bod


$X = (x, \overline{TE})$, jakožto průsečík površky $x \equiv \overline{XE}$ soustavy površky m hyperboloidu H^2 , v promítající rovině $(k, 2)$; je tedy x površkou ploše H^2 a ploše 3. st. společnou. Křivka 3. st., jakožto geometrické místo bodu N , se tudíž rozpadá na přímku x a jistou kuželosečku. Druhý, lineární konstrukcí určený bod Y , vede tudíž k površce v bodě E od x různé, načež spojnice $\overline{YP} \equiv t$ je v rovině τ hledanou přímkou podstatnou, rovina (t, a) je jedinou rovinou svazku a , v níž výše uvedeným způsobem určená kuželosečka h^2 se dané roviny τ dotýká. Tím dokázána výše uvedená promětnost svazku tečných rovin τ s řadami na k, b .

K určení promětnosti $k(O, \dots) \pi b(S, \dots)$ stačí přiřazení tří párů bodových. Za body O na k zvoleny (obr. 1): bod $3'$, bod $6'$ a $1 \equiv K$.

Pro bod $O \equiv 3'$ dostaneme v rovině $(3', a)$ kuželosečku, jejíž ortog. průmět jde body P, Q, E_1, K s tečnou $\overline{K3}$ v tomto bodě. Tečna v bodě P nechť protne $\overline{K3}$ v bodě ν . Příslušná kuželosečka v rovině $(3', b)$ má za ortog. průmět kuželosečku body P, G_1, H_1 (konstrukce bodů G_1, H_1 patrna z obr., užito přímek $g' \perp \overline{K4}$, $h' \perp \overline{K5}$), bodem K a dotýkající se v bodě P přímky \overline{Pn} , průsečnice tečné roviny (p, ν) s rovinou $(3', b)$, kterou snadno sestrojíme: $\nu^1 \nu \parallel a$ jako hlavní přímka roviny (O, a) protne $3'P$ (průsečnici rovin $(3', a)$, $(3', b)$) v bodě ${}^1\nu$, jímž sestrojená hlavní přímka ${}^1\nu n \parallel b$ roviny $(3', b)$ protne hl. přímku \overline{mn} roviny tečné (p, ν) , v bodě n , \overline{Pn} je tečnou hledanou. Tím úplně určena kuželosečka roviny $(3', b)$, jež protne b v bodě III^* .

Za druhý bod zvolen $K \equiv 1$ v nákresně. Příslušná plocha L^2 přechází tu v útvar rovinný. Prvá kuželosečka je určena body $P, Q, K, 2, 3$, tečna k ní v bodě P je $\overline{P\mu}$. Kuželosečka druhá jde body $P, K, 4, 5$ a dotýká se v P přímkou \overline{Pm} , kterou sestrojíme analogicky přímcí \overline{Pn} v případě předchozím: $\mu^1 \mu \parallel a$ protne \overline{KP} v bodě ${}^1\mu$, ${}^1\mu m \parallel b$, $\overline{\mu m} \parallel p$ se protnou v bodě m , \overline{Pm} je tečnou v P druhé kuželosečky, jež protne b v bodě I^* .

Za třetí bod O na k zvolen bod $6'$, pro který se kuželosečka roviny $(6', a)$ [a tedy i roviny $(6', b)$] rozpadá na dvě přímky. Stačí sestrojiti bodem Q příčku površek $2'2, 3'3$: rovina $(2'2Q)$ o stopě $2'Q$ protne promítající rovinu površky $3'3$ v přímcí $2'\lambda$ ($\lambda \equiv \overline{2'Q}, \overline{K3}$), jež protne $3'3$ v bodě 1F , jehož konstrukce sklopením z obr. 1 je patrna; 1FQ je příčkou hledanou r . Rovina (a, r) protne k v bodě $6'$, jehož kóta $\overline{V_1V'}$ určena hlavní přímkou $\overline{KV'} \parallel a$, $\overline{V_1V'} \parallel \overline{{}^1F}{}^1F_1$ protne $\overline{Q'F'}$ v bodě V' . Je tedy prvá kuželosečka složenou



Obr. 3.

z přímek r , $\overline{6'P}$. Přímkou $\overline{G'H}$, spojnice průmětů bodů G, H z bodu G' , protne b v bodě VI^* .

Tím jsou si na k, b přiřazeny: $3', I', 6'$; III^*, I^*, VI^* . Převeďme-li obě řady v polohu perspektivní tím, že na př. ztotožníme $I^* \equiv I' \equiv OI$, jímž sestrojíme v nákrešně libovolnou přímkou a a naneseme na ni úsečky $\overline{I^*O3}$, $\overline{I^*O6}$, rovné kotám bodů $3', 6'$, je bod

$\omega \equiv (\overline{III^{*03}}, \overline{VI^{*06}})$ perspektivním středem obou řad; ten spojen s bodem R dá na druhé nositelce bod 0O , načež v úsečce $\overline{I^{*0}O}$ je kóta hledaného bodu O na k . Tím určena i plocha L^2 .

3. V obr. 3 naznačeny všechny tři kuželosečky l^2, h^2, h'^2 (h^2 v rovině (O, a) , h'^2 v rovině (O, b)), dvojnásobně se protínající, s tečnou rovinou v bodě P , jimiž je plocha L^2 úplně určena. Z bodu O promítá se proniková křivka $k^4 \equiv (K^2, L^2)$ do kubiky, určené právě danými body A, B, C, \dots, K . Jí patří i bod γ , stopník površky $\overline{O\gamma}$ plochy K^2 na kuželosečce k^2 , jako šestý průsečík konstruované kubiky s k^2 , jakož i bod VII , stopník tečny křivky k^4 v bodě O , t. j. průsečík stopy $\overline{a\beta}$ tečné roviny plochy L^2 v bodě O (α je průsečík tečny kuželosečky h_1^2 v bodě K s a , β průsečík tečny kuželosečky $h_1'^2$ v K s b) se stopou $\overline{K\gamma}$ tečné roviny ke K^2 .

Bod K je centrálným průmětem druhého průsečíku Z plochy K^2 s $k \perp \pi$, stopa tečné roviny ke K^2 v tomto bodě už tečnou naší křivky k^3 .

Konstrukce dalších bodů je už patrna: libovolná rovina přímkou k protne plochu K^2 (mimo k) v površce j , plochu L^2 v kuželosečce j^2 , jejichž dva průsečíky (vedle pevných O, Z) centrálně z O do nákresny promítnuty dají dva body křivky k^3 .

Tečna křivky k^3 v libovolném jejím bodě se sestrojí jako centrálný průmět tečny ke křivce k^4 v odpovídajícím bodě; známá konstrukce oskulační roviny v bodě křivky k^4 zprostředkuje i konstrukci oskulační kružnice naší křivky k^3 , atd.

*

Note sur la construction d'une cubique plane générale.

(Extrait de l'article précédent.)

Cette construction est effectuée par la résolution du problème: déterminer deux quadriques dont l'intersection est projetée d'un de ses points sur le plan suivant la cubique passant par neuf points donnés.