

# Časopis pro pěstování matematiky a fyziky

---

Václav Štěpánek

Analytické a synthetické studium křivky třetího stupně dané třemi páry konjugovaných bodů. Singularity

Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, Vol. 71 (1946), No. Suppl., D62--D68

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/122829>

## Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1946

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

losti  $V^1V$  ( $B^1B' \perp BO$ ), směru však opačného, je rychlost  $V^1V'$  bodu  $V'$  ve směru kolmém na  $VV'$  omezena spojnicí  $V^1B'$ .

Okamžitý střed otáčení  $V$ , normály  $n_v$ , tedy střed křivosti pro vrchol  $V$ , je v průsečíku normály  $n_v$  se spojnicí  $V^1V'$ .

Obdobná jednoduchá konstrukce je i pro počátku bližší průsečík křivky (c) s trajektorií (b). Tam ovšem rychlosti  $V^1V$  a  $B^1B'$  jsou sobě rovné velikostí i směrem.

## Analytické a synthetické studium křivky třetího stupně dané třemi páry konjugovaných bodů. Singularity.

Dr Václav Štěpánský, Mor. Ostrava.

Východiskem našich úvah je věta: Geometrické místo bodu, jehož spojnice se třemi body roviny ( $A, B, C$ ) protínají tři přímky roviny ( $o_1, o_2, o_3$ ) v bodech ležících na téže přímce, je obecná křivka třetího stupně. Důkaz této věty podal H. Grassmann<sup>1)</sup> pomocí bodového počtu a A. Clebsch pomocí eliptických argumentů. Podáme jednoduchý analytický důkaz věty, ukážeme, že toto určení křivky je totožné s určením třemi páry konjugovaných bodů, budeme se zabývat konstrukcemi křivky takto určené a vyšetřovati případy singulární.

Trojúhelník určený body  $A, B, C$  nazývejme trojúhelníkem prvořadým a trojúhelník o stranách  $o_1, o_2, o_3$  a vrcholech  $O_1, O_2, O_3$  ( $o_1$  proti  $O_1$ ) trojúhelníkem druhořadým. Druhořadý trojúhelník zvolme za základní trojúhelník projektivních souřadnic. Souřadnice bodu  $O_1$  jsou  $1 : 0 : 0$ , bodu  $O_2$   $0 : 1 : 0$  a bodu  $O_3$   $0 : 0 : 1$ . Souřadnice bodů  $A, B, C$  jsou  $a_1 : a_2 : a_3$  resp.  $b_1 : b_2 : b_3$  a  $c_1 : c_2 : c_3$ . Hledáme rovnici geometrického místa bodů  $X(x_1, x_2, x_3)$ . Pro spojnicí  $\overline{XA}$  dostáváme rovnici

$$\begin{vmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = 0,$$

kde  $\xi_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) jsou souřadnice proměnného bodu této přímky. Podobně  $\overline{XB}$  a  $\overline{XC}$  mají rovnice

$$\begin{vmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ resp. } \begin{vmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Pro průsečný bod  $M(m_1, m_2, m_3)$  přímek  $\overline{XA}, \overline{XB}, \overline{XC}$  určíme souřad-

<sup>1)</sup> Crellet's Journal, 86, str. 117.

nice ze soustavy

$$\xi_1 + 0 \cdot \xi_2 + 0 \cdot \xi_3 = 0 \text{ a } \xi_1 \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ a_2 & a_3 \end{vmatrix} + \xi_2 \begin{vmatrix} x_3 & x_1 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} + \xi_3 \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} = 0.$$

poměrem

$$m_1 : m_2 : m_3 = 0 : \begin{vmatrix} x_2 & x_1 \\ a_2 & a_1 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} x_3 & x_1 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix}$$

a podobně souřadnice průsečíku  $N \equiv (\overline{XB} \cdot \overline{O_1O_3})$

$$n_1 : n_2 : n_3 = \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} : 0 : \begin{vmatrix} x_3 & x_2 \\ b_3 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Konečně bod  $P \equiv (\overline{XC} \cdot \overline{O_1O_2})$  je stanoven poměrem

$$p_1 : p_2 : p_3 = \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} : 0.$$

Body  $M, N, P$  budou ležeti na přímce, když

$$\begin{vmatrix} 0 & \begin{vmatrix} x_2 & x_1 \\ a_2 & a_1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} x_3 & x_1 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} & 0 & \begin{vmatrix} x_3 & x_2 \\ b_3 & b_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Pouhým dosazením příslušných souřadnic se přesvědčíme, že křivka třetího stupně určená touto rovnicí prochází jednak šesti body  $O_1, O_2, O_3, A, B, C$  a ještě těmito dalšími šesti průsečíky  $(\overline{AB} \cdot \overline{O_1O_2}) \equiv O'_3, (\overline{AO_2} \cdot \overline{BO_1}) \equiv O''_3, (\overline{AC} \cdot \overline{O_1O_3}) \equiv O'_2, (\overline{AO_3} \cdot \overline{CO_1}) \equiv O''_2, (\overline{BC} \cdot \overline{O_2O_3}) \equiv O'_1, (\overline{BO_3} \cdot \overline{CO_2}) \equiv O''_1$ . V této konfiguraci určují však body křivky třetího stupně podle Cayleye<sup>2)</sup> čtveřiny korespondenční; jsou to čtveřiny  $A, O_1; B, O_2; A, O_1; O_3C - B, O_2; CO_3$ , z čehož dále vyplývá, že dvojice na př.  $A, O_1; BO_2; O'_3O''_3$  určují 6 vrcholů úplného čtyřstranu vepsaného naší křivce a jsou tudíž páry bodové  $AO_1; BO_2; CO_3; O'_1O''_1; O'_2, O''_2; O'_3, O''_3$  dvojiny bodů konjugovaných (Cayley tamtéž).


Připomeňme si ještě, co máme rozuměti pod obecnou polohou trojiny konjugovaných párů bodových. Nemá-li křivka degenerovati, je nutné, aby se žádný z činitelů  $a_1, b_2, c_3$  nerovnal nule, to znamená, že nesmí žádný z bodů  $A, B, C$  konjugovaný k příslušnému z trojiny  $O_1, O_2, O_3$  ležeti na spojnici zbývajících bodů této trojiny. Ze stejného důvodu je nutné, aby platily vztahy  $a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0, a_1c_3 - a_3c_1 \neq 0$  a  $b_2c_3 - b_3c_2 \neq 0$ , což značí geometricky, že spojnice dvou bodů z trojice  $A, B, C$  nesmí procházeti třetím

<sup>2)</sup> Mémoire sur les courbes du troisième ordre, Liouville Journal 9, str. 288.

bodem z trojice  $O_1, O_2, O_3$ . Když jsme si takto zajistili zcela obecnou polohu daných konjugovaných párů, můžeme přistoupiti ke konstrukci naší křivky (obr. 1).

Zvolili jsme konjugované páry  $a, o_1; b, o_2; c, o_3$  (v obrazcích jsou body označeny písmeny malými a přímky velkými). Budeme vyhledávat body křivky na paprscích svazku  $o_1$ .

Vytkněme na zvoleném paprsku  $^1O$  body  $1, 2, 3, 4, \dots$  libovolně a promítněme tuto řadu jednak z bodu  $a$  na  $o_2o_3$ , dostaneme řadu



Obr. 1

$1^a, 2^a, \dots$  a jednak z bodu  $b$  na  $o_1o_3$  do bodů  $1^b, 2^b, \dots$ . Řady  $1^a, 2^a, \dots, 1^b, 2^b, \dots$  jsou projektivní a spojnice  $1^a1^b, 2^a2^b, 3^a3^b, \dots$  obalují kuželosečku. Bodům  $1, 2, \dots$  přísluší jednoznačně tečny této kuželosečky ( $K^2$ ). Na paprscích  $^1O$  a  $o_1o_2$  vzniká pak následující příbuznost: bodu  $1$  na  $^1O$  přísluší jednoznačně průsečík  $(1^a1^b \cdot o_1o_2) \equiv 1'$ ; obecně libovolnému bodu  $j$  řady  $^1O$  přísluší jediný bod  $j'$  řady  $o_1o_2$ , naopak to však neplatí. Bodu  $j'$  řady  $o_1o_2$  přísluší dva body řady  $^1O$ , které dostaneme, když z bodu  $j'$  vedeme tečny ke  $K^2$  a jejich průsečíky s přímkami  $o_2o_3, o_1o_3$  spojíme s body  $a, b$ . Průsečík těchto spojnic je bod  $j$ .

Příbuznost ve směru  $1, 1'$  je jednojednoznačná a ve směru  $1'1$  jednodvoznačná, bod  $o_1$  je jejím bodem samodružným a tudíž obalují spojnice  $11', 22', \dots$  opět kuželosečku, označme ji  $L^2$ . Vedeme-li bodem  $c$  tečny ke kuželosečce  $L^2$ , protnou tyto paprsek  $^1O$

ve dvou bodech  ${}^1x, {}^2x$ , jež jsou body uvažované křivky třetího stupně. V obraze byly též sestrojeny přímky  ${}^1X, {}^2X$ , které náležejí podle definice křivky bodům  ${}^1x, {}^2x$ . Z uvedené konstrukce jednotlivých bodů křivky se potvrzuje, že je křivka skutečně stupně třetího. Ukázali jsme konstrukci bodů křivky, jež se nacházejí na paprscích svazku  $o_1$  (nebo  $o_2, o_3$ ), podobně můžeme určovat body křivky na paprscích svazků o vrcholech  $a, b, c$ .

Mysleme si na př. bodem  $a$  libovolný paprsek  $A$  a zvolme na  $A$  řadu bodů  $1, 2, 3, \dots$  a promítneme ji z bodu  $b$  na  $o_1o_3$ , dostaneme řadu  $1^b, 2^b, \dots$  a promítnutím z bodu  $c$  na přímku  $o_1o_2$  řadu  $1^c, 2^c, \dots$ . Řady bodové  $1^b, 2^b, \dots$  a  $1^c, 2^c, \dots$  jsou projektivní a jejich spojnice obalují kuželosečku ( $A^2$ ), která se dotýká přímkou  $o_1o_3, o_1o_2$ . Kdybychom pak vedli k této kuželosečce tečny z bodu  $a$ , pak tyto tečny  $X_1, X_2$  mají tu vlastnost, že jejich průsečíky s přímkami  $o_1o_2, o_1o_3, o_2o_3$  spojeny resp. s body  $a, b, c$  určují tři paprsky, jež procházejí jediným bodem  $x_1, (x_2)$  naší křivky třetího řádu. Body tyto leží současně na vytčeném paprsku  $A$ .

#### Případy singulární.

Nechť  $o_1 \equiv a$ , po dosazení do rovnice křivky  $a_1 = 1, a_2 = 0$  a  $a_3 = 0$  obdržíme rovnici křivky ve tvaru

$$x_2 \begin{vmatrix} x_3 & x_2 \\ b_3 & b_2 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + x_1 \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0;$$

křivka je racionální a má dvojný bod v bodě  $o_1 \equiv a$ . Výsledek můžeme vysloviti větou: Geometrickým místem bodů  $x$  té vlastnosti, že paprsky směřující z těchto bodů ke třem pevným bodům  $a_1 \equiv o_1, b, c$  protínají strany trojúhelníka  $a \equiv o_1, o_2, o_3$  resp.  $O_1, O_2, O_3$  vždy ve třech bodech ležících na přímce, je křivka třetího stupně s dvojným bodem v bodě  $a \equiv o_1$  a dvěma páry konjugovaných bodů  $b, o_2, a, c, o_3$ .


Na podkladě geometrické definice křivky sestrojíme její body na paprscích svazku  $o_1 \equiv a$  (obr. 2). Vedme bodem  $a$  paprsek  $M$ , který protíná křivku v bodě  $m$ . Spojíme-li bod  $m$  s vrcholy  $a, b, c$  a tyto spojnice protínáme se stranami  $O_1, O_2, O_3$ , dostáváme body  $m^a, m^b, m^c$ , které leží na přímce  $M^0$ . Vytkneme-li si tedy paprsek  $M$ , můžeme zjistiti jeho průsečík s křivkou, budeme-li znáti polohu přímky  $M^0$ .

Z bodů  $m^b, m^c$  můžeme sestrojiti bod  $m$  dvěma způsoby a tím si zajistíme i přesnost konstrukce tohoto bodu.

Zvolme na  $M$  řadu bodů  $1, 2, 3, \dots$  a promítneme tyto řadu jednak z bodu  $b$  na přímku  $o_1o_3$  do bodů  $1^b, 2^b, \dots$  a jednak z bodu  $c$  na přímku  $o_1o_2$  do bodů  $1^c, 2^c, \dots$ , řady tyto budou projektivní a pro-

tože mají bod  $o_1$  samodružný, budou též perspektivní se středem perspektivity  $s \equiv (1^b 1^c \cdot 2^b 2^c)$ . Spojíme-li bod  $m^a$  se středem  $s$ , dostáváme přímkou  $M^0$ .

Otáčeli-li se paprsek  $M$  kolem středu  $o_1 \equiv a$ , mění i střed perspektivity  $s^m$  svoji polohu a vztah je tu jednoduchý. Střed perspektivity  $s^m$  pohybuje se po přímce  $\overline{bc}$ , jednoznačně příbuz-




Obr. 2.

nost bodů  $s^m$  a  $(M \cdot \overline{bc})$  je involutorní a z bodu  $o_1$  se promítá tato involuce involucí svazku paprskového, jejíž samodružné paprsky splývají s tečnami dvojného bodu  $o_1 \equiv a$ . Tato involuce je tudíž totožná s involucí, jež promítá konjugované páry bodů naší křivky. Střed perspektivity uvažovaných projektivních řad  $1^b, 2^b, \dots, 1^c, 2^c, \dots$  pro libovolný paprsek  $M$  leží na  $\overline{bc}$  z toho důvodu, že prvky řad příslušné průsečniku  $(M \cdot \overline{bc})$  leží na spojnici  $\overline{bc}$ . Involuce svazku plyne z involutorní příslušnosti paprsků  $o_1 o_2$  a  $o_1 c$ . Paprsek  $M$  může

splynouti s příslušným paprskem  $o_1 s^m$  jen v tom případě, když bod  $m$  splývá s bodem  $o_1 \equiv a$ , tedy na tečně v dvojném bodě křivky. Přímkou  $M^0$  jako spojnice bodů  $s^m$  a  $m^a$  určují na přímkách  $bc$  a  $o_2 o_3$  projektivní řady a obalují kuželosečku ( $\Sigma^2$ ), která se dotýká tečen v dvojném bodě naší kubické křivky (obr. 2).

Na podkladě vyšetřených vztahů můžeme sestrojovati racio-



nální křivku třetího stupně, když je dána některým z následujících způsobů určení.

1. Racionální křivka třetího stupně je dána bodem dvojným a dvěma páry bodů konjugovaných.

2. Křivka  $C_4^3$  je dána bodem dvojným, jedním párem bodů konjugovaných a ještě dalšími třemi body obyčejnými.

3. Křivka  $C_4^3$  je dána bodem dvojným s příslušnými tečnami a dalšími čtyřmi svými obecnými body, z nichž dva mohou být sdruženě imaginární. A pod.

Specialisujeme-li dále polohu vrcholů  $a, b, c, o_1, o_2, o_3$ , dojdeme až ke konstrukci a vlastnostem kuželosečky.

Zvolme na př.  $a \equiv o_1, b \equiv o_2$ , pak dostáváme po úpravě rovnici

$$x_2 x_3 \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + x_1 x_3 \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0,$$

křivka se rozpadá v přímku  $x_3 = 0$  a v kuželosečku  $2x_1 x_2 c_3 - x_3 (x_2 c_1 + x_1 c_2) = 0$ . Body  $o_1, o_2, o_3, c$  budou míti na kuželosečce nějakou zvláštní vzájemnou polohu. Určíme rovnice tečen naší kuželosečky v bodech  $o_1, o_2, o_3$ . Bod  $o_1$  má tečnu  $2c_3 x_2 - c_2 x_3 = 0$ , v bodě  $o_2$  je tečna  $2c_3 x_1 - c_1 x_3 = 0$  a tečna v bodě  $o_3$  má rovnici  $c_2 x_1 + c_1 x_2 = 0$ . Z prvních dvou rovnic můžeme odvoditi ještě rovnici  $c_2 x_1 - c_1 x_2 = 0$ . Dospíváme k větě: Zvolíme-li na kuželosečce tři body  $o_1, o_2, o_3$  a bod čtvrtý  $c$  na spojnici pólů  $o'_3$  přímky  $o_1 o_2$  s bodem  $o_3$ , pak můžeme považovati kuželosečku za geometrické místo bodů té vlastnosti, že jejich spojnice s body  $o_1, o_2, c$  protnou přímky  $o_2 o_3, o_1 o_3, o_1 o_2$  (vždy v uvedeném pořadí) v bodech, jež leží na přímce. Ke každému bodu kuželosečky přináleží tímto způsobem určitá přímka a všechny tyto přímky procházejí bodem  $o'_3$  (pólem přímky  $o_1 o_2$ ). Dalším rozborem rovnice naší kuželosečky a z její geometrické definice mohli bychom zjistiti ještě jiné vztahy a konstrukce, jako příklad uvádíme konstrukci čtvrtého společného průsečíku dvou kuželoseček; řešení této úlohy je patrné z obrazce (obr. 3).

Mohli bychom uvažovati také ještě o jiných speciálních případech polohy bodů  $a, b, c, o_1, o_2, o_3$ . K zajímavějším výsledkům však dospějeme, budeme-li se zabývati rozšířením našich úvah do prostoru trojrozměrného a vícerozměrného.