

Bohdan Zelinka

Graf systému tětiv dané kružnice

*Matematicko-fyzikálny časopis*, Vol. 15 (1965), No. 4, 273--279

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126450>

## Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1965

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

## GRAF SYSTÉMU TĚTIV DANÉ KRUŽNICE

BOHDAN ZELINKA, Liberec

V tomto článku je studován graf, jehož množinou uzlů je určitá podmnožina množiny tětív dané kružnice, přičemž dva různé uzly jsou spojeny hranou právě tehdy, jestliže jim odpovídající tětivy mají společný bod. Studium takovýchto grafů bylo navrženo A. Kotzigem na kolokviu o teorii grafů v Halle roku 1960.

Budiž dána kružnice  $k$  a budiž  $\mathcal{T}$  množina jejích tětív. Symbolem  $G_k$  označíme graf, jehož množinou uzlů je  $\mathcal{T}$  a dva uzly jsou spojeny hranou právě tehdy, jestliže jim odpovídající tětivy mají společný bod. Za tětivu považujeme i každý bod kružnice  $k$ . Buďtež nyní  $A_1, \dots, A_n$  body na kružnici  $k$  takové, že orientovaný úhel  $\widehat{A_n S A_m}$  ( $S$  je střed kružnice  $k$ ) je roven  $2\pi m/n$  pro  $m = 1, \dots, n$ ; budiž  $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$ . Množinu tětív kružnice  $k$ , jejichž oba koncové body patří do  $\mathcal{A}$ , označíme  $\mathcal{T}(n)$ . Podgraf grafu  $G_k$  indukovaný množinou  $\mathcal{T}(n)$ , to jest podgraf skládající se ze všech uzlů množiny  $\mathcal{T}(n)$  a všech hran spojujících některé dva uzly z  $\mathcal{T}(n)$  označíme  $G_k(n)$ . Budeme studovat vlastnosti především tohoto grafu, protože je konečný. Předpoklad o velikostech úhlů  $\widehat{A_n S A_m}$  jsme učinili jen pro zjednodušení určitých úvah, jinak zde vlastně záleží jen na uspořádání bodů na kružnici. Místo kružnice bychom vůbec mohli uvažovat libovolnou uzavřenou jednoduchou konvexní rovinnou křivku, aniž by se změnila výsledky, k nimž se dochází v tomto článku.

Zavedeme si ještě pomocný pojem hodnoty uzlu v  $G_k(n)$ . Jestliže uzel  $u$  grafu  $G_k(n)$  odpovídá tětívě  $A_i A_j$  ( $1 \leq i \leq j \leq n$ ), pak hodnotou uzlu  $u$  je  $h(u) = \min(j - i, n + i - j)$ . Zřejmě  $0 \leq h(u) \leq \frac{1}{2}n$ .

Snadno se dokáže následující tvrzení.

*Počet uzlů grafu  $G_k(n)$  je roven  $\frac{1}{2}n(n+1)$ .*

*Stupeň uzlu  $u$  v grafu  $G_k(n)$  je roven  $[h(u)+1][n-h(u)+1]-2$ .*

Druhé tvrzení plyne z toho, že při  $h(u) > 0$  tětiva  $u$  rozdělí kružnici na dva oblouky  $o_1$  a  $o_2$ , jejichž vnitřky obsahují po řadě  $h(u)-1$  a  $n-h(u)-1$  bodů z  $\mathcal{A}$ . Spojíme-li každý bod z  $\mathcal{A}$  náležející vnitřku  $o_1$  s každým bodem z  $\mathcal{A}$  náležejícím vnitřku  $o_2$ , dostaneme  $[h(u)-1][n-h(u)-1]$  tětív,

z nichž každá má společný bod s  $u$ . Dále každý z koncových bodů tětivy  $u$  je incidentní s  $n - 1$  tětivami různými od  $u$ , máme tedy celkem  $[h(u) - 1] \times [n - h(u) - 1] + 2(n - 1) = [h(u) + 1][n - h(u) + 1] - 2$  tětiv, které mají společné body s  $u$ . Lze dokázat, že ostatní tětivy společné body s  $u$  nemají. Je-li  $h(u) = 0$ , je  $u$  tvořena jediným bodem a ten je incidentní právě s  $n - 1$  tětivami různými od  $u$ .

Analogicky lze dokázat další tvrzení.

*Množina všech uzlů o dané hodnotě  $h(u)$  tvoří pravidelný podgraf stupně  $2h(u)$  při  $h(u) < \frac{1}{2}n$  a pravidelný podgraf stupně  $h(u)$  při  $h(u) = \frac{1}{2}n$ .*

Nyní si odvodíme některé další vlastnosti.

**Věta 1.** *Číslo vnitřní stability (viz [1]) grafu  $G_k(n)$  je rovno  $n$ .*

Důkaz. Množina všech uzlů  $u$ , pro něž  $h(u) = 0$ , je zřejmě vnitřně stabilní, protože jim odpovídající tětivy jsou tvořeny jedním bodem a dvě různé takovéto tětivy nemohou mít společný bod. Těchto uzlů je  $n$ , tudíž číslo vnitřní stability je nejméně  $n$ . Máme-li nyní libovolnou vnitřně stabilní množinu o  $m$  prvcích, je celkový počet koncových bodů tětiv této množiny nejméně roven  $m$ , neboť každá tětiva má jeden nebo dva koncové body a dvě tětivy této množiny nemohou mít společný bod, tedy speciálně nemohou mít společný koncový bod. Musí být tedy  $m \leq n$ . Tím je věta dokázána.

**Věta 2.** *Číslo vnější stability (viz [1]) grafu  $G_k(n)$  je pro sudé  $n$  rovno  $\frac{1}{2}n$ , pro liché  $n$  je rovno  $\frac{1}{2}(n + 1)$ .*

Důkaz. Množina tětiv  $A_i A_{n+1-i}$  pro  $i = 1, \dots, \frac{1}{2}n$  při  $n$  sudém, resp. pro  $i = 1, \dots, \frac{1}{2}(n + 1)$  při  $n$  lichém je zevně stabilní, neboť koncové body tětiv této množiny vyplňují celou množinu  $\mathcal{A}$ , tudíž každá další tětiva má společný koncový bod alespoň s jednou z tětiv této množiny. Číslo vnější stability je tedy nejvýše  $\frac{1}{2}n$ , resp.  $\frac{1}{2}(n + 1)$ . Máme-li nyní zevně stabilní množinu o  $m$  prvcích, pak koncových bodů tětiv této množiny je nejvýše  $2m$ . Kdyby bylo  $m \leq \frac{1}{2}n - 1$  pro  $n$  sudé, resp.  $m \leq \frac{1}{2}(n - 1)$  pro  $n$  liché, bylo by těchto bodů nejvýše  $n - 2$ , resp.  $n - 1$  a existoval by bod z  $\mathcal{A}$ , který by nebyl koncovým bodem žádné z tětiv zmíněné množiny. Tento bod by však sám tvořil tětivu, která by byla bez společného bodu s kteroukoli z tětiv této množiny, tudíž by tato množina nebyla zevně stabilní.


**Věta 3.** *Chromatické číslo grafu  $G_k(n)$  je rovno  $n$ .*

Důkaz. S každým bodem množiny  $\mathcal{A}$  je incidentních právě  $n$  tětiv. Tyto tětivy tedy tvoří podgraf, který je úplným grafem o  $n$  uzlech, tudíž jej nelze zbarvit méně než  $n$  barvami. Je-li nyní dáno celé číslo  $p$ ,  $1 \leq p \leq n$ , označme  $\mathcal{M}_p$  množinu uzlů odpovídajících tětivám  $A_i A_{p-i}$  pro všechna  $i = 1, \dots, n$ , přičemž rozdíly indexů bereme modulo  $n$ . Je zřejmé, že tětivy množiny  $\mathcal{M}_p$  jsou navzájem rovnoběžné, pokud nejsou tvořeny jedním bodem; je-li některá z nich tvořena jedním bodem, není tento bod koncovým bodem žádné jiné

tětivy z  $\mathcal{M}_p$ . Vytvoříme-li množiny  $\mathcal{M}_p$  pro každé  $p = 1, \dots, n$ , můžeme snadno dokázat, že každá tětiva patří právě do jedné z množin  $\mathcal{M}_p$ . Můžeme tedy uzly grafu  $G_k(n)$  zbarvit tak, že uzly náležející do téže množiny  $\mathcal{M}_p$  zbarvíme vždy touž barvou.

**Věta 4.** *Uzlový stupeň souvislosti mezi dvěma uzly  $u$  a  $v$  v grafu  $G_k(n)$  při  $h(u) \leq h(v)$  je roven  $[h(u) + 1][n - h(u) - 1]$ , jestliže odpovídající tětivy nemají společný bod,  $[h(u) + 1][n - h(u) + 1] - 4$ , jestliže mají společný vnitřní bod,  $[h(u) + 1][n - h(u) + 1] - 2 - h(u)$ , jestliže mají společný koncový bod.*


**Důkaz.** Uzlový stupeň souvislosti mezi dvěma uzly grafu je definován v případě, že tyto uzly nejsou spojeny hranou, jako minimální počet uzlů, které je třeba odstranit, aby v grafu takto získaném ležely dané uzly v různých komponentách; v případě, že jsou tyto uzly spojeny hranou, je roven stupni souvislosti těchto uzlů v grafu vzniklém odstraněním této hrany zvětšenému o jednu. Provedeme důkaz nejprve pro případ dvou uzlů, které nejsou spojeny hranou. Mějme dány dva uzly  $u, v$  v grafu  $G_k(n)$ , které nejsou spojeny hranou a budiž  $h(u) \leq h(v)$ . Uzly  $u, v$  nechť odpovídají po řadě tětivám  $MN, PQ$  (obr. 1). Oblouky budeme brát vždy tak, že jdeme od počátečního ke koncovému bodu proti směru pohybu hodinových ručiček. Dokážeme, že v  $G_k(n)$  existuje  $[h(u) + 1][n - h(u) - 1]$  cest mezi  $u$  a  $v$ , které nemají společné uzly kromě  $u$  a  $v$ . Z toho podle Mengerovy věty plyne, že uzlový stupeň souvislosti mezi  $u$  a  $v$  je roven nejméně  $[h(u) + 1][n - h(u) - 1]$ .



Obr. 1.

Máme-li bod  $V$  (resp.  $W$ ) uvnitř oblouku  $NM$ , existuje  $h(u) + 1$  tětiv z  $\mathcal{F}(n)$ , které spojují  $V$  (resp.  $W$ ) s body oblouku  $MN$  a zřejmě to jsou právě všechny tětivy z  $\mathcal{F}(n)$  procházející bodem  $V$  (resp.  $W$ ), které mají společný bod s tětivou  $MN$ . Jestliže  $V$  leží na oblouku  $PQ$ , pak tyto tětivy mají společný bod i s tětivou  $PQ$ . Ke každé takovéto tětivě  $VZ$  existuje tedy cesta složená z uzlů odpovídajících tětivám  $MN, VZ, PQ$ . Žádné dvě z těchto cest nemají zřejmě společný uzel kromě  $u$  a  $v$ . Jestliže  $W$  neleží na oblouku  $PQ$ ,

pak žádná z tětiv  $WZ$ , kde  $Z$  leží na oblouku  $MN$ , nemá společný bod s tětivou  $PQ$ . Každé z těchto tětiv lze však přiřadit tětivu  $WY$ , kde  $Y$  leží na oblouku  $PQ$  (a tedy tětiva  $WY$  má společný bod s tětivou  $PQ$ ), a to tak, aby různým tětivám  $WZ$  byly přiřazeny různé tětivy  $WY$  (to lze, neboť takovéhoto tětiv  $WY$  při daném  $W$  může být celkem  $h(v) + 1$ , což je větší nebo rovno  $h(u) + 1$ ). Uzly odpovídající tětivám  $MN$ ,  $WZ$ ,  $WY$ ,  $PQ$  tvoří cestu, přičemž dvě různé takovéto cesty nemají společný uzel kromě  $u$  a  $v$  a nemají jej ani s cestami dříve popsány. Ke každému bodu uvnitř oblouku  $NM$  tedy přísluší  $h(u) + 1$  cest. Poněvadž vnitřek oblouku  $NM$  obsahuje  $n - h(u) - 1$  bodů z  $\mathcal{A}$ , je celkový počet cest roven  $[h(u) + 1][n - h(u) - 1]$ . Tedy uzlový stupeň souvislosti mezi  $u$  a  $v$  je nejméně roven tomuto číslu. Odstraníme-li nyní množinu  $\mathcal{T}_0$  tětiv z  $\mathcal{T}(n)$  spojujících bod oblouku  $MN$  s bodem vnitřku oblouku  $NM$ , lze rozložit zbylou množinu tětiv z  $\mathcal{T}(n)$  na dvě disjunktní podmnožiny  $\mathcal{T}_1$  a  $\mathcal{T}_2$ , kde  $\mathcal{T}_1$  (resp.  $\mathcal{T}_2$ ) je množina tečen z  $\mathcal{T}(n)$ , jejichž oba koncové body leží na oblouku  $MN$  (resp. uvnitř oblouku  $NM$ ), tedy které leží v kruhové úseči určené obloukem  $MN$  (resp. uvnitř kruhové úseče určené obloukem  $NM$ ). Protože kruhová úseč je konvexní množina, nemá žádná tětiva z  $\mathcal{T}_1$  společný bod se žádnou tětivou z  $\mathcal{T}_2$ . Poněvadž tětiva  $MN$  je v  $\mathcal{T}_1$ , tětiva  $PQ$  v  $\mathcal{T}_2$ , znamená to, že v grafu vzniklém odstraněním množiny  $\mathcal{T}_0$  z  $G_k(n)$  uzly odpovídající tětivám  $MN$ ,  $PQ$  spolu nesouvisí. Protože  $|\mathcal{T}_0| = [h(u) + 1][n - h(u) - 1]$ , je tento výraz roven uzlovému stupni souvislosti mezi  $u$  a  $v$ .



Obr. 2.

Mějme nyní případ, že tětivy  $MN$  a  $PQ$  mají společný vnitřní bod (obr. 2). Dokážeme nejprve, že oblouk  $NQ$  (resp.  $QM$ ) obsahuje aspoň tolik bodů z  $\mathcal{A}$ , kolik obsahuje oblouk  $MP$  (resp.  $PN$ ). Víme, že oblouky  $MN$ ,  $PQ$  obsahují po řadě  $h(u) + 1$ ,  $h(v) + 1$  bodů z  $\mathcal{A}$ . Nechť oblouk  $MP$  obsahuje  $q$  bodů z  $\mathcal{A}$ ; pak oblouky  $PN$ ,  $NQ$ ,  $QM$  obsahují po řadě  $h(u) - q + 1$ ,  $h(v) - h(u) + q$ ,  $n - h(v) - q + 1$  bodů z  $\mathcal{A}$ . Pro počty bodů z  $\mathcal{A}$  na obloucích  $NQ$ ,  $MP$  platí  $h(v) - h(u) + q \geq q$ , neboť tuto nerovnost lze odvodit ekvivalentními úpravami z nerovnosti  $h(v) \geq h(u)$ , což platí podle předpokladu. Pro počty

bodů z  $\mathcal{A}$  na obloucích  $QM$ ,  $PN$  platí  $n - h(v) - q + 1 \geq h(u) - q + 1$ , což lze odvodit ekvivalentními úpravami z nerovnosti  $n \geq h(u) + h(v)$ , která rovněž platí, poněvadž  $h(u) \leq \frac{1}{2}n$ ,  $h(v) \leq \frac{1}{2}n$ . Tětivy spojující bod oblouku  $MP$  (resp.  $PN$ ) s bodem oblouku  $NQ$  (resp.  $QM$ ) mají společné body s oběma tětivami  $MN$ ,  $PQ$ , každá je tedy vnitřním uzlem jedné z cest délky 2 z  $MN$  do  $PQ$ . Pro tětivy spojující bod oblouku  $MP$  (resp.  $PN$ ) s výjimkou  $P$  s bodem vnitřku oblouku  $QM$  (resp.  $NQ$ ) provedeme stejnou úvahu jako v předešlém případě pro tětivy  $WZ$ . Konečně ke každému bodu  $X$  z  $\mathcal{A}$ , který leží uvnitř oblouku  $MP$ , existuje cesta složená z tětiv  $MN$ ,  $MX$ ,  $PX$ ,  $PQ$  a ke každému bodu  $Y$  z  $\mathcal{A}$ , který leží uvnitř oblouku  $PN$ , existuje cesta složená z tětiv  $MN$ ,  $NY$ ,  $PY$ ,  $PQ$ . Tím jsme dokázali, že existuje takový systém cest z  $MN$  do  $PQ$ , že žádné dvě cesty tohoto systému nemají společný uzel kromě  $MN$  a  $PQ$  a každá tětiva z  $\mathcal{T}(n)$ , která má společný bod s  $MN$  (kromě  $PQ$ ,  $MM$ ,  $NN$ ) je obsažena právě v jedné z těchto cest a v systému je cesta délky 1. Těchto cest je tedy  $[h(u) + 1][n - h(u) + 1] - 4$  (stupeň uzlu  $u$  zmenšený o dvě). Snadno bychom zjistili, že odstraněním všech tětiv, které mají společný bod s  $MN$  kromě  $PQ$ ,  $MM$ ,  $NN$ , bychom získali graf, v němž uzly odpovídající tětivám  $MN$  a  $PQ$  jsou koncovými uzly mostu.

Zbývá ještě případ, že  $MN$  a  $PQ$  mají společný koncový bod  $N \equiv P$ . Zde je uzlový stupeň souvislosti mezi  $MN$  a  $PQ$  roven  $[h(u) + 1][n - h(u) + 1] - 2 - h(u)$ , neboť zmíněný systém cest obsahuje všechny tětivy z  $\mathcal{T}(n)$ , které mají společný bod s  $MN$  kromě  $MM$  a tětiv spojujících  $M$  s vnitřními body oblouku  $MN$  (předpokládáme, že  $Q$  leží mimo oblouk  $MN$ ).

**Věta 5.** *Hranový stupeň souvislosti mezi uzly  $u$  a  $v$  v  $G_k(n)$  při  $h(u) \leq h(v)$  je roven stupni uzlu  $u$ .*

**Důkaz.** Budeme větu dokazovat pouze pro případ, že tětivy odpovídající uzlům  $u$  a  $v$  nemají společný bod; pro ostatní případy je důkaz analogický. Sestrojujeme systém cest z  $u$  do  $v$  jako v důkaze předešlé věty, a to tak, aby zmíněné body  $Y$  ležely uvnitř oblouku  $PQ$ . Dále sestrojíme pro každý bod  $L$  z  $\mathcal{A}$  ležící uvnitř oblouku  $MN$  cestu složenou z tětiv  $MN$ ,  $LM$ ,  $LL^*$ ,  $L^*P$ ,  $PQ$ , kde  $L^*$  je bod uvnitř oblouku  $PQ$  a každému bodu  $L$  je přiřazen bod  $L^*$  vzájemně jednoznačně. Dále sestrojíme pro každý takovýto bod  $L$  cestu složenou z tětiv  $MN$ ,  $LN$ ,  $LL^*$ ,  $L^*Q$ ,  $PQ$  a konečně cesty složené z tětiv  $MN$ ,  $MM$ ,  $MP$ ,  $PP$ ,  $PQ$  a  $MN$ ,  $NN$ ,  $NQ$ ,  $QQ$ ,  $PQ$ . Lze dokázat, že takto doplněný systém cest má tu vlastnost, že žádné dvě z cest tohoto systému nemají společnou hranu a že každá hrana incidentní s uzlem  $u$  je obsažena právě v jedné z těchto cest; počet těchto cest je tedy roven stupni uzlu  $u$ . Podle věty dokázané A. Kotzigem v [2] je tedy hranový stupeň souvislosti mezi  $u$  a  $v$  nejméně roven stupni uzlu  $u$ ; protože však hranový stupeň souvislosti mezi  $u$  a  $v$  nemůže překročit stupeň uzlu  $u$ , je mu roven.

**Důsledek.** *Uzlový i hranový stupeň souvislosti grafu  $G_k(n)$  je roven  $n - 1$ . Z předešlých úvah vyplývá ještě jedna vlastnost.*

**Věta 6.** *Je-li  $u$  uzel grafu  $G_k(n)$  a  $h(u) > 0$  a odstraníme-li všechny uzly spojené hranou s  $u$ , vznikne graf o třech komponentách; jednou z komponent je izolovaný uzel  $u$ , každá z dalších komponent je tvořena tětívami ležícími uvnitř jedné z kruhových úsečí vyřazených tětívou odpovídající uzlu  $u$ .*

**Věta 7.** *V grafu  $G_k(n)$  existuje Hamiltonova kružnice.*

Důkaz provedeme sestavením této kružnice. Sestrojíme nejprve cestu  $C_1$  po řadě z uzlů odpovídajících tětívám  $A_1A_1, A_1A_3, A_1A_4, \dots, A_1A_{n-1}, A_1A_2, A_2A_2$ . Dále pro každé  $i = 2, \dots, n - 2$  sestrojíme cestu  $C_i$  po řadě z uzlů odpovídajících tětívám  $A_iA_i, A_iA_{i+2}, \dots, A_iA_n, A_iA_{i+1}, A_{i+1}A_{i+1}$ . Pak sestrojíme ještě cestu  $C_{n-1}$  po řadě z uzlů odpovídajících tětívám  $A_{n-1}A_{n-1}, A_{n-1}A_n, A_nA_n$  a cestu  $C_n$  po řadě z uzlů odpovídajících tětívám  $A_nA_n, A_nA_1, A_1A_1$ . Snadno bychom zjistili, že  $H = \bigcup_{i=1}^n C_i$  je Hamiltonova kružnice.

**Věta 8.** *Grupa automorfismů grafu  $G_k(n)$  je izomorfní s grupou symetrií pravidelného  $n$ -úhelníka.*

Důkaz. Body  $A_1, \dots, A_n$  tvoří pravidelný  $n$ -úhelník. Každému shodnému zobrazení, kterým tento  $n$ -úhelník přechází v sebe, odpovídá zřejmě právě jeden automorfismus grafu  $G_k(n)$ . Poněvadž hodnota a stupeň uzlu v  $G_k(n)$  jsou si přiřazeny vzájemně jednoznačně, musí každý automorfismus grafu  $G_k(n)$  zachovávat hodnotu všech uzlů. Speciálně tedy obrazem uzlu hodnoty 0, to jest uzlu odpovídajícího tětívě tvořené jedním bodem, je opět uzel hodnoty 0. K takovýmto dvěma tětívám  $u, v$  existuje zřejmě právě jedna tětíva  $w$ , která má s oběma společné body, to jest tětíva spojující tyto body. V grafu  $G_k(n)$  se to projeví tím, že existuje právě jedna cesta délky 2 mezi uzly odpovídajícími těmto tětívám. Mezi délkami tětív a hodnotami uzlů jim odpovídajících existuje zřejmě též vzájemně jednoznačné přiřazení a tedy hodnota vnitřního uzlu  $w$  zmíněné cesty určuje jednoznačně vzdálenost bodů tvořících tětívu  $u, v$ . Protože délky cest a hodnoty uzlů se v automorfismu zachovávají, budou obrazy uzlů  $u$  a  $v$  představovat opět tětívy vytvořené jedním bodem a vzdálenost bodů tvořících tyto tětívy bude též jako vzdálenost bodů tvořících tětívu  $u$  a  $v$ . Automorfismu grafu  $G_k(n)$  odpovídá tedy transformace roviny, kterou přechází množina bodů  $\mathcal{A}$  v sebe, přičemž vzdálenosti každých dvou bodů této množiny se zachovávají. Takováto transformace je zřejmě shodné zobrazení, kterým přechází  $n$ -úhelník  $A_1A_2 \dots A_n$  v sebe.

Poznámka. Graf  $G_k(n)$  lze definovat i zcela bez užití geometrických pojmů. Budiž  $\mathcal{T}(n)$  množina neuspořádaných dvojic zbytkových tříd modulo  $n$ .

Graf  $G_k(n)$  má množinu uzlů  $\mathcal{T}(n)$ , přičemž dva uzly jsou spojeny hranou právě tehdy, jestliže odpovídající dvojice buď mají společný prvek, nebo se navzájem oddělují. Analogicky by se definoval i graf  $G_k$ .

#### LITERATURA

- [1] Berge C., *Théorie des graphes et ses applications*, Paris 1958.  
[2] Kotzig A., *Súvislosť a pravidelná súvislosť konečných grafov*, Bratislava 1956.

Došlo 3. 10. 1964.

*Katedra matematiky  
Vysoké školy strojná a textilní,  
Liberec*

#### THE GRAPH OF THE SYSTEM OF CHORDS OF A GIVEN CIRCLE

Bohdan Zelinka

#### Summary

Let  $n$  points on a circle be given and let us consider the system of chords joining these points. The graph  $G_k(n)$  is the graph whose vertices are chords of that system, two vertices being joined by an edge if and only if the corresponding chords have a common point. In this article the numbers of internal and external stability, the chromatic number and the connectivity degree of the graph  $G_k(n)$  are found. The existence of a Hamilton circuit and a theorem on the group of automorphisms of  $G_k(n)$  are proved. Investigation of such a graph was proposed by A. Kotzig.