

Matematicko-fyzikálny časopis

Václav Havel

Poznámka o jednoznačnosti direktných rozkladů prvků v modulárních svazech
konečné délky

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 5 (1955), No. 2, 90--93

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126506>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1955

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

POZNÁMKA O JEDNOZNAČNOSTI DIREKTNÍCH ROZKLADŮ PRVKŮ V MODULÁRNÍCH SVAZECH KONEČNÉ DÉLKY

VÁCLAV HAVEL, Praha

§ 1. Předběžné úvahy

1.1. Nechť S je modulární svaz konečné délky, $I(O)$ jeho největší (nejmenší) prvek. Prvek I nechť je rozložitelný (ve smyslu definice 1.3).

1.2. Zavedeme symbol (srov. 1, str. 94)¹

$$a = \times_{i=1}^n a_i = a_1 \times \dots \times a_n$$

(a nazveme jej rozkladem prvku a ve složky a_i), právě když platí tyto tři podmínky:

$$O \neq a_i \in S \text{ pro každé } i = 1, \dots, n > 1.$$

$$a = \vee_{i=1}^n a_i,$$

$$(a_1 \vee \dots \vee a_{i-1}) \wedge a_i = O \text{ pro každé } i = 2, \dots, n.$$

Lze ukázat (3, theorem 5), že poslední podmínku lze nahradit symetrickou podmínkou

$$\begin{aligned} a_1 \wedge (a_2 \vee \dots \vee a_n) &= a_i \wedge (a_1 \vee \dots \vee a_{i-1} \vee a_{i+1} \vee \dots \vee a_n) = \\ &= a_n \wedge (a_1 \vee \dots \vee a_{n-1}) = O, \end{aligned}$$

kde $i = 2, \dots, n-1$.

1.3. Prvek $a \in S$ prohlásíme za (ne)rozložitelný, právě když (ne)existuje rozklad tvaru $a = a_1 \times a_2$ ($a_1, a_2 \in S$).

1.4. Prvek $a \in S$ nazveme doplňtelným, právě když existuje prvek \bar{a} (doplňěk prvku a) tak, že platí $a \times \bar{a} = I$.

1.5. Oreova věta o náhradě (1, str. 94):

Platí-li v S rovnice $a = \times_{i=1}^m a_i = \times_{j=1}^n b_j$, kde a_i, b_j jsou nerozložitelné prvky, pak jest $m = n$ a při vhodném označení platí:

$$\begin{aligned} a &= a_1 \times b_2 \dots \times b_n = b_1 \times \dots \times b_{i-1} \times a_i \times b_{i+1} \times \dots \times b_n = \\ &= b_1 \times \dots \times b_{n-1} \times a_i \quad (i = 2, \dots, n-1). \end{aligned}$$

¹ Odkazy na literaturu, uvedené na konci článku.

Budeme vyšetřovat tuto podmínku:

(1) V S existuje (až na pořadí složek) právě jeden rozklad prvku I v nerozložitelné složky.

§ 2. Poučky, týkající se podmínky (1)

Odvodíme několik jednoduchých podmínek pro to, aby v S platilo (1).

Poučka 2.1. V S platí (1), právě když je pro každý doplňitelný prvek $a \in S$ splněna jedna z (navzájem ekvivalentních) implikací

$$a \vee b = I, \quad b \neq \bar{a} \Rightarrow a \wedge b > 0, \quad (2.1)$$

$$a \wedge b = 0, \quad b \neq \bar{a} \Rightarrow a \vee b < I. \quad (2.2)$$

Důkaz: Neplatí-li (2.1), pak jest $a \times b = I$ a neplatí ani (1). Obdobně je tomu tak, když neplatí (2.2).

Neplatí-li (1), pak podle 1.5 existuje nerozložitelný prvek $a \in S$, který má v S dva různé doplňky \bar{a}, b . Pak ale neplatí ani implikace (2.1) ani implikace (2.2).

Poučka je tím dokázána.

Poučka 2.2. V S platí (1), právě když jsou pro jakékoliv dva rozklady

$$I = \prod_{i=1}^m a_i = \prod_{j=1}^n b_j \quad (3)$$

splněny rovnice

$$a_i = \bigvee_{j=1}^n (a_i \wedge b_j) \text{ pro } i = 1, \dots, m. \quad (4)$$

(srov. 3. teorém 2).

Důkaz: Nechť platí (1). Pak oba rozklady mají společné zjemnění I

$\times_{k=1}^N c_k$, kde c_k jsou nerozložitelné prvky a $N \geq \max(m, n)$.²

Prvky c_k generují v S Booleovu algebru délky N (3, důsledek z teorému 2). Protože prvky a_i, b_j patří do této algebry, plynou z distributivity rovnice (4).

Nechť pro kterékoliv rozklady (3) platí (4). Buď a jakýkoliv doplňitelný prvek z S . Buďte dále a_1, a_2 jeho doplňky. Za rovnice (3) vezmeme nyní rovnice $I = a_1 \times a = a_2 \times a$. Podle rovnice (4) platí v našem případě $a_1 = a_1 \wedge a_2 = a_2$. Tedy prvek a má právě jeden doplněk. Z toho plyne podle věty 1.5 platnost podmínky (1).³

² Za prvé: Každý rozložitelný prvek dá se v S rozložit v samé nerozložitelné složky. Za druhé: Z rovnice $a = a_1 \times a_2, a_1 = a_1' \times a_2'$ plyne $a = a_1' \times a_2' \times a_2$.


³ Neplatí-li podmínka (1), pak existují navzájem různé nerozložitelné prvky $v_1, \dots, v_N, w_1, \dots, w_N$ ($k < N$) tak, že platí $I = v_1 \times \dots \times v_N = v_1 \times \dots \times v_k \times w_{k+1} \times \dots \times w_N$. Podle věty 1.5 provedeme (při vhodném označení) postupně náhrady $v_1 \times \dots \times v_{k+1} \times w_{k+2} \times \dots \times w_N = v_1 \times \dots \times v_{k+2} \times w_{k+3} \times \dots \times w_N = \dots = v_1 \times \dots \times v_{N-1} \times w_N$. Prvek $v_1 \vee \dots \vee v_{N-1}$ má různé doplňky v_N, w_N , což je hledaný spor. Tedy platí podmínka (1).

Poučka 2.3. V S platí (1), právě když žádný jeho podsvaz není isomorfní s některým ze svazů, jejichž diagramy jsou na obr. 1—4, kde a, b jsou nerozložitelné prvky.


Důkaz: Existuje-li některý z podsvazů, daných zmíněnými diagramy, pak zřejmě platí:

$$a \times \bar{a} = b \times \bar{a} = I, \quad a \neq b. \quad (5)$$

Tedy podmínka (1) není splněna.




Obr. 1.




Obr. 2.

Nechť v S existují dva různé rozklady prvku I . Podle věty 1.5 existují pak nerozložitelné prvky a, b tak, že platí (5).⁴ Označme P podsvaz. generovaný v S prvky a, b, \bar{a} . Ukážeme, že P je dáno některým z diagramů na obr. 1—4.

Platí-li $a \times b = I$, pak z této rovnice a z rovnic (5) plyne snadno, že P má diagram na obr. 4.



Obr. 3.



Obr. 4.

Nechť tedy neplatí $a \times b = I$. Pak jsou možné tyto tři případy:

1. $a \wedge b = 0, a \vee b < I,$
2. $a \cdot b > 0, a \vee b = I,$
3. $a \wedge b > 0, a \vee b < I.$

⁴ Argumentace je obdobná jako v předešlé poznámce.

ad 1. Označme $a \cdot b = c$, $\bar{a} \cdot c = d$. Podle (5) plyne $a \cdot d = b \cdot d = 0$, $\bar{a} \cdot c = I$. Podle modularity a podle (5) plyne $a \cdot d = b \cdot d = c$. Poněvadž prvky a, b, \bar{a}, c, d jsou navzájem různé, má P diagram na obr.1.

ad 2. Případ je duální k případu 1).

ad 3. Označme $a \cdot b = c$, $a \cdot b = d$, $\bar{a} \cdot d = w$, $\bar{a} \cdot c = v$, $d \cdot v = u$. Z těchto rovnic, z rovnic (5) a z modularity odvodíme:

$$a \cdot v = a \cdot (\bar{a} \cdot c) = (a \cdot \bar{a}) \cdot c = c, \quad a \cdot v = a \cdot \bar{a} \cdot c = 0,$$

$$a \cdot w = I, \quad a \cdot w = a \cdot (\bar{a} \cdot d) = (a \cdot \bar{a}) \cdot d = d,$$

$$u = a \cdot d \cdot v = a \cdot (\bar{a} \cdot c) = (a \cdot \bar{a}) \cdot c = c, \quad a \cdot u = a \cdot (d \cdot v) = (a \cdot v) \cdot d = d;$$

$$b \cdot v = b \cdot (\bar{a} \cdot c) = (\bar{a} \cdot b) \cdot c = c, \quad b \cdot v = 0, \quad b \cdot w = I, \quad b \cdot w = b \cdot (\bar{a} \cdot d) = (\bar{a} \cdot b) \cdot d = d,$$

$$b \cdot u = b \cdot d \cdot v = c \cdot d = c, \quad b \cdot u = b \cdot (d \cdot v) = (b \cdot v) \cdot d = d;$$

$$\bar{a} \cdot u = \bar{a} \cdot d \cdot v = \bar{a} \cdot d = w, \quad \bar{a} \cdot u = \bar{a} \cdot (d \cdot v) = (\bar{a} \cdot d) \cdot v = v,$$

$$\bar{a} \cdot d = 0, \quad \bar{a} \cdot c = I;$$

$$c \cdot w = I, \quad c \cdot w = c \cdot (\bar{a} \cdot d) = (\bar{a} \cdot c) \cdot d = d \cdot v = u;$$

$$d \cdot v = 0.$$

Snadno dokážeme (nepřímo), že prvky $a, b, \bar{a}, c, d, u, v, w$ jsou navzájem různé. Z toho plyne, že P má diagram, zakreslený na obr. 3. Poučka je dokázána.

V distributivním svazu S je ovšem podmínka (1) splněna. Z pouček 2,2 a 2,3 vidíme, že svaz S s podmínkou (1) je poněkud obecnější než distributivní svaz S , že však oba tyto typy jsou velmi blízké.

Došlo 21. IX. 1954.

LITERATURA

1. G. Birkhoff, Lattice theory, rev. ed. 1948. 2. O. Ore, On the foundation of abstract algebra II, Ann. of Math. 37 (1935), str. 406-437. 3. V. Havel, Rozklady prvků ve svazech splňujících podmínku pro klesající řetězce, Časopis pro přest. mat. 80/1953) str. 1-16.

ЗАМЕТКА К ОДНОЗНАЧНОСТИ ПРЯМЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ В ДЕДЕКИНДОВЫХ СТРУКТУРАХ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ

ВАЦЛАВ ГАВЭЛ

Выводы

Пусть S -дедекиндова структура конечной длины, наибольший элемент I которой прямо разложим. В статье исследовано несколько необходимых и достаточных условий для того, чтобы существовало одно и только одно (с точностью до последовательности компонент) прямое разложение элемента I в неразложимые компоненты. Одно такое условие заключается в том, чтобы для каждого дополнительного элемента существовало в S одно и только одно дополнение. Содержанием теорем 2,1 и 2,2 являются две вариации выше приведенного условия. В теореме 2,3 исследуется другое условие: требование, чтобы ни одна подструктура из S не была изоморфной с какой-нибудь из структур, диаграммы которых изображены на фиг. 1-4.