

# Matematicko-fyzikálny časopis

---

Vladimír Bruthans

O grupě automorfních kolineací prostorové kvartiky harmonické

*Matematicko-fyzikálny časopis*, Vol. 10 (1960), No. 4, 222--237

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126631>

## Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1960

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

## O GRUPĚ AUTOMORFNÍCH KOLINEACÍ PROSTOROVÉ KVARTIKY HARMONICKÉ

VLADIMÍR BRUTHANS, Liberec

V první části této práce jsou studovány kolineace, kterými se reprodukuje prostorová kvartika prvního druhu bez singulárního bodu v případě, kdy jde o tzv. kvartiku harmonickou. Přitom se vychází ze známého parametrického vyjádření kvartiky pomocí Weierstrassových  $\sigma$ -funkcí.

Ve druhé části je užito vlastností uvedených kolineací k získání některých vlastností harmonické kvartiky, které — jak se ukázalo — jsou pro tuto kvartiku charakteristické.

### Úvod

Kvartikou rozumíme v tomto článku prostorovou kvartiku prvního druhu bez singulárního bodu. Uvedeme nejdříve některé známé pojmy a vlastnosti této křivky, jichž v dalším upotřebíme.<sup>1</sup>

Kvartika je basí svazku kvadrik, v němž jsou čtyři kvadratické kužele. Vrcholy těchto kuželů jsou vrcholy tzv. polárního čtyřstěnu kvartiky, který je společným polárním čtyřstěnem všech kvadrik svazku.

Body, v nichž rovina může mít s kvartikou čtyřnásobný průsečík, se nazývají body superoskulační. Je jich na kvartice 16 a leží po čtyřech ve stěnách polárního čtyřstěnu kvartiky. Body, v nichž regulární kvadrika může mít s kvartikou osminásobný průsečík, se nazývají body osmitečné; těchto bodů je na kvartice 48.

V projektivních souřadnicích lze kvartiku vyjádřit parametricky rovnicemi<sup>2</sup>

$$(1) \quad x_1 = \sigma_1(u), x_2 = \sigma_2(u), x_3 = \sigma_3(u), x_4 = \sigma(u),$$

kde  $\sigma$ ,  $\sigma_k$  ( $k = 1, 2, 3$ ) jsou známé Weierstrassovy funkce a parametr  $u$  probíhá v rovině komplexních čísel rovnoběžník period, jehož vrcholy budtež body  $0, 4\omega, 4\omega + 4\omega', 4\omega'$ .<sup>3</sup>

Z kvadratických vztahů mezi  $\sigma$ -funkcemi<sup>4</sup> plynou rovnice

$$(2) \quad \begin{aligned} x_2^2 - x_3^2 + (e_2 - e_3) x_4^2 &= 0, \\ x_3^2 - x_1^2 + (e_3 - e_1) x_4^2 &= 0, \end{aligned}$$

<sup>1</sup> Tyto pojmy a vlastnosti jsou podrobně vyloženy v knize akademika B. Bydžovského [1], kap. XIX a v práci [2] téhož autora.

<sup>2</sup> Viz Killing, *Der Flächenbüschel* 2.0. Berlin 1872, 11.

$$x_1^2 - x_3^2 + (e_1 - e_2) x_4^2 = 0,$$

$$(e_2 - e_3) x_1^2 + (e_3 - e_1) x_2^2 + (e_1 - e_2) x_3^2 = 0;$$

jsou to rovnice kuželů, obsahujících kvartiku. Označíme tyto kužele  $K_1, K_2, K_3, K_4$  v pořadí určeném pořadím rovnic (2).

Parametry superskulačních bodů jsou charakterisovány kongruencí<sup>5</sup>

$$4u \equiv 0 \pmod{4\omega, 4\omega'},$$

parametry osmítečných bodů vztahy

$$8u \equiv 0, \quad 4u \not\equiv 0 \pmod{4\omega, 4\omega'}.$$

Superskulační bod odpovídající hodnotě parametru  $u = m\omega + n\omega'$  označujeme  $W_{mn}$  a osmítečný bod odpovídající hodnotě parametru  $u = \frac{1}{2}(h\omega + k\omega')$  označujeme  $V_{hk}$ .

Kvartika (1) se reprodukuje 32 kolineacemi, které jsou dány vztahem<sup>6</sup>

$$u' = \varepsilon u + m\omega + n\omega' \pmod{4\omega, 4\omega'},$$

kde  $\varepsilon = \pm 1$  a  $m, n = 0, 1, 2, 3$ . Tyto kolineace nazýváme kolineacemi základními, a to pro  $\varepsilon = 1$  kladnými a pro  $\varepsilon = -1$  zápornými. Kladné základní kolineace označujeme  $\kappa(m, n)$ , záporné  $\kappa[m, n]$ .

Klasifikace základních kolineací je známa.<sup>7</sup> Kladné kolineace pro  $m$  i  $n$  sudé jsou osové involuce, jejichž osy jsou vždy dvě protilehlé hrany polárního čtyřstěnu kvartiky. Zbývající kladné kolineace jsou cyklické 4. stupně a přísluší po čtyřech vždy k jedné (kladné) involuci, která vznikne jejich opakováním. Záporné kolineace pro  $m$  i  $n$  sudé jsou středové involuce, jejichž středy jsou vrcholy polárního čtyřstěnu kvartiky a roviny samostatných bodů jsou stěny tohoto čtyřstěnu. Zbývající záporné kolineace jsou osové involuce, jejichž osy protínají vždy dvě protilehlé hrany polárního čtyřstěnu kvartiky a jsou přímkami tzv. Vossových kvadrik.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>  $2\omega, 2\omega'$  jsou základní periody příslušné Weierstrassovy funkce  $\wp(u)$ , která s uvedenými  $\sigma$ -funkcemi souvisí známými vztahy  $\left[ \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} \right]^2 = \wp(u) - e_i, \quad i = 1, 2, 3$  (viz [3], str. 365).

<sup>6</sup> Viz [3], str. 387.

<sup>7</sup> O užití eliptických funkcí ke studiu prostorové kvartiky viz např. [4], str. 47 a násled.

<sup>8</sup> Viz [4], str. 81.

<sup>7</sup> Viz [2], str. 4.

<sup>8</sup> Těchto kvadrik je šest a jsou rozděleny na tři dvojice tak, že osy, které jsou přímkami téže dvojice, protínají tytéž dvě protilehlé hrany polárního čtyřstěnu kvartiky. Viz [4], str. 74.

Základní kolineace tvoří grupu  $G_{32}$ . Podrobné studium této grupy a bodových skupin na kvartice odpovídajících jejím podgrupám provedl akademik B. Bydžovský v citované práci [2]. Jeho výsledky platí pro každou prostoro-ovou kvartiku prvního druhu bez singulárního bodu. Ve speciálním případě tzv. kvartiky harmonické lze však grupu  $G_{32}$  rozšířit o další automorfnní kolineace na grupu  $G_{64}$ . Vyšetříme vlastnosti těchto automorfnních kolineací harmonické kvartiky a jejich užitím odvodíme některé charakteristické vlastnosti této křivky.

### Harmonické kolineace

Jsou-li  $Q_1 = 0$ ,  $Q_2 = 0$  rovnice dvou kvadrik svazku, má libovolná kvadrika tohoto svazku rovnici tvaru  $\lambda Q_1 + \mu Q_2 = 0$ , v níž  $(\lambda, \mu)$  můžeme pokládat za projektivní souřadnice příslušné kvadriky. Tím je ve svazku zavedena jedno- rozměrná projektivní soustava souřadnic a lze proto mluvit o dvojpoměru čtyř kvadrik svazku. Ujijeme tohoto pojmu, který zřejmě nezávisí na volbě základních kvadrik svazku, k definici harmonické kvartiky.

Harmonickou kvartikou nazýváme kvartiku, která je basí svazku kvadrik, jehož čtyři kužele tvoří harmonickou čtveřici.

K tomu, aby rovnice (1) vyjadřovaly kvartiku harmonickou, stačí položit  $\omega' = i\omega$ . Potom totiž platí<sup>9</sup>

$$(4) \quad e_1 + e_3 = 0 \quad \text{a} \quad e_2 = 0,$$

takže dvojpoměr čtyř kuželů v pořadí  $K_1, K_3, K_2, K_4$  je roven  $-1$ . Kužele  $K_2, K_4$  jsou tedy v tomto případě harmonicky sdruženy vzhledem ke kuželům  $K_1, K_3$  a obráceně.

Je-li kvartika (1) harmonická, reprodukuje se — kromě 32 kolineacemi základními — také kolineací

$$(5) \quad u' \equiv iu \pmod{4\omega, 4\omega'}.$$

Z rovnic (4) totiž plyne

$$\begin{aligned} \left[ \frac{\sigma_1(iu)}{\sigma(iu)} \right]^2 &= - \left[ \frac{\sigma_3(u)}{\sigma(u)} \right]^2, & \left[ \frac{\sigma_2(iu)}{\sigma(iu)} \right]^2 &= - \left[ \frac{\sigma_2(u)}{\sigma(u)} \right]^2, \\ \left[ \frac{\sigma_3(iu)}{\sigma(iu)} \right]^2 &= - \left[ \frac{\sigma_1(u)}{\sigma(u)} \right]^2, \end{aligned}$$

takže vztah  $\sigma_2^2(u) - \sigma_3^2(u) + (e_2 - e_3) \sigma^2(u) = 0$  přejde ve vztah  $\sigma_2^2(u) - \sigma_1^2(u) + (e_2 - e_1) \sigma^2(u) = 0$  a obráceně. To znamená, že ve vyšetřované kolineaci se kužele  $K_1$  a  $K_3$  navzájem vymění a kvartika, v níž se protínají, je samodružná.

<sup>9</sup> Užíváme vztahů  $\wp(iu) = -\wp(u)$  a  $e_1 + e_2 + e_3 = 0$ .

Složení kolineace (5) se všemi kolineacemi (3) dostaneme 32 kolineací tvaru

$$(6) \quad u' \equiv \varepsilon iu + m\omega + n\omega' \pmod{4\omega, 4\omega'},$$

kde  $\varepsilon = \pm 1$  a  $m, n = 0, 1, 2, 3$ . Tyto kolineace nazýváme kolineacemi harmonickými, a to buď kladnými (je-li  $\varepsilon = 1$ ) nebo zápornými (je-li  $\varepsilon = -1$ ). Kladné harmonické kolineace značíme  $\beta(m, n)$ , záporné  $\beta[m, n]$ . Snadno dokážeme větu:

**Věta 1.** *Všechny harmonické kolineace jsou cyklické čtvrtého stupně.*

Důkaz. Ze vztahu (6) je zřejmé, že opakováním libovolné harmonické kolineace dostaneme vždy některou ze základních kolineací záporných, které — jak víme — jsou všechny involutorní. Opakujeme-li tedy libovolnou harmonickou kolineaci čtyřikrát, dostaneme identitu. Tím je věta dokázána.

Každá harmonická kolineace vytváří tedy cyklickou grupu čtvrtého řádu, v níž je spolu s kolineací  $\beta(m, n)$  obsažena též kolineace  $\beta[-n, m]$ . Tyto dvě harmonické kolineace, z nichž jedna je kladná a druhá záporná, jsou navzájem inveršní. Jednu dostaneme, když třikrát opakujeme druhou.

Zkoumejme nyní na harmonické kvartice čtveřice bodů, které tvoří cykly v jednotlivých harmonických kolineacích. Cyklus tvořený čtyřmi body ležícími v téže rovině nazveme stručně cyklem rovinným. Platí věta:

**Věta 2.** *Mezi harmonickými kolineacemi je 16 kolineací, které na harmonické kvartice vytvářejí cykly rovinné; zbývajících 16 harmonických kolineací vytváří na harmonické kvartice cykly, které nejsou rovinné (s výjimkou konečného počtu cyklů, které nejsou tvořeny čtyřmi vzájemně různými body).*

Důkaz. Vzhledem k tomu, že záporné harmonické kolineace vytvářejí tytéž cykly jako k nim inveršní kladné harmonické kolineace, stačí, omezíme-li se v důkazu na harmonické kolineace kladné. Opakujeme-li kolineaci  $\beta(m, n)$ , dostaneme involuci  $\alpha[m - n, m + n]$ , která je středová, když  $m \equiv n \pmod{2}$ , kdežto pro  $m \not\equiv n \pmod{2}$  je osová. Čtyři body cyklu leží tedy v prvním případě na dvou různoběžkách, ve druhém případě na dvou mimoběžkách, které jsou navzájem různé, neboť přímka protíná kvartiku nejvýše ve dvou bodech. Cyklů tvořených méně než čtyřmi body je na kvartice konečný počet, neboť každý takový cyklus obsahuje aspoň jeden bod samodružný v příslušné involuci a těchto bodů je na kvartice konečný počet. Tím je věta dokázána.

Harmonické kolineace, které na harmonické kvartice vytvářejí cykly rovinné, nazýváme harmonickými kolineacemi prvního druhu, zbývajících pak harmonickými kolineacemi druhého druhu.

Určíme na harmonické kvartice body, které jsou v jednotlivých harmonických kolineacích samodružné, a dvojice bodů, které v těchto kolineacích tvoří involutorní páry. Pro argumenty bodů, které jsou samodružné v kolineaci  $\beta(m, n)$ , platí kongruence

$$u \equiv iu + m\omega + n\omega' \pmod{4\omega, 4\omega'},$$

jejímž řešením dostáváme

$$u_1 = \frac{m-n}{2} \omega + \frac{m+n}{2} \omega' \quad \text{a} \quad u_2 = u_1 + 2\omega - 2\omega'.$$

Těmito hodnotám odpovídají dva body superskulační nebo osmítečné podle toho, jde-li o harmonickou kolíneaci prvního druhu nebo druhého druhu. Tyto dva body jsou ovšem samodružné i v kolíneaci  $\alpha[m-n, m+n]$ , kterou dostaneme, opakujeme-li kolíneaci  $\beta(m, n)$ : zbývající dva samodružné body této základní kolíneace, tj. body odpovídající argumentům

$$u_3 = u_1 + 2\omega \quad \text{a} \quad u_4 = u_1 + 2\omega',$$

tvorí v kolíneaci  $\beta(m, n)$  involutorní pár.

V každé harmonické kolíneaci existují též samodružné body ležící mimo kvartiku. Vyšetříme nejdříve harmonickou kolíneaci prvního druhu. Spojnice samodružných superskulačních bodů je samodružná přímka. Protneme-li ji rovinou, která obsahuje některý cyklus a je proto samodružná, dostaneme na ní další samodružný bod. Odtud plyne, že všechny body této přímky jsou samodružné. Samodružná je dále průsečnice superskulačních rovin v samodružných superskulačních bodech, která je s přímkou samodružných bodů mimoběžná a je proto osou svazku samodružných rovin. Samodružné body ležící na této přímce jsou její průsečíky se samodružnými rovinami svazku, jehož osou je přímka samodružných bodů. Tyto roviny protínají kvartiku buď jen v samodružných bodech nebo ještě ve dvou bodech, které tvoří involutorní pár. Jsou tedy samodružnými rovinami tohoto svazku dvojnásob tečná rovina křivky dotýkající se jí v obou samodružných bodech a rovina polárního čtyřstěnu, v níž tyto samodružné body leží. Odtud plyne, že kromě přímky samodružných bodů jsou v harmonické kolíneaci prvního druhu ještě dva samodružné body, ležící na ose svazku samodružných rovin. Jiné samodružné body ani samodružné roviny v této kolíneaci nejsou.

Pro argumenty osmítečných bodů, samodružných v harmonické kolíneaci druhého druhu, platí

$$3u_1 + u_2 = 0, \quad u_1 + 3u_2 = 0 \pmod{4\omega, 4\omega'}.$$

To znamená, že oskulační roviny v samodružných osmítečných bodech se protínají v přímce, která je spojnicí těchto dvou bodů. Tyto oskulační roviny, které samy jsou ovšem samodružné, protínají přímku obsahující involutorní pár osmítečných bodů v dalších dvou samodružných bodech této kolíneace. Protože v kolíneaci druhého druhu je jen konečný počet samodružných rovin a tedy i konečný počet samodružných bodů, nejsou další samodružné body kromě čtyř uvedených.

Čtyři samodružné body harmonické kolíneace druhého druhu jsou vrcholy čtyřstěnu, jehož dvě stěny jsou oskulační roviny v samodružných osmítečných

bodech, zbývající dvě stěny jsou roviny obsahující involutorní pár osmítečných bodů a po jednom ze samodružných osmítečných bodů, ve kterých se kvartiky dotýkají. Samodružnými body ležícími mimo kvartiku procházejí tedy tečny v samodružných bodech ležících na kvartice.

Označme nyní vrcholy souřadnicového čtyřstěnu  $O_1, O_2, O_3, O_4$ ,<sup>10</sup> stěny tohoto čtyřstěnu  $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$  ( $\omega_i$  leží proti  $O_i$ ) a jeho hrany  $o_{ij}$  (tj. spojnice vrcholů  $O_i, O_j$ ).

V kolineaci  $\beta(0, 0)$  jsou samodružné superoskulační body  $W_{00}$  a  $W_{22}$ . Jejich spojnice, jež je přímkou samodružných bodů, prochází bodem  $O_2$ . Tímto bodem prochází také spojnice bodů  $W_{20}, W_{02}$ , které ve vyšetřované kolineaci tvoří involutorní pár. Kolineace  $\beta(0, 0)$  indukuje tedy na přímce  $W_{20}W_{02}$  involuci, jejímž jedním samodružným bodem je bod  $O_2$ . Druhý samodružný bod této involuce, který je ovšem samodružný i v kolineaci  $\beta(0, 0)$ , je s bodem  $O_2$  harmonicky sdružen vzhledem k dvojici bodů  $W_{20}, W_{02}$  a je to tedy bod na ose  $o_{13}$ ; označme ho  $P_{00}$ . Zbývající samodružný bod kolineace  $\beta(0, 0)$  leží mimo rovinu  $\omega_1$ . To však musí být bod  $O_4$ , neboť opakovaním vyšetřované kolineace dostaneme středovou involuci  $\alpha[0, 0]$ , v níž je tento bod jediným samodružným bodem ležícím mimo rovinu  $\omega_1$ . Osou svazku samodružných rovin je proto přímka  $O_4P_{00}$ .

Podobně se zjistí, že osou svazku rovin samodružných v kolineaci  $\beta(2, 2)$  je přímka  $O_4P_{22}$ , kde  $P_{22}$  je průsečík spojnice  $W_{00}W_{22}$  s osou  $o_{13}$ . Osy obou svazků procházejí tedy vrcholem  $O_4$ , leží v rovině  $\omega_2$  a protínají spojnice superoskulačních bodů ležících v rovině  $\omega_4$ , které procházejí bodem  $O_2$ .

Analogické výsledky platí i pro zbývající tři dvojice harmonických kolineací prvního druhu  $\beta(m, n), \beta(m + 2, n + 2)$ .

Abychom se mohli stručně vyjadřovat, budeme nazývat dva vrcholy  $O_1, O_3$  nebo  $O_2, O_4$ , příslušné harmonicky sdruženým dvojicím kuželů, navzájem sdruženými a totéž budeme říkat o stěnách k nim protilehlých. Sdruženými budeme také nazývat dva body superoskulační, které leží v téže stěně polárního čtyřstěnu a jejichž spojnice prochází vrcholem protilehlým ke stěně sdružené. V této terminologii můžeme předchozí výsledky vyjádřit větou:

**Věta 3.** *Osy svazků samodružných rovin harmonických kolineací druhého druhu procházejí po dvou vrcholy polárního čtyřstěnu kvartiky a leží v jeho stěnách. Dvě osy, které procházejí tímž vrcholem, leží ve stěně protilehlé k vrcholu sdruženému a protínají spojnice sdružených superoskulačních bodů ležící ve stěně sdružené.*

Plochy nejnižšího stupně, které obsahují čtyřbodové cykly harmonických kolineací druhého druhu, jsou kvadriky. Nalezneme kvadriky, které jsou v těchto kolineacích samodružné.

Zkoumejme kolineaci  $\beta(1, 0)$ , jejíž samodružné body jsou jednak dva osmi-

<sup>10</sup>  $O_i$  je vrchol kuželu  $K_i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ).

tečné body  $V_{11}$  a  $V_{55}$ , jednak dva body ležící mimo kvartiku, které označíme  $S_{11}$  a  $S_{55}$ . Napíšeme-li rovnice této kolineace ve tvaru

$$x_1 = \sqrt{2}x'_2, \quad x_2 = x'_3, \quad x_3 = \sqrt{2}x'_4, \quad x_4 = ix'_1,$$

zjistíme jednoduchým výpočtem, že samodružné kvadriky této kolineace tvoří dva svazky

$$(7), (8) \quad \lambda[x_1^2 \mp (1+i)x_2^2 + ix_3^2 \pm (1-i)x_4^2] + \\ + \mu[(1-i)x_1x_2 \pm \sqrt{2}x_1x_3 \mp \sqrt{2}x_2x_3 + (1+i)x_3x_4] = 0$$

a dvě lineární soustavy dvojrozměrné

$$(9), (10) \quad \lambda[x_1^2 \mp (1-i)x_2^2 - ix_3^2 \pm (1+i)x_4^2] + \\ + \mu[(1+i)x_1x_2 \mp \sqrt{2}x_1x_3 \mp \sqrt{2}x_2x_3 + (1-i)x_3x_4] - \\ + r[x_1x_3 \mp (1-i)x_2x_4] = 0.$$

Všimněme si především, že dva svazky (7) a (8) a také dvě lineární soustavy (9) a (10) si navzájem odpovídají v kolineaci

$$(11) \quad x_1 = ix'_1, \quad x_2 = x'_2, \quad x_3 = -ix'_3, \quad x_4 = -x'_4.$$

Kvartice (1) odpovídá v této kolineaci kvartika

$$(12) \quad x_1 = i\sigma_1(u), \quad x_2 = -\sigma_2(u), \quad x_3 = -i\sigma_3(u), \quad x_4 = \sigma(u).$$

Tato nová kvartika se reprodukuje týmiž 64 kolineacemi, jako kvartika (1): pro tuto vlastnost ji nazýváme kvartikou kovariantní s danou kvartikou (1). Protože se obě tyto kvartiky navzájem neprotínají,<sup>11</sup> leží na kvartice kovariantní ty samodružné body harmonických kolineací druhého druhu, které neleží na kvartice dané. Odtud plyne věta:

**Věta 4.** *K harmonické kvartice existuje právě jedna kvartika s ní kovariantní.*

Vyšetříme nyní base lineárních soustav samodružných kvadrik.<sup>12</sup> Ve svazku (7) je jednou základní kvadrikou Vossova kvadrika, kterou označme  $Q$ . Druhá základní kvadrika má s kvadrikou  $Q$  společné dvě spojnice samodružných bodů  $V_{11}V_{55}$ ,  $S_{11}S_{55}$  a tečny v bodech  $V_{11}$ ,  $V_{55}$ , které — jak víme — procházejí body  $S_{11}$ ,  $S_{55}$ . Basi svazku (7) tvoří tedy (zborcený) čtyřstran  $V_{11}V_{55}S_{55}S_{11}$  jehož vrcholy jsou samodružné body zkoumané kolineace. Všechny kvadriky tohoto svazku protínají kvartiku (1) trojnásob v samodružných bodech  $V_{11}$ ,  $V_{55}$  a jednoduše v bodech  $V_{51}$ ,  $V_{15}$ , které tvoří involutorní pár. Kovariantní

<sup>11</sup> To plyne z toho, že na kvartice neexistuje skupina 8 bodů, která by byla pro všechny její automorfnní kolineace invariantní (srovnej [2], 2. část, str. 3).

<sup>12</sup> Pro úsporu místa jsou zde vynechány zdlouhavé výpočty, které si čtenář sám snadno doplní.



kvartiku (12) protínají tyto kvadriky v samodružných bodech  $S_{11}$ ,  $S_{55}$ , dále ve dvou bodech, ležících na přímce  $V_{11}V_{55}$  a kromě toho ve čtveřicích bodů, které tvoří cykly.

Vlastnosti svazku (8) dostaneme z vlastností svazku (7) užitím kolineace (11). Jeho basi tvoří čtyřstran, jehož strany jsou opět spojnicemi samodružných bodů, avšak v pořadí  $S_{11}S_{55}V_{11}V_{55}$ . Kvadriky tohoto svazku protínají danou kvartiku v pevné čtveřici  $V_{11}$ ,  $V_{55}$ ,  $V_{51}$ ,  $V_{15}$  a kromě toho ve čtveřicích, které tvoří cykly. Vyjádříme tento výsledek větou:

**Věta 5.** *Čtyřstran tvořený těmi spojnicemi samodružných bodů harmonické kolineace druhého druhu, které nejsou tečnami kvartiky, je basi svazku kvadrik rytmajících na harmonické kvartice čtveřice bodů, které v této kolineaci tvoří cykly.*

V lineární soustavě (9) je jednou základní kvadrikou Vossova kvadrika, kterou označme  $Q'$ . Druhá základní kvadrika se skládá ze dvou rovin, které se protínají v přímce  $V_{11}V_{55}$  a obsahují body  $V_{33}$ ,  $V_{77}$  a  $V_{73}$ ,  $V_{37}$ . Třetí základní kvadrika se dotýká kvartiky v bodech  $V_{11}$ ,  $V_{55}$ ,  $V_{51}$ ,  $V_{15}$ . Průnik první a třetí základní kvadriky je čtyřstran  $V_{11}V_{51}V_{55}V_{15}$ . Roviny určené body  $V_{51}$ ,  $V_{15}$  a vždy jedním z bodů  $V_{11}$ ,  $V_{55}$  jsou společné tečné roviny všech kvadrik této soustavy. Kvadriky se protínají ve dvojicích přímek harmonicky sdružených vzhledem ke spojnicím příslušného dotykového bodu s body  $V_{51}$  a  $V_{15}$ . Všechny kvadriky této soustavy protínají kvartiku dvojnásob v samodružných bodech  $V_{11}$ ,  $V_{55}$  a kromě toho ve čtveřicích, které tvoří cykly. Tentýž cyklus vytínají na kvartice všechny kvadriky svazku, jehož basi je dvojice kuželoseček protínajících se v bodech  $V_{11}$  a  $V_{55}$ .

Kvadriky soustavy (10) mají společné body  $S_{11}$  a  $S_{55}$  ležící na kvartice kovariantní a protínají danou kvartiku vždy ve dvou cyklech (které ovšem mohou splýnout).

Kvadriky  $Q$ ,  $Q'$ , které jsou samodružné ve všech harmonických kolineacích druhého druhu,<sup>13</sup> nazýváme hlavními kvadrikami harmonické kvartiky.

Harmonické kolineace spolu se základními kolineacemi tvoří grupu  $G_{61}$ , která ovšem obsahuje grupu  $G_{32}$  (tvořenou kolineacemi základními) jako podgrupu. Uvedeme v přehledu ty podgrupy grupy  $G_{61}$ , které obsahují aspoň jednu kolineaci harmonickou. Zbývající podgrupy této grupy jsou totiž zároveň podgrupami grupy  $G_{32}$  a jsou tedy známy z citované práce B. Bydžovského.<sup>14</sup>

a) Podgrupy  $g_4$  (tj. podgrupy grupy  $G_{61}$  čtvrtého řádu) jsou cyklické grupy vytvořené vždy jednou harmonickou kolineací. Obsahují dvě harmonické kolineace navzájem inverzní a jednu zápornou involuci.<sup>15</sup> Tato involuce je

<sup>13</sup> Tyto kvadriky tvoří jednu ze tří dvojic uvedených v poznámce 8 a jsou samodružné v 16 základních kolineacích, které složeny s kolineací  $\beta(1,0)$  dávají právě všechny harmonické kolineace druhého druhu.

<sup>14</sup> Viz [2], str. 10—11.

<sup>15</sup> Každá podgrupa obsahuje ovšem též identitu, což výslovně neuvádíme.

bud' středová nebo osová podle toho, jsou-li příslušné harmonické kolineace prvního nebo druhého druhu. Podgrup  $g_4$  je 16.

b) Podgrupy  $g_8$  jsou vytvořeny dvěma kolineacemi  $\beta(m, n)$  a  $\beta(m + 2, n + 2)$ . Obsahují čtyři harmonické kolineace příslušné k téže záporné involuci, dvě záporné involuce středové (se sdruženými středy) nebo osové (s osami obsaženými na téže hlavní kvadrice) a jednu kladnou involuci, jejíž osy jsou spojnice sdružených vrcholů. Těchto podgrup je 8.

c) Podgrupy  $g_{16}$  jsou vytvořeny dvěma kolineacemi  $\beta(m, n)$  a  $\beta(m + 2, n)$  nebo  $\beta(m, n + 2)$ . Obsahují osm harmonických kolineací příslušných ke dvěma záporným involucím obsaženým v téže podgrupě  $g_8$ , čtyři záporné involuce středové (tj. všechny) nebo osové (s osami ležícími na hlavních kvadrikách) a všechny involuce kladné. Tyto podgrupy jsou 4.

d) Podgrupy  $g_{32}$  jsou vytvořeny dvěma kolineacemi  $\beta(m, n)$  a  $\beta(m', n')$ , kde  $m \equiv m' \pmod{2}$  a  $n \equiv n' \pmod{2}$ . Obsahují šestnáct harmonických kolineací téhož druhu, osu záporných involucí obsažených v podgrupách  $g_{16}$ , čtyři základní kolineace cyklické příslušné k téže kladné involuci, jejíž osy jsou spojnici sdružených vrcholů a všechny involuce kladné.

Snadno se zjistí, že podgrupa obsahující dvě harmonické kolineace různého druhu je totožná s celou grupou  $G_{64}$ .

## Harmonická kvartika

Z vlastností harmonických kolineací prvního druhu plyne věta:

**Věta 6.** *Superoskulační roviny ve dvou sdružených superoskulačních bodech harmonické kvartiky a dvojnásob tečná rovina dotýkající se této kvartiky ve zbývajících dvou superoskulačních bodech ležících v téže stěně jejího polárního čtyřstěnu, patří do téhož svazku (jehož osa leží ve sdružené stěně polárního čtyřstěnu). V tomto svazku rovin jsou obsaženy též tři roviny, které kvartiku protínají ve čtveřicích superoskulačních bodů a dvanáct rovin, které kvartiku protínají ve čtveřicích bodů osmítečných.*

Ukážeme, že tato vzájemná poloha superoskulačních a osmítečných bodů je pro harmonickou kvartiku charakteristická. Vyšetříme nejdříve vlastnosti týkající se bodů superoskulačních.

**Věta 7.** *Jestliže u dané kvartiky superoskulační roviny ve dvou a dvojnásob tečná rovina ve zbývajících dvou superoskulačních bodech ležících v téže stěně polárního čtyřstěnu patří do téhož svazku, je tato kvartika harmonická.*

**Důkaz.** Zvolíme polární čtyřstěn kvartiky za čtyřstěn souřadnicový, při čemž očíslování souřadnicových bodů a volbu jednotkového bodu provedeme tak, aby první dva ze superoskulačních bodů uvedených ve větě byly body  $W_{00}(1, 1, 1, 0)$  a  $W_{22}(1, -1, 1, 0)$ ; druhé dva jsou pak body  $W_{20}(-1, 1, 1, 0)$  a  $W_{02}(1, 1, -1, 0)$ . Kvadratické kužele obsahující kvartiku mají při této volbě

sořadnicového systému rovnice (2) a dvojnásob těchto čtyř kuželů v pořadí  $K_1, K_3, K_2, K_4$  je roven  $\frac{e_{21}}{e_{23}}$ .<sup>16</sup> Superoskulační roviny v bodech  $W_{00}$  a  $W_{22}$ , které jsou zároveň tečnými rovinami kužele  $K_1$  v těchto bodech, mají rovnice

$$(13) \quad e_{23}x_1 \pm e_{31}x_2 + e_{12}x_3 = 0.$$

Jejich průsečnici, která zřejmě leží v rovině  $\omega_2$ , lze vyjádřit jednodušeji rovnicemi

$$(14) \quad e_{23}x_1 + e_{12}x_3 = 0, \quad x_2 = 0.$$

Dvojnásob tečná rovina dotýkající se kvartiky v bodech  $W_{20}$  a  $W_{02}$  prochází vrcholem kužele  $K_1$  a je tedy těmito třemi body určena; její rovnice je

$$(15) \quad x_1 + x_3 = 0.$$

Protože tato rovina podle předpokladu věty prochází přímkou (14), musí být  $e_{23} = e_{12}$ , tj.  $\frac{e_{21}}{e_{23}} = -1$ . To znamená, že dvojnásob  $(K_1K_3K_2K_4) = -1$  a kvartika je tedy harmonická. Tím je věta dokázána.

Osou  $\omega_{21}$  lze ke kvartice vésti 4 dvojnásob tečné roviny, které se jí dotýkají ve dvojnásob superoskulačních bodů  $W_{00}, W_{22}; W_{20}, W_{02}; W_{11}, W_{33}; W_{31}, W_{13}$ . Je-li kvartika harmonická a jsou-li vrcholy  $O_2, O_4$  navzájem sdružené, jsou navzájem sdružené také superoskulační body každé této dvojice. V kolineaci  $\beta(0,0)$  jsou body  $W_{00}, W_{22}$  samodružné, body  $W_{20}, W_{02}$  se navzájem vyměňují a zbývající 4 body tvoří cyklus  $W_{11} - W_{31} - W_{33} - W_{13}$ . To znamená, že dvě dvojnásob tečné roviny jsou samodružné a zbývající dvě se navzájem vyměňují. Odtud plyne věta:

**Věta 8.** *Čtyři dvojnásob tečné roviny vedené k harmonické kvartice spojnici dvou sdružených vrcholů jejího polárního čtyřstěna tvoří harmonickou čtveřici, a to tak, že dvě roviny s dotykovými body ležícími v téže stěně jsou harmonicky sdružené vzhledem ke zbývajícím dvěma rovinám, jejichž dotykové body leží ve sdružené stěně.*

Dokážeme také obrácenou větu:

**Věta 9.** *Je-li dvojnásob tečné roviny vedené ke kvartice spojnici dvou vrcholů tvoří v pořadí určeném ve větě 8 harmonickou čtveřici, je tato kvartika harmonická a příslušné dva vrcholy jsou sdružené.*

Důkaz. Rovnice dvojnásob tečných rovin vedených ke kvartice (1) osou  $\omega_{21}$  jsou

$$(16) \quad x_1 \pm x_3 = 0, \quad \sqrt{e_{23}}x_1 \pm \sqrt{e_{21}}x_3 = 0.$$

<sup>16</sup> V této kapitole píšeme pro stručnost  $e_i$  místo  $e_i - e_j$ .

Jsou-li tyto roviny v určeném pořadí harmonicky sdruženy, platí vztah

$$\frac{\sqrt{e_{21}} - \sqrt{e_{23}}}{\sqrt{e_{21}} + \sqrt{e_{23}}} : \frac{\sqrt{e_{21}} + \sqrt{e_{23}}}{\sqrt{e_{21}} - \sqrt{e_{23}}} = -1,$$

jehož úpravou dostaneme  $e_{23} + e_{21} = 0$ . To znamená, že je  $(K_1K_3K_2K_4) = -1$  a tím je věta dokázána.

Vyšetříme nyní dvojice rovin, které kvartiku protínají v osmi superoskulačních bodech ležících ve dvou stěnách polárního čtyřstěnu. Kromě těchto dvou stěn polárního čtyřstěnu existují čtyři takové dvojice a jejich osy leží po dvou ve zbývajících dvou stěnách polárního čtyřstěnu. Je-li kvartika harmonická a jsou-li dané dvě stěny polárního čtyřstěnu navzájem sdružené, splývají tyto osy s osami dvojic superoskulačních rovin ve sdružených superoskulačních bodech ležících ve zbývajících dvou stěnách polárního čtyřstěnu. Ukážeme že i tato vlastnost je pro harmonickou kvartiku charakteristická.

**Věta 10.** *Jestliže osy dvojic rovin položených popsáním způsobem superoskulačními body ležícími ve dvou stěnách polárního čtyřstěnu kvartiky splývají s osami dvojic superoskulačních rovin v bodech ležících ve zbývajících dvou stěnách tohoto čtyřstěnu, je tato kvartika harmonická.*

**Důkaz.** Vhodným očíslováním vrcholů souřadnicového čtyřstěnu<sup>17</sup> dosáhneme toho, že dané superoskulační body leží v rovinách  $\omega_1$  a  $\omega_3$ . Osy dvojice rovin položených těmito body leží pak v rovinách  $\omega_2$  a  $\omega_4$ . Určíme rovnice těchto dvou os, které leží v rovině  $\omega_2$ . Jedna z nich je průsečnice rovin, které obsahují čtveřice  $W_{10} - W_{30} - W_{01} - W_{03}$  a  $W_{32} - W_{12} - W_{23} - W_{21}$  a mají rovnice

$$\sqrt{e_{23}}x_1 \pm \sqrt{e_{13}}x_2 + \sqrt{e_{12}}x_3 = 0.$$

Roviny druhé dvojice obsahují čtveřice  $W_{10} - W_{30} - W_{23} - W_{21}$  a  $W_{32} - W_{12} - W_{01} - W_{03}$  a jejich rovnice jsou

$$\sqrt{e_{23}}x_1 \pm \sqrt{e_{13}}x_2 - \sqrt{e_{12}}x_3 = 0.$$

Zkoumané osy lze tedy vyjádřit rovnicemi

$$(17) \quad \sqrt{e_{23}}x_1 \pm \sqrt{e_{12}}x_3 = 0, \quad x_2 = 0,$$

kdežto průsečnice superoskulačních rovin v bodech  $W_{00}$ ,  $W_{22}$  a  $W_{20}$ .  $W_{02}$  mají rovnice

$$(18) \quad e_{23}x_1 \pm e_{12}x_3 = 0, \quad x_2 = 0.$$

Jestliže obě tyto dvojice přímek splývají, musí být splněn vztah  $e_{23} - e_{12} = 0$  z něhož vyplývá, že příslušná kvartika je harmonická. Táž podmínka platí i pro splnutí os ležících v rovině  $\omega_4$  s průsečnicemi superoskulačních rovin v bodech  $W_{11}$ ,  $W_{33}$  a  $W_{31}$ ,  $W_{13}$ . Tím je věta dokázána.

<sup>17</sup> Za souřadnicový čtyřstěn volíme opět polární čtyřstěn kvartiky.

Porovnáme-li rovnice (17) s prvními dvěma rovnicemi (16), shledáme, že zkoumané osy leží i v těchto rovinách dvojnásob tečných jenom v případě kvartiky harmonické.

Roviny obsahující superskulační body ležící ve dvou stěnách polárního čtyřstěnu lze charakterisovat též jinak. Vyšetříme nejdříve rovinu, která obsahuje body  $W_{10}, W_{30}, W_{23}, W_{21}$  ležící ve stěnách  $\omega_1$  a  $\omega_3$ . Tato rovina prochází zřejmě bodem  $O_4$ . Protože součty argumentů dvojice bodů  $W_{10}, W_{23}$  a  $W_{30}, W_{21}$  jsou  $3\omega + 3\omega'$  a  $\omega + \omega'$ , jsou spojnice těchto bodů přímkami různých soustav Vossovy kvadriky  $Q$  charakterisované těmito hodnotami<sup>18</sup> a rovina, která tyto přímky obsahuje, je tečnou rovinou této kvadriky. Rozdělíme-li dané superskulační body na dvojice tak, že jednu dvojici tvoří body  $W_{10}, W_{21}$ , a druhou body  $W_{30}, W_{23}$ , dostaneme sčítáním jejich argumentů hodnoty  $3\omega + \omega'$  a  $\omega + 3\omega'$ , jimiž je charakterisována Vossova kvadrika  $Q'$ . To znamená, že vyšetřovaná rovina je společná tečná rovina kvadrik  $Q, Q'$  vedená k nim bodem  $O_4$ . Zbývající tři roviny obsahují čtveřice  $W_{30}-W_{10}-W_{03}-W_{01}, W_{32}-W_{12}-W_{01}-W_{03}$  a  $W_{12}-W_{32}-W_{21}-W_{23}$  odpovídají první rovině v jednotlivých kladných involucích. Protože v těchto involucích jsou všechny kvadriky obsahující kvartiku samodružné, jsou tyto roviny zbývající tři společné tečné roviny kvadrik  $Q, Q'$  vedené bodem  $O_4$ .

Je-li  $(K_1 K_3 K_2 K_4) = -1$ , jsou kvadriky  $Q, Q'$  hlavními kvadrikami harmonické kvartiky,<sup>19</sup> takže poslední charakteristickou vlastností této kvartiky lze vyslovit též takto:

**Věta 11.** *Společné tečné roviny hlavních kvadrik harmonické kvartiky vedené k nim daným vrcholem jejího polárního čtyřstěnu patří do svazků rovin určených dvojicemi superskulačních rovin ve sdružených superskulačních bodech ležících ve stěně protilehlé k danému vrcholu.*

Přistoupíme nyní ke studiu skupin bodů osmítečných, přičemž se omezíme na 16 bodů, které tvoří jednu ze skupin invariantních vůči grupě  $G_{32}$ .<sup>20</sup> Při vhodné volbě souřadnicového systému jsou to v našem označení body  $W_{mn}$ , jejichž oba indexy jsou liché.

Čtveřice osmítečných bodů

$$(19) \quad \begin{array}{ll} V_{11} - V_{71} - V_{77} - V_{17}, & V_{55} - V_{35} - V_{33} - V_{53}, \\ V_{51} - V_{31} - V_{37} - V_{57}, & V_{15} - V_{75} - V_{73} - V_{13} \end{array}$$

leží ve čtyřech rovinách procházejících bodem  $O_4$ . Protože tyto roviny tvoří v každé ze tří kladných involucí dva involutorní páry, jsou jejich průsečnice

<sup>18</sup> Viz [4], str. 74.

<sup>19</sup> Charakterisujeme-li totiž tyto kvadriky uvedeným způsobem, zjistíme snadno, že jsou ve všech harmonických kolineacích druhého druhu samodružné.

<sup>20</sup> Viz [2], str. 14.

obsaženy ve stěnách polárního čtyřstěnu kvartiky. Totéž platí o rovinách položených čtveřicemi osmítečných bodů

$$(20) \quad \begin{aligned} V_{11} - V_{35} - V_{77} - V_{53}, & \quad V_{55} - V_{71} - V_{33} - V_{17}, \\ V_{51} - V_{75} - V_{37} - V_{13}, & \quad V_{15} - V_{31} - V_{73} - V_{57}. \end{aligned}$$

Rozdělíme všechny tyto roviny na dvojice tak, aby osy těchto dvojic ležely v rovině  $\omega_2$ ; jejich rovnice mají (pro libovolnou kvartiku) tvar

$$(21) \quad x_1(\sqrt{r+e_{23}} - \sqrt{r-e_{23}}) \pm x_2(1-i)\sqrt{e_{31}} - x_3(\sqrt{r+e_{21}} - \sqrt{r-e_{21}}) = 0,$$

$$(22) \quad x_1(\sqrt{r+e_{23}} - \sqrt{r-e_{23}}) \mp x_2(1-i)\sqrt{e_{31}} + x_3(\sqrt{r+e_{21}} - \sqrt{r-e_{21}}) = 0.$$

$$(23) \quad x_1(\sqrt{r+e_{23}} + \sqrt{r-e_{23}}) \mp x_2(1-i)\sqrt{e_{31}} - x_3(\sqrt{r+e_{21}} + \sqrt{r-e_{21}}) = 0,$$

$$(24) \quad x_1(\sqrt{r+e_{23}} + \sqrt{r-e_{23}}) \pm x_2(1-i)\sqrt{e_{31}} + x_3(\sqrt{r+e_{21}} + \sqrt{r-e_{21}}) = 0,$$

kde jsme pro přehlednost položili  $\sqrt{e_{23}e_{21}} = r$ .

Čtyři přímky vyjádřené dvojicemi rovnic (21)–(24) nemusí být všechny navzájem různé; vyšetříme všechny případy, které zde mohou nastat.

Především snadno usoudíme, že přímky (21) a (23) jsou vždy navzájem různé, neboť to jsou osy dvou dvojic rovin obsahujících tytéž osmítečné body, avšak v jiném seskupení. Totéž platí o přímkách (22) a (24). Také přímky (21) a (22) jsou vždy navzájem různé, neboť jsou harmonicky sdruženy vzhledem k osám  $o_{14}$ ,  $o_{34}$ , s nimiž nesplývají. Totéž platí o přímkách (23) a (24).

Zbývají tedy dvojice přímek (21) a (24) nebo (22) a (23); podmínka totožnosti je pro obě tyto dvojice vyjádřena touž rovnicí

$$\begin{aligned} & (\sqrt{r+e_{23}} - \sqrt{r-e_{23}})(\sqrt{r+e_{21}} + \sqrt{r-e_{21}}) + \\ & + (\sqrt{r+e_{23}} + \sqrt{r-e_{23}})(\sqrt{r+e_{21}} - \sqrt{r-e_{21}}) = 0 \end{aligned}$$

neboli

$$(25) \quad \sqrt{r+e_{23}}\sqrt{r+e_{21}} - \sqrt{r-e_{23}}\sqrt{r-e_{21}} = 0;$$

odtud po snadné úpravě dostaneme  $e_{21} + e_{23} = 0$ . To znamená, že zkoumané přímky mohou splývat jen u kvartiky harmonické.

V případě harmonické kvartiky tvoří první dvě čtveřice (19) a druhé dvě (20) cykly v kolíneaci  $\beta(0,0)$ , zbývající čtyři čtveřice cykly v kolíneaci  $\beta(2,2)$ , takže roviny jimi položené skutečně po čtyřech procházejí touž přímkou ležící v rovině  $\omega_2$ .

Podobně jako roviny, které obsahují superoskulační body, jsou také roviny obsahující čtveřice (19) a (20) společné tečné roviny vždy dvou Vossových kvadrik, vedené k nim vrcholem polárního čtyřstěnu. O tom se opět přesvědčíme sčítáním argumentů příslušných bodů. Roviny položené čtveřicemi (19) se dotýkají kvadrik  $R$  a  $S$  charakterisovaných hodnotami  $\omega$  (nebo  $3\omega$ ) a  $\omega'$  (nebo  $3\omega'$ ), roviny položené čtveřicemi (20) se dotýkají kvadrik  $R'$  a  $S'$ .

Vyšetřujeme ještě společné tečné roviny vedené bodem  $O_4$  ke dvojicím  $R, S'$  a  $R', S$ . Jsou to roviny, které obsahují čtveřice

$$\begin{array}{ll} V_{11} - V_{31} - V_{77} - V_{57}, & V_{55} - V_{75} - V_{33} - V_{13}, \\ V_{51} - V_{71} - V_{37} - V_{17}, & V_{15} - V_{35} - V_{73} - V_{53}, \\ V_{11} - V_{75} - V_{77} - V_{13}, & V_{55} - V_{31} - V_{33} - V_{57}, \\ V_{51} - V_{35} - V_{37} - V_{53}, & V_{15} - V_{71} - V_{73} - V_{17}. \end{array}$$

Jichž rovnice (seřazené opět do dvojic) jsou:

$$(26) \quad x_1(\sqrt{r + e_{23}} - \sqrt{r - e_{23}}) \pm x_2(1 + i) \sqrt{e_{31}} - x_3(\sqrt{r + e_{21}} + \sqrt{r - e_{21}}) = 0,$$

$$(27) \quad x_1(\sqrt{r + e_{23}} - \sqrt{r - e_{23}}) \mp x_2(1 + i) \sqrt{e_{31}} + x_3(\sqrt{r + e_{21}} + \sqrt{r - e_{21}}) = 0,$$

$$(28) \quad x_1(\sqrt{r + e_{23}} + \sqrt{r - e_{23}}) \mp x_2(1 + i) \sqrt{e_{31}} - x_3(\sqrt{r + e_{21}} - \sqrt{r - e_{21}}) = 0,$$

$$(29) \quad x_1(\sqrt{r + e_{23}} + \sqrt{r - e_{23}}) \pm x_2(1 + i) \sqrt{e_{21}} + x_3(\sqrt{r + e_{21}} - \sqrt{r - e_{21}}) = 0.$$

Osy těchto dvojic rovin leží v rovině  $\omega_3$  a jsou navzájem různé. Kdyby totiž splýnuly přímky (26) a (29) nebo (27) a (28), bylo by

$$\begin{aligned} & (\sqrt{r + e_{23}} - \sqrt{r - e_{23}})(\sqrt{r + e_{21}} - \sqrt{r - e_{21}}) + \\ & + (\sqrt{r + e_{23}} + \sqrt{r - e_{23}})(\sqrt{r + e_{21}} + \sqrt{r - e_{21}}) = 0 \end{aligned}$$

čili

$$(30) \quad \sqrt{r + e_{23}} \sqrt{r + e_{21}} + \sqrt{r - e_{23}} \sqrt{r - e_{21}} = 0,$$

odkud úpravou dostaneme  $e_{21} + e_{23} = 0$ . To znamená, že by tato kvartika byla harmonická. Avšak pro harmonickou kvartiku, u níž splývají osy dvojic rovin položených čtveřicemi (19) a (20), platí rovnice (25), která — jak se snadno přesvědčíme — je s rovnicí (30) ve sporu. Jiné dvě přímky rovněž nespývají, neboť příslušné dvojice rovin, jichž osami tyto přímky jsou, mají buď některé z osmítečných bodů společné anebo se dotýkají týchž dvou kvadrik. Podobně lze ukázat, že jsou různé i průsečnice zkoumaných rovin, obsažené v rovinách  $\omega_1$  a  $\omega_3$ . Tyto výsledky shrneme ve větě:

**Věta 12.** *Čtyři společné tečné roviny vedené vrcholem polárního čtyřstěnu ke dvěma Vossovým kvadrikám, které patří do různých dvojic,<sup>21</sup> protínají kvartiku ve skupině 16 osmítečných bodů. Průsečnice těchto rovin leží po dvou ve stěnách polárního čtyřstěnu a jsou navzájem různé; splynou-li tyto průsečnice v některé stěně s průsečnicemi společných tečných rovin ztýpajících dvou Vossových kvadrik, které s uvedenými dvěma patří do týchž dvou dvojic, je kvartika harmonická a příslušný vrchol polárního čtyřstěnu je sdružen s vrcholem protilehlým ke stěně, v níž tyto průsečnice splývají.*

<sup>21</sup> Jde o dvojice uvedené v poznámce \*.

## LITERATURA

- [1] Bydžovský B., *Úvod do algebraické geometrie*, Praha 1948, 597—604.  
[2] Bydžovský B., *Grupa kolíneací prostorové křivky bikvadratické prvního druhu*, Rozpravy České akademie XVII (1908), č. 18, 1—13 a č. 27, 1—3.  
[3] Privalov I. I., *Analytické funkce* (český překlad), Praha 1955, 352—367.  
[4] Harnack A., *Über die Darstellung der Raumkurve vierter Ordnung erster Species und ihres Sekantensystemes durch doppelt periodische Funktionen*, Math. Ann. XII. (1877), 1—74.

*Katedra matematiky Vysoké školy strojní v Liberci*

Došlo 16. 1. 1960.

## О ГРУППЕ АВТОМОРФНЫХ КОЛЛИНЕАЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГАРМОНИЧЕСКОЙ КВАРТИКИ

Владимир Брутханс

Выводы

Под гармонической четвертикой мы понимаем в этой работе пространственную четвертику первого рода без особой точки, являющуюся базисом основной связки квадрик, четыре конуса которой гармонически базой сопряжены друг с другом.

Гармоническая четвертика воспроизводится — как и всякая пространственная четвертика первого рода без особой точки — 32 т. наз. основными коллинеациями и, кроме того, еще 32 коллинеациями, которые мы называем гармоническими. Все гармонические коллинеации являются циклическими четвертой степени; различаем два рода. В гармонических коллинеациях первого рода циклы образуются четырьмя точками, лежащими в плоскости, а эти плоскости входят в одну и ту же связку. В коллинеациях второго рода циклы образуются четырьмя точками, лежащими на двух скрещивающихся прямых.

В связке квадрик, основой которой является гармоническая четвертика, содержатся две четвертики, которые в гармонических коллинеациях первого рода переходят одна в другую, а в гармонических коллинеациях второго рода — неподвижны; мы их называем главными четвертиками. Так же как и главные четвертики ведут себя при гармонических коллинеациях еще две четвертики, пересекающиеся в четвертике, которая ковариантна данной четвертике (т. е. воспроизводится всеми 64 коллинеациями, которыми воспроизводится данная четвертика). Другой четвертики, ковариантной данной гармонической четвертике, не существует.

Из свойств гармонических коллинеаций первого рода следует, что у гармонической четвертики две сверхсоприкасающиеся плоскости в двух т. наз. сопряженных точках сверхсоприкосновения, равно как и дважды касательная плоскость, касающаяся четвертики в остальных двух точках сверхсоприкосновения, лежащих в одной и той же грани полярного четырехгранника с двумя указанными выше точками, входят в одну и ту же связку. В этой связке содержатся также две плоскости, пересекающие четвертику в восьми точках сверхсоприкосновения, лежащих в двух сопряженных гранях ее полярного четырехгранника, и являющиеся общими касательными плоскостями главных квадрик, и далее 12 плоскостей, пересекающих четвертику в 48 точках касания восьмого порядка. Для гармонической четвертики эти свойства характерны.

Дальнейшим характерным свойством гармонической четвертики является то, что дважды касательные плоскости, проведенные к ней через прямую, соединяющую две сопряженные вершины ее полярного четырехгранника, образуют в определенном порядке гармоническую четверку.



# ÜBER EINE GRUPPE AUTOMORPHER KOLLINEATIONEN DER HARMONISCHEN RAUMKURVE VIERTER ORDNUNG

VLADIMÍR BRUTHANS

## Zusammenfassung

Als harmonische Raumkurve vierter Ordnung betrachten wir in dieser Arbeit eine Raumkurve vierter Ordnung erster Species ohne Doppelpunkt, welche eine Basiskurve eines Quadrikenbüschels darstellt, dessen vier Kegel ein harmonisches Quadrupel bilden.

Eine harmonische Raumkurve vierter Ordnung reproduziert sich — wie jede Raumkurve vierter Ordnung erster Species ohne Doppelpunkt — durch 32 sog. Grundkollineationen, außerdem aber auch durch andere 32 Kollineationen, die man harmonische Kollineationen nennt. Alle diese harmonischen Kollineationen sind zyklisch 4. Ordnung; wir unterscheiden zwei Arten. Bei den einen werden die Zyklen durch vier Punkte, die in einer Ebene liegen, gebildet, wobei diese Ebenen zu einem Büschel gehören, bei den anderen werden die Zyklen vier Punkte, die auf zwei sich kreuzenden Geraden liegen, gebildet.

Im Quadrikenbüschel, dessen Basis die harmonische Raumkurve vierter Ordnung bildet, gibt es zwei Quadriken, welche in den harmonischen Kollineationen erster Art einander zugeordnet sind, hingegen in den harmonischen Kollineationen zweiter Art invariant bleiben; man nennt sie Grundquadriken. In demselben Verhältnis zu den harmonischen Kollineationen stehen auch zwei andere Quadriken, die sich in einer Raumkurve vierter Ordnung schneiden, welche mit der gegebenen kovariant (dh. durch dieselben 64 Kollineationen reproduzierbar) ist. Es gibt keine andere Raumkurve vierter Ordnung, die mit der gegebenen kovariant wäre.

Aus den Eigenschaften der harmonischen Kollineationen geht hervor, daß bei einer harmonischen Raumkurve vierter Ordnung zwei Wendebertührungsebenen in zwei sog. konjugierten Wendebertührungspunkten und die Doppeltangentialebene, welche die Kurve in den übrigen zwei — mit den bereits angeführten in derselben Ebene des Polartetraeders liegenden — Wendebertührungspunkten berührt, zu demselben Büschel gehören. In diesem Büschel gibt es noch zwei Ebenen, welche die harmonische Raumkurve vierter Ordnung in acht- in zwei konjugierten Ebenen des Polartetraeders liegenden — Wendebertührungspunkten scheiden und welche gemeinsame Tangentialebenen der beiden Hauptquadriken sind. Zwölf andere Ebenen dieses Büschels schneiden die harmonische Raumkurve vierter Ordnung in 48 Punkten, deren besondere Eigenschaft es ist, daß in jedem eine reguläre Quadrik acht zusammengefallene Schnittpunkte mit der betrachteten Kurve haben kann. Alle diese Eigenschaften der harmonischen Raumkurve vierter Ordnung haben sich als charakteristisch erwiesen.

Eine andere charakteristische Eigenschaft der harmonischen Raumkurve vierter Ordnung besteht darin, daß vier Doppeltangentialebenen, die man zu ihr durch die Verbindungslinie von zwei konjugierten Polartetraederecken führen kann, in bestimmter Reihenfolge ein harmonisches Quadrupel bilden.