

Matematicko-fyzikálny časopis

Anton Kotzig

O δ -transformáciách antisymetrických grafov

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 16 (1966), No. 4, 353--356

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126982>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1966

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O δ -TRANSFORMÁCIÁCH ANTISYMETRICKÝCH GRAFOV

ANTON KOTZIG, Bratislava

Nech G_* je daný neorientovaný normálny graf⁽¹⁾. Nech $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ je jeho vrcholová množina a nech e (kde $e > 0$) je počet jeho hrán. Ak pre každú z hrán grafu G_* zvolíme jednu z jej dvoch možných orientácií, vznikne tak z grafu G_* istý orientovaný graf. Nech $\mathfrak{G} = \{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ je množina všetkých rôznych orientovaných grafov, ktoré uvedeným spôsobom vzniknú z grafu G_* . Platí zrejme $k = 2^e$ a každý graf z \mathfrak{G} je antisymetrický v zmysle práce [2] (pozri str. 8).

Označme znakom $\omega_i(x)$ vonkajší polstupeň vrcholu v_x v grafe $G_i \in \mathfrak{G}$ (vonkajší polstupeň ω_i je mohutnosť množiny všetkých hrán usmernených v grafe z daného vrcholu) a definujeme si na množine \mathfrak{G} binárnu reláciu Ω takto: graf G_i je v relácii Ω s grafom G_j (písané $G_i \Omega G_j$) práve vtedy, keď pre všetky v_x z V platí $\omega_i(x) = \omega_j(x)$. Relácia Ω je zrejme reláciou ekvivalencie.

Poznámka 1. Je zrejmé toto: ak označíme znakom $\pi_i(x)$ vnútorný polstupeň vrcholu v_x , potom platí: $[\omega_i(x) = \omega_j(x)] \Leftrightarrow [\pi_i(x) = \pi_j(x)]$, takže nezáleží na tom, či pri definícii relácie Ω na množine \mathfrak{G} uvažujeme vonkajší alebo vnútorný polstupeň vrcholu.

Nech G_i je lubovoľný graf z \mathfrak{G} a nech C_i je jeho lubovoľný 3-cyklus ($=$ cyklos dĺžky 3). Budeme hovoriť, že graf G'_i vznikne z grafu G_i δ -transformáciou na cyklo C'_i , keď orientácia všetkých troch hrán cyklu C_i je rôzna v grafoch G_i a G'_i a orientácia všetkých ostatných hrán je v týchto grafoch rovnaká.

Lema 1. Nech G_i je graf z \mathfrak{G} a nech G_j je graf, ktorý vznikne z G_i δ -transformáciou na istom jeho 3-cyklo C_i . Potom graf G_j patrí do \mathfrak{G} a platí $G_i \Omega G_j$.

Dôkaz je zrejmý.

Na množine \mathfrak{G} definujeme si ďalšiu binárnu reláciu \mathcal{A} takto: graf G_i je v relácii \mathcal{A} s grafom G_j (písané $G_i \mathcal{A} G_j$) práve vtedy, keď $G_i = G_j$, alebo keď existuje taká postupnosť $G_{x_1}, G_{x_2}, \dots, G_{x_n}$ grafov z \mathfrak{G} , že je $G_{x_1} = G_i$, $G_{x_n} = G_j$ a že pre všetky $z = 1, 2, \dots, n-1$ platí: graf $G_{x_{z+1}}$ vznikne δ -transformáciou grafu G_{x_z} na istom jeho 3-cyklo C_{x_z} . Relácia \mathcal{A} je reflexívna, symetrická a tranzitívna, teda je reláciou ekvivalencie.

(1) Podľa [1] graf je normálny, ak neobsahuje ani násobnú hranu ani slučku.

Lema 2. Ak dva grafy z \mathfrak{G} sú v relácii Δ , potom sú tiež v relácii Ω .

Dôkaz. Platnosť tvrdenia lemy 2 vyplýva z lemy 1 a z definície relácie Δ .

O neorientovanom normálnom grafu budeme hovoriť, že je T -grafom, keď neobsahuje žiadnu kružnicu, alebo keď v každej jeho kružnici existuje aspoň jedna taká dvojica hrán, že obe hrany dvojice patria do toho istého trojuholníka grafu⁽²⁾.

Lema 3. Nech G_* je T -graf. Nech G_p je ľubovoľný graf z \mathfrak{G} a nech C je istý jeho a -cyklus. Nech G_q je ten graf z \mathfrak{G} , o ktorom platí: všetky hrany z G_p nepatriace do C majú v grafoch G_p , G_q rovnakú orientáciu a všetky hrany patriace do C majú v týchto grafoch rôznú orientáciu. Potom platí: $G_p \Delta G_q$ a počet δ -transformácií, ktoré treba urobiť, aby sa zmenil graf G_p na graf G_q je, a — 2.

Dôkaz. Je zrejmé, že nemôže byť $a < 3$. Ak $a = 3$, netreba nič dokazovať. Dokážme platnosť tohto tvrdenia: ak lema platí pre $a = r$ (kde r je isté prirodzené číslo; $3 \leq r \leq n - 1$), potom lema platí aj pre $a = r + 1$. Predpokladajme, že lema platí pre cyklus s r vrcholmi. Nech cyklus C obsahuje $r + 1$ vrcholov a nech postupnosť w_1, w_2, \dots, w_{r+1} udáva, v akom poradí prechádzame cez jednotlivé vrcholy cyklu C , ak po ňom obiehame v smere orientácie jeho hrán vychádzajúc z istého jeho vrcholu w_1 . Pretože podľa predpokladu G_* je T -graf, možno vrchol w_1 voliť tak, že platí: vrcholy w_1, w_r, w_{r+1} sú vrcholy istého trojuholníka grafu G_* , teda tak, že platí: v grafe G_* existuje hrana (označme ju h), ktorá spojuje vrcholy w_1, w_r .

Rozoznávajme tieto dva prípady: hrana h smeruje v grafe G_p z w_1 do w_r (prvý prípad), alebo má orientáciu opačnú (druhý prípad).

V prvom prípade vrcholy w_1, w_r, w_{r+1} a hrany tieto vrcholy spojujúce tvoria 3-cyklus grafu G_p . Nech G_s je graf, ktorý vznikne z grafu G_p δ -transformáciou na uvedenom 3-cykle. V grafe G_s existuje r -cyklus C' , cez vrcholy ktorého možno obiehať v smere orientácie jeho hrán v tomto poradí: $w_1, w_2, \dots, w_r, w_1$. Pritom orientácia hrán v grafoch G_q, G_s je rozdielna na všetkých hranách a len na hranách tohto r -cyklu. Podľa indukčného predpokladu stačí urobiť $r - 2$ δ -transformácií, aby sa zmenil graf G_s na graf G_q .

V druhom prípade už v grafe G_p existuje r -cyklus C' s opisanými vlastnosťami. Podľa predpokladu možno $r - 2$ δ -transformáciami zmeniť graf G_p na istý graf G_t , v ktorom všetky hrany a len hrany z C' majú inú orientáciu než v G_p . Pretože hrana h smeruje v grafe G_t z vrcholu w_1 do vrcholu w_r , vyplýva z uvedeného, že vrcholy w_1, w_r, w_{r+1} a hrany ich spojujúce tvoria v grafe G_t istý 3-cyklus C' . Ak v grafe G_t urobíme δ -transformáciu na cykle C' , vznikne tak zrejme graf G_q .

(2) O T -grafe bez mostov hovoria niektorí autori (napr. Gallai, Hajós), že je to graf triangulovatelný.

V oboch prípadoch platí $G_p \Delta G_q$ a v oboch prípadoch počet δ -transformácií, ktoré sme urobili, aby sa graf G_p zmenil na graf G_q , činil $r = 1$. (Že nevystačíme s menším počtom δ -transformácií, je zrejmé). Teda ak lema platí pre $a = 3$, platí aj pre všetky $a = 3, 4, \dots, n$. To dokazuje lemu.

Veta 1. *Kedž G_* je T -graf, potom dva grafy z \mathfrak{G} sú v relácii Λ práve vtedy, keď sú v relácii Ω .*

Dôkaz. Nech G_* je T -graf a nech G_i, G_j sú ľubovoľné dva grafy z \mathfrak{G} . Lema 2 hovorí, že ak platí $G_i \Delta G_j$, platí aj $G_i \Omega G_j$. Dokážme, že keď G_* je T -graf, platí aj obrátene: z $G_i \Omega G_j$ vyplýva $G_i \Delta G_j$! Nech G_i je v relácii Ω s G_j . Označme znakom $Z_{i,j}$ podgraf grafu G_i , ktorý obsahuje všetky vrcholy z V a ktorý obsahuje všetky tie hrany a len tie hrany, ktoré majú v G_i inú orientáciu než v grafe G_j .

Priamo z definície grafu $Z_{i,j}$ je zrejmé, že pre každý vrchol v_x z V platí toto: počet hrán, ktoré v grafe $Z_{i,j}$ prichádzajú do v_x , rovná sa počtu hrán, ktoré v grafe $Z_{i,j}$ vychádzajú z v_x . O grafe s touto vlastnosťou je známe (pozri napr. [3], str. 32, lema 2), že platí: existuje taký systém $\bar{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_d\}$ jeho cyklov, že ľubovoľná hrana je hranou práve jedného cyklu z \bar{C} .

Existuje preto postupnosť $G_{x_0}, G_{x_1}, \dots, G_{x_d}$ grafov z \mathfrak{G} tak, že je $G_i = G_{x_0}$ a že pre všetky $t \in \{1, 2, \dots, d\}$ platí: grafy $G_{x_{t-1}}, G_{x_t}$ sa líšia iba tým, že všetky hrany a len hrany cyklu C_t z \bar{C} majú v týchto grafoch rôznu orientáciu. Potom ale je $G_{x_d} = G_j$ a pretože podľa lemy 3 pre všetky $t \in \{1, 2, \dots, d\}$ platí $G_{x_{t-1}} \Delta G_{x_t}$, platí tiež $G_i \Delta G_j$, čo bolo treba dokázať.

Poznámka 2. Veta 1 na rozdiel od lemy 3 nič nehovorí o tom, koľko δ -transformácií treba urobiť, aby sa graf G_i zmenil na graf G_j . Pomocou lemy 3 možno pre počet y potrebných δ -transformácií urobiť tento odhad: $y \leq k_1 + k_2 + \dots + k_d - 2 \cdot d$, kde k_t je dĺžka cyklu C_t v rozklade \bar{C} obsahujúcim maximálny počet cyklov a kde znak d označuje tento počet.

Lema 4. *Nech graf G_* obsahuje aspoň jednu takú kružnicu K s $p > 3$ hranami, že žiadne dve jej susedné hrany nepatria do toho istého trojuholníka grafu G_* , potom v \mathfrak{G} existujú také dva grafy, ktoré sú v relácii Ω a nie sú v relácii Λ .*

Dôkaz. V množine \mathfrak{G} existuje aspoň jeden graf (označme ho G_i), ktorý má tieto vlastnosti: (1) hrany kružnice K sú v G_i orientované tak, že tvoria cyklus grafu G_i ; (2) každá hrana z G_* , ktorá spojuje istý vrchol x nepatriaci do K s vrcholom y patriacim do K , smeruje z x do y . Nech G_j je ten graf z \mathfrak{G} , ktorý má túto vlastnosť: všetky hrany z K a len hrany z K majú rôznu orientáciu v grafoch G_i, G_j . Potom ale zrejme platí: $G_i \Omega G_j$. Z orientácie grafu G_i vyplýva, že ani v grafe G_i ani v žiadnom takom grafe, ktorý je s ním v relácii Λ , neexistuje 3-cyklus, ktorý by obsahoval niektorú z hrán patriacich do K . Preto všetky grafy, s ktorými je G_i v relácii Λ , majú hrany z K orientované tak ako graf G_i , čiže: G_i nie je v relácii Λ s grafom G_j . To dokazuje lemu.

Veta 2. *Relácia Ω_* na množine \mathfrak{G} splýva s vtedy a len vtedy, keď $G_* \in \mathfrak{G}$.*

Dôkaz. Veta je priamym dôsledkom vety 1 a lemy 1.

LITERATURA

- [1] Bosák J., Rosa A., *Terminologia teórie grafov*, Čes.-terminologický časop. f. 1965, 85 - 93.
- [2] Berge C., *Théorie des graphes et ses applications*, Paris 1958.
- [3] Kotzig A., *O vymenovacích orientovaných grafoch*, Česop. pěstov. mat. 84 (1959), 31 - 45.

Doslo 8, 10, 1965

Katedra numerickej matematiky a matematickej statistiky
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenskeho,
Bratislava

ON δ -TRANSFORMATIONS OF ANTISSYMMETRIC GRAPHS

Anton Kotzig

Summary

Let $\mathfrak{G} = \{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ be the set of all different oriented graphs that arise by the orientation of all edges of a non-oriented graph without loops and multiple edges G_* and let $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ be the set of vertices of this graph. By $o_i(v)$ denote the number of edges issuing in graph $G_i \in \mathfrak{G}$ from the vertex v_i and let Ω be a binary relation defined on the set \mathfrak{G} as follows: $G_i \Omega G_j \Leftrightarrow o_i(v) = o_j(v)$ for all $v \in \{1, 2, \dots, n\}$. By a δ -transformation of an oriented graph from \mathfrak{G} we understand such a transformation of this graph into another graph from \mathfrak{G} wherein the orientation of all edges (and only edges) of a cycle of the length 3 of the original graph changes. Let us further define on the set \mathfrak{G} the binary relation \mathcal{A} as follows: $G_i \mathcal{A} G_j$ if $G_i = G_j$ or if there exists a sequence F_1, F_2, \dots, F_n of a graph from \mathfrak{G} so that $G_i = F_1, G_j = F_n$ and that for every $i = 1, 2, \dots, n-1$ we have: F_{i+1} arises by a δ -transformation of the graph F_i . The main result of the paper is the proof of the theorem: The relations Ω, \mathcal{A} on the set \mathfrak{G} coincide if and only if G_* is a triangulable graph.