

Rozhledy matematicko-fyzikální

Martin Panák

5. Středoevropská matematická olympiáda

Rozhledy matematicko-fyzikální, Vol. 87 (2012), No. 1, 53–57

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/146461>

Terms of use:

© Jednota českých matematiků a fyziků, 2012

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://dml.cz>

Tento proces neustále pokračuje (nekonečně dlouho). Dokažte, že lze zvolit bod $P \in \mathcal{S}$ a přímku ℓ , procházející bodem P , tak, že jimi začínající větrný mlýn bude mít za střed otáčení každý bod z \mathcal{S} nekonečněkrát.

3. Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je funkce z množiny reálných čísel do množiny reálných čísel splňující nerovnost

$$f(x + y) \leq yf(x) + f(f(x))$$

pro všechna reálná x a y . Dokažte, že $f(x) = 0$ pro všechna $x \leq 0$.

2. soutěžní den (19. 7. 2011)

4. Nechť n je celé kladné číslo. Máme dány rovnoramenné váhy a n závaží o hmotnostech $2^0, 2^1, \dots, 2^{n-1}$. V n krocích máme na váhy postupně po jednom umístit všechna závaží. Každý z kroků spočívá ve výběru jednoho ze závaží, které ještě není na vahách, a jeho umístění buď na levou, nebo na pravou miskou vah, ale vždy tak, aby obsah pravé misky nebyl nikdy těžší než obsah levé. Kolik různých posloupností takovýchto n kroků existuje?

5. Nechť f je funkce z množiny celých čísel do množiny celých kladných čísel taková, že pro libovolná celá m a n je rozdíl $f(m) - f(n)$ dělitelný číslem $f(m - n)$. Dokažte, že pro libovolná celá čísla m a n taková, že $f(m) \leq f(n)$, je číslo $f(n)$ dělitelné číslem $f(m)$.

6. Nechť ABC je ostroúhlý trojúhelník a Γ kružnice jemu opsaná. Dále nechť ℓ je tečna kružnice Γ a ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c jsou po řadě obrazy přímky ℓ v osové symetrii podle přímk BC, CA, AB . Ukažte, že kružnice opsaná trojúhelníku určenému přímkami ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c se dotýká kružnice Γ .

5. Středoevropská matematická olympiáda

Martin Panák, MU Brno

Pátá středoevropská matematická olympiáda (Middle European Mathematical Olympiad, MEMO) se uskutečnila 1.–7. 9. 2011 ve Varaždinu v Chorvatsku za účasti šedesáti studentů z deseti zemí středoevropského regionu, jmenovitě z Česka, Chorvatska, Litvy, Maďarska,

Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Soutěž je určená pro studenty středních škol, kteří se v daném kalendářním roce neúčastnili mezinárodní matematické olympiády (IMO). Výjimku tvoří slovinští účastníci, kteří vzhledem k relativně malému počtu obyvatel země nejsou limitováni předchozí účastí na IMO.

České družstvo tvořili *Ondřej Bartoš* z Gymnázia Žďár nad Sázavou, *Lubomír Grund* z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze, *Jan Kuchařík* z Gymnázia Jana Masaryka v Jihlavě, *Dominik Steinhauser* z Gymnázia Jana Keplera v Praze, *Jan Stopka* z Gymnázia Brno na tř. Kpt. Jaroše a *Dominik Teiml* z The English Colleague v Praze. Vedoucím družstva byl *dr. Martin Panák* z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jeho zástupcem pak *dr. Pavel Calábek* z Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci.

Město Varaždin je staré chorvatské město, které bývalo dokonce hlavním městem Chorvatska. Jeho populace dnes čítá na 50 tisíc obyvatel.

První den olympiády měli soutěžící na programu zábavnou seznamovací hru spojenou s poznáváním památek města, zatímco vedoucí výprav vybírali příklady pro soutěž z návrhů zaslaných jednotlivými účastnickými zeměmi. Večer pak proběhlo v prostorách Fakulty informatiky, varaždinské části Univerzity Záhřeb, slavnostní zahájení soutěže.

Druhý den byla na pořadu soutěž jednotlivců v prostorách jedné z Varaždinských základních škol. Každý z účastníků řešil po dobu pěti hodin čtyři příklady. Třetího dne se uskutečnila týmová soutěž, ve které mělo každé národní družstvo k dispozici jednu místnost, kde pak společně řešilo po dobu pěti hodin osm úloh. Již v sobotu večer započala koordinace oprav úloh (úlohy jsou opraveny jednak vedoucími národních týmů a nezávisle i týmem opravovatelů zajištěným organizátory; při koordinaci se výsledky oprav porovnají a případné neshody se vyřeší) a pokračovala i během neděle. V pondělí dopoledne se jury domluvila na rozdělení medailí, které se řídí podobnými pravidly jako na mezinárodní matematické olympiádě. V úterý byl program olympiády zakončen exkurzí na známý chorvatský hrad Trakošćan a návštěvou městečka Krapina, kde se nachází naleziště osídlení neandertálským člověkem. Večerního slavnostního zakončení se zúčastnila řada významných hostů, z nichž jmenujme náměstkyni chorvatského ministra školství Dijanu Vicanovou a rektora Univerzity Záhřeb Aleksu Bjeliše.

Výsledky českého družstva byly následující: Ondřej Bartoš a Dominik Steinhauser získali bronzové medaile, Lubomír Grund a Jan Stopka pak získali čestné uznání za jeden bezchybně vyřešený příklad. V týmovém

součtu bodů, které získali jednotliví účastníci daného týmu v individuální soutěži, jsme byli pátí nejlepší. Vlastní týmová soutěž se však českému družstvu příliš nevyvedla, když skončilo osmé. Z vítězství se radoval polský tým, který jako jediný získal maximální možný počet bodů. Plného bodového zisku dosáhl i vítěz soutěže jednotlivců, Wojciech Nadara, rovněž z Polska.

V následujících tabulkách uvádíme detailní výsledky českých studentů a výsledky národních družstev v týmové soutěži:

Umístění	Jméno	Body za úlohu				Body	Cena
		1	2	3	4		
1.	Wojciech Nadara (POL)	8	8	8	8	32	G
2.	Attila Szabó (HUN)	8	8	7	8	31	G
	⋮						
27.–30.	Ondřej Bartoš	3	3	0	8	14	B
	Dominik Steinhäuser	6	6	2	0	14	B
32.–33.	Jan Kuchařík	5	0	7	0	12	
38.–40.	Jan Stopka	1	0	8	0	9	HM
41.–43.	Dominik Grund	8	0	0	0	8	HM
44.–46.	Dominik Teiml	3	0	2	2	7	

Pořadí	Body za úlohu								Celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Polsko	8	8	8	8	8	8	8	8	64
2.	Maďarsko	8	0	8	3	8	8	8	8	51
3.	Německo	8	0	8	0	8	8	8	8	48
4.	Chorvatsko	2	8	8	0	3	8	8	0	37
5.	Slovensko	1	0	8	0	8	6	8	0	31
6.	Litva	6	0	8	0	8	0	8	0	30
7.	Slovinsko	2	0	8	0	4	3	8	0	25
8.	Česko	2	1	4	0	0	5	8	3	23
9.	Rakousko	1	0	6	0	5	2	8	0	22
10.	Švýcarsko	2	0	6	0	0	0	8	0	16

Mnohé další informace o průběhu této olympiády lze najít na webové stránce www.memo2011.hr. Na závěr přikládáme zadání všech úloh obou částí olympiády.

Soutěž jednotlivců

1. Na tabuli je napsáno číslo 44. Celé číslo a napsané na tabuli můžeme nahradit čtyřmi různými celými čísly a_1, a_2, a_3, a_4 , jejichž aritmetický průměr $\frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)$ je roven číslu a . V jednom kroku současně nahradíme všechna čísla na tabuli výše popsáním způsobem. Po 30 krocích dostaneme na tabuli $n = 4^{30}$ celých čísel b_1, b_2, \dots, b_n . Dokažte, že

$$\frac{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}{n} \geq 2011.$$

2. Nechť $n \geq 3$ je přirozené číslo. Jeníček a Mařenka hrají následující hru: Nejdříve Jeníček očíslovuje strany pravidelného n -úhelníku čísly od 1 do n (v libovolném pořadí; každé číslo použije právě jednou). Potom Mařenka zvolí některých $n - 3$ neprotínajících se úhlopříček rozdělujících daný n -úhelník na trojúhelníky. Všechny tyto úhlopříčky se pak očíslovují číslem 1 a dovnitř každého z trojúhelníků se napíše součin čísel na jeho stranách. Součet těchto $n - 2$ součinů označme S . Jaká bude hodnota součtu S , jestliže snahou Jeníčka je, aby byl součet co největší, a Mařenka se snaží, aby byl součet co nejmenší, přičemž oba dělají nejlepší možné volby?
3. V rovině se kružnice \mathcal{K}_1 a \mathcal{K}_2 , o středech po řadě I_1 a I_2 , protínají ve dvou bodech A a B . Nechť je úhel I_1AI_2 tupý. Tečna ke \mathcal{K}_1 v bodě A protíná \mathcal{K}_2 ještě v bodě C a tečna ke \mathcal{K}_2 v bodě A protíná \mathcal{K}_1 ještě v bodě D . Označme \mathcal{K}_3 kružnici opsanou trojúhelníku BCD . Nechť E je střed toho oblouku CD kružnice \mathcal{K}_3 , který obsahuje bod B . Přímký AC a AD protínají \mathcal{K}_3 po řadě ještě v bodech K a L . Dokažte, že přímký AE a KL jsou vzájemně kolmé.
4. Nechť k a m ($k > m$) jsou kladná celá čísla taková, že číslo $km(k^2 - m^2)$ je dělitelné číslem $k^3 - m^3$. Dokažte, že $(k - m)^3 > 3km$.

Týmová soutěž

1. Najděte všechny funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$y^2 f(x) + x^2 f(y) + xy = xyf(x + y) + x^2 + y^2,$$

kde \mathbb{R} značí množinu všech reálných čísel.

2. Necht' kladná reálná čísla a, b, c vyhovují vztahu

$$\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} = 2.$$

Dokažte, že pak

$$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}}{2} \geq \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}.$$

3. Pro přirozené číslo $n \geq 3$ označme \mathcal{M} množinu

$$\{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}, 1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq n\}$$

bodů roviny. (\mathbb{Z} značí množinu všech celých čísel.)

Určete největší možný počet prvků podmnožiny $S \subseteq \mathcal{M}$, ve které žádné tři různé body netvoří vrcholy pravouhlého trojúhelníku.

4. Necht' $n \geq 3$ je přirozené číslo. Na soutěž podobnou MEMO přijelo $3n$ účastníků, kteří hovoří n různými jazyky, přitom každý účastník mluví právě třemi různými jazyky. Dokažte, že z nich lze vybrat aspoň $\lceil \frac{2n}{9} \rceil$ jazyků tak, že žádný účastník nehovoří více než dvěma z nich. ($\lceil x \rceil$ je nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno x .)
5. Konvexní pětiúhelník $ABCDE$ má shodné strany. Úhlopříčky AD a EC se protínají v bodě S , přitom $\angle ASE = 60^\circ$. Dokažte, že pětiúhelník $ABCDE$ má dvě rovnoběžné strany.
6. Necht' ABC je ostroúhlý trojúhelník. Označme B_0 a C_0 paty výšek po řadě z vrcholů B a C . Necht' pro vnitřní bod X trojúhelníku ABC je přímka BX tečnou kružnice opsané trojúhelníku AXC_0 a přímka CX je tečnou kružnice opsané trojúhelníku AXB_0 . Ukažte, že přímky AX a BC jsou vzájemně kolmé.
7. Necht' pro neprázdné navzájem disjunktní množiny A a B platí $A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Ukažte, že existují čísla $a \in A$ a $b \in B$ tak, že číslo $a^3 + ab^2 + b^3$ je dělitelné 11.
8. Kladné celé číslo n nazveme *úžasné*, právě když existují kladná celá čísla a, b, c , pro která

$$n = (b, c)(a, bc) + (c, a)(b, ca) + (a, b)(c, ab).$$

Dokažte, že existuje 2011 po sobě jdoucích úžasných čísel.

((m, n) značí největší společný dělitel přirozených čísel m a n .)