

Jindřich Nečas

Sur l'appartenance dans la classe $C^{(k),\mu}$ des solutions variationnelles des équations elliptiques non-linéaires de l'ordre $2k$ en deux dimensions
(Communication préalable)

Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, Vol. 8 (1967), No. 2, 209--217

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/105105>

Terms of use:

© Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, 1967

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

SUR L'APPARTENANCE DANS LA CLASSE $C^{(k),\mu}$ DES SOLUTIONS
 VARIATIONNELLES DES ÉQUATIONS ELLIPTIQUES NON-LINÉAIRES DE
 L'ORDRE 2 EN DEUX DIMENSIONS

Jindřich NEČAS, Praha

(Communication préalable)

Il est considéré la régularité à l'intérieur du domaine
 plan Ω de la solution du problème variationnel

$$(1) \min_{u \in W_m^{(k)}} [\int_{\Omega} \mathcal{F}(x, D^{\alpha} u) dx - \int_{\Omega} \sum_{i=1}^m D^i u f_i dx] .$$

Ici $W_m^{(k)}(\Omega)$ est l'espace de Sobolev des fonctions réelles, dont les dérivées au sens des distributions jusqu'à l'ordre k sont de m -ème puissance sommable sur Ω , $1 < m < \infty$, et $\dot{W}_m^{(k)}(\Omega)$ est la fermeture en $W_m^{(k)}(\Omega)$ de l'espace $\mathcal{D}(\Omega)$ des fonctions indéfiniment différentiables à support compact. La notation usuelle $D^{\alpha} = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$ est utilisée.

Si $k = 1$, l'appartenance de la solution u à la classe des fonctions, dont les premières dérivées sont μ -höldériennes dans Ω ou même dans la fermeture de Ω : $\bar{\Omega}$, est démontrée sous différentes hypothèses (dont les substantielles sont les mêmes et correspondent aux nôtres) dans plusieurs travaux, dont nous citons: C.B. Morrey [4], E.R. Buley [1], O.A. Ladyženskaja, N.N. Uralceva [3]; ici la dimension de Ω

est $N \geq 2$. Tous ces travaux utilisent les résultats de De Giorgi - Nash, cf. De Giorgi [2]. La situation pour $N = 2$ (et $k = 1$) étant moins compliquée, C.B. Morrey a démontré ce résultat plus avant au travail [5] pour le cas $m = 2$. Pour $k \geq 1$, $N = 2$ et $m = 2$, ce résultat a été annoncé par J. Nečas au travail [6].

Dans ce travail est démontré un théorème sur la régularité des solutions faibles des équations elliptiques linéaires pour la dimension $N \geq 2$ (un analogue du théorème de De Giorgi pour $N = 2$) qui permet en liaison avec une technique assez fine de démontrer pour le cas $N = 2$ que la solution faible u du problème (1) appartient dans la classe $C^{(k), \mu}(\bar{\Omega}')$ (la classe des fonctions μ -höldériennes sur $\bar{\Omega}'$ avec leurs dérivées jusqu'à l'ordre k). Ici $\Omega' \subset \bar{\Omega}' \subset \Omega$, $\mu = \mu(\Omega')$.

Le problème (1) correspond au problème de Dirichlet. Un raisonnement simple montre que la question sur la régularité dans l'intérieur de Ω des solutions d'autres problèmes aux limites se ramène facilement à celle pour le problème (1). Remarquons que nous n'avons pas taché de chercher les conditions les plus générales pour $F(x, \mathcal{J}_\alpha)$, f_i pour ne pas compliquer la situation.

Hypothèses et notation: Le domaine Ω soit à frontière $\partial\Omega$ lipschitzienne. Par c , on note les différentes constantes positives.

La fonction réelle $F(x, \mathcal{J}_\alpha)$ soit définie pour $x \in \bar{\Omega}$, $|\mathcal{J}_\alpha| < \infty$, $|\alpha| \leq k$, continue ici. On suppose l'existence d'un sousensemble M des indices

$|\alpha| \leq k$, contenant tous les indices $|\alpha| = k$, tel que

$$(2) \quad |F(x, \mathcal{J}_\alpha)| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{J}_\alpha|\right)^m, \quad 1 < m < \infty,$$

$$(3) \quad F(x, \mathcal{J}_\alpha) \geq c_1 \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{J}_\alpha|\right)^m - c_2.$$

Si $m = 2$, on suppose encore l'existence des dérivées continues $\frac{\partial F}{\partial \mathcal{J}_i}, \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial \mathcal{J}_j}, \frac{\partial F}{\partial x_\ell}, \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial x_\ell}$ dans le domaine de la définition de $F(x, \mathcal{J}_\alpha)$ et

$$(4) \quad \left| \frac{\partial F}{\partial \mathcal{J}_i}(x, \mathcal{J}_\alpha) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{J}_\alpha|\right),$$

$$(5) \quad \left| \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial x_\ell}(x, \mathcal{J}_\alpha) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{J}_\alpha|\right),$$

$$(6) \quad \left| \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial \mathcal{J}_j}(x, \mathcal{J}_\alpha) \right| \leq c,$$

$$(7) \quad c_3 \sum_{|i|=k} \xi_i^2 \leq \sum_{|i|=|j|=k} \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial \mathcal{J}_j} \xi_i \xi_j \leq c_4 \sum_{|i|=k} \xi_i^2,$$

$$(8) \quad \sum_{|i|, |j| \leq k} \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial \mathcal{J}_j} \xi_i \xi_j > 0.$$

Si $m > 2$, posons $\sigma = \left[\frac{m}{2} \right]$ (partie entière),

$h = \frac{m-2}{\sigma}$ et supposons l'existence d'une fonction

$F(x, \mathcal{J}_\alpha, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma)$ définie pour $x \in \bar{\Omega}$, $|\mathcal{J}_\alpha| < \infty$,

$|\alpha| \leq k$, $0 \leq \lambda_\ell \leq 1$, $\ell = 1, 2, \dots, \sigma$, continue avec les dérivées $\frac{\partial F}{\partial \mathcal{J}_i}, \frac{\partial F}{\partial x_\ell}, \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial x_\ell}, \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{J}_i \partial \mathcal{J}_j}$ au domaine de

définition et telle que $F(x, \mathcal{J}_\alpha, 0, \dots, 0) =$

= $F(x, \mathcal{Y}_\alpha)$ (une homotopie).

Soit $0 \leq \tau \leq \sigma$ et supposons:

$$(9) \quad |F(x, \mathcal{Y}_\alpha, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\tau, 0, \dots, 0)| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|\right)^m \cdot \prod_{l=1}^{\tau} \lambda_l^{-h} \cdot (1 + \lambda_l \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|)^{-h},$$

$$(10) \quad F(x, \mathcal{Y}_\alpha, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\tau, 0, \dots, 0) \geq c_1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|^m \cdot \prod_{l=1}^{\tau} (1 + \lambda_l \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|)^{-h} - c_2,$$

$$(11) \quad \left| \frac{\partial F}{\partial \mathcal{Y}_i} (x, \mathcal{Y}_\alpha, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\tau, 0, \dots, 0) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|\right)^{m-1} \cdot \prod_{l=1}^{\tau} (1 + \lambda_l \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|)^{-h},$$

$$(12) \quad \left| \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{Y}_i \partial \mathcal{Y}_j} (x, \mathcal{Y}_\alpha, \lambda_1, \dots, \lambda_\tau, 0, \dots, 0) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|\right)^{m-2} \cdot \prod_{l=1}^{\tau} (1 + \lambda_l \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|)^{-h},$$

$$(13) \quad c_3 \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|\right)^{m-2} \prod_{l=1}^{\tau} (1 + \lambda_l \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|)^{-h} \sum_{i, j=1}^k \xi_i^2 \leq \sum_{i, j=1}^k \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{Y}_i \partial \mathcal{Y}_j} (x, \mathcal{Y}_\alpha, \lambda_1, \dots, \lambda_\tau, 0, \dots, 0) \xi_i \xi_j \leq c_4 \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|\right)^{m-2} \prod_{l=1}^{\tau} (1 + \lambda_l \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|)^{-h} \sum_{i, j=1}^k \xi_i^2,$$

$$(14) \quad \left| \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{Y}_i \partial \mathcal{Y}_j} (x, \mathcal{Y}_\alpha, \lambda_1, \dots, \lambda_\tau, 0, \dots, 0) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|\right)^{m-2} \prod_{l=1}^{\tau} (1 + \lambda_l \sum_{\alpha \in M} |\mathcal{Y}_\alpha|)^{-h},$$

$$(15) \quad \sum_{i, j=1}^k \frac{\partial^2 F}{\partial \mathcal{Y}_i \partial \mathcal{Y}_j} (x, \mathcal{Y}_\alpha, \lambda_1, \dots, \lambda_\tau, 0, \dots, 0) \xi_i \xi_j \geq 0.$$

Si $1 < m < 2$, on suppose l'existence d'une fonc-

tion $F(x, \gamma_\alpha, \lambda)$, définie pour $x \in \bar{\Omega}$, $|\gamma_\alpha| < \infty$, $|\alpha| \leq k$, $0 \leq \lambda \leq 1$, continue avec les dérivées $\frac{\partial F}{\partial \gamma_i}$, $\frac{\partial F}{\partial x_j}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial \gamma_i \partial \gamma_j}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial \gamma_i \partial x_j}$ au domaine de définition, telle que $F(x, \gamma_\alpha, 0) = F(x, \gamma_\alpha)$.

On suppose encore:

$$(16) \quad |F(x, \gamma_\alpha, \lambda)| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|\right)^m (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|)^{2-m},$$

$$(17) \quad F(x, \gamma_\alpha, \lambda) \geq c_1 \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|\right)^m (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|)^{2-m} - c_2,$$

$$(18) \quad \left| \frac{\partial F}{\partial \gamma_i}(x, \gamma_\alpha, \lambda) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|\right)^{m-1} (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|)^{2-m},$$

$$(19) \quad \left| \frac{\partial^2 F}{\partial \gamma_i \partial \gamma_j}(x, \gamma_\alpha, \lambda) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|\right)^{m-2} (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|)^{2-m},$$

$$(20) \quad \left| \frac{\partial^2 F}{\partial \gamma_i \partial x_j}(x, \gamma_\alpha, \lambda) \right| \leq c \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|\right)^{m-2} (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|)^{2-m},$$

$$(21) \quad \begin{aligned} & c_3 \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|\right)^{m-2} (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|)^{2-m} \sum_{i, j=1, \dots, n} \xi_i^2 \leq \\ & \leq \sum_{i, j=1, \dots, n} \frac{\partial^2 F}{\partial \gamma_i \partial \gamma_j}(x, \gamma_\alpha, \lambda) \xi_i \xi_j \leq \\ & \leq c_4 \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|\right)^{m-2} (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} |\gamma_\alpha|)^{2-m}, \end{aligned}$$

$$(22) \quad \sum_{i, j=1, \dots, n} \frac{\partial^2 F}{\partial \gamma_i \partial \gamma_j}(x, \gamma_\alpha, \lambda) \xi_i \xi_j \geq 0.$$

Pour la fonction u_0 de (1) on suppose:

$$(23) \quad u_0 \in W_m^{(K)}(\Omega) \text{ pour } m \geq 2,$$

$$(24) \quad u_0 \in W_2^{(K)}(\Omega) \text{ pour } m < 2,$$

en ce qui concerne f_i de (1), on suppose:

$$(25) \quad m \geq 2 : f_i \in L_2(\Omega), \quad |i| \leq k,$$

$$(26) \quad m \geq 2 : \int_{\Omega} \varphi^{k_0} \sum_{|i| \leq k} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \right|^{m_0} dx \leq c, \quad 2 < m_0,$$

$$(27) \quad m < 2 : f_i \in L_{\frac{m}{m-1}}(\Omega), \quad |i| \leq k,$$

$$(28) \quad m < 2 : \int_{\Omega} \varphi^{k_0 \frac{m}{m-1}} \sum_{|i| \leq k} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \right|^{\frac{m}{m-1}} dx \leq c;$$

ici $\varphi(x) = \text{distance}(x, \partial\Omega)$.

Exemple. Soit $F(x, \gamma) = (1 + \sum_{\alpha \in M} \gamma_{\alpha}^2)^{\frac{m}{2}}$, $1 < m < \infty$.
Alors les hypothèses sur $F(x, \gamma)$ sont satisfaites, si nous posons pour $m \geq 2$:

$$F(x, \gamma, \lambda_1, \dots, \lambda_r) = (1 + \sum_{\alpha \in M} \gamma_{\alpha}^2)^{\frac{m}{2}} \prod_{i=1}^r (1 + \lambda_i \sum_{\alpha \in M} \gamma_{\alpha}^2)^{-\frac{1}{2}},$$

pour $1 < m \leq 2$:

$$F(x, \gamma, \lambda) = (1 + \sum_{\alpha \in M} \gamma_{\alpha}^2)^{\frac{m}{2}} (1 + \lambda \sum_{\alpha \in M} \gamma_{\alpha}^2)^{1 - \frac{m}{2}}.$$

Résultats:

Théorème 1. (Facile et connu, cf. F.E. Browder [8], J. Nečas [7].) Il existe une solution unique du problème (1) et satisfait à l'équation:

(29) pour $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\int_{\Omega} \sum_{|i| \leq k} \frac{\partial F}{\partial \gamma_i}(x, D^k u) D^i \varphi dx = \int_{\Omega} \sum_{|i| \leq k} D^i \varphi f_i dx, \quad (N \geq 2).$$

Théorème 2. Soit $K_d = \{x \in E_N, |x| < d\}$, $N \geq 2$ et $u \in \overset{\circ}{W}_2^{(K)}(K_d)$ une solution faible de l'équation

$$\sum_{|i|, |j| \leq k} D^i (A_{ij} D^j u) = \sum_{|i| \leq k} D^i f_i, \quad \text{où } A_{ij} \in L_{\infty}(K_d),$$

$$A_{ij} = A_{ji} ,$$

$$(30) \quad c_1 \sum_{|i|=k} f_i^2 \leq \sum_{|i|=|j|=k} A_{ij} f_i f_j \leq c_2 \sum_{|i|=k} f_i^2 ,$$

$f_i \in L_p(K_d)$, $|i|=k$, $n \geq 2$. Alors il existe des constantes $c_3, c_4 > 1$ telles que

$$\left(\int_{K_d} \sum_{|i|=k} |D^i u|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{2}{c_4} c_3^{\frac{n-2}{2}} \left(\int_{K_d} \sum_{|i|=k} |f_i|^n dx \right)^{\frac{1}{n}}$$

si $2 \leq n \leq n$, n arbitraire mais fixe, $c_3 = c_3(n)$,

$$c_4 = c_4(n), \text{ et si } n \left(1 - \frac{\log \frac{1 - \frac{1}{2} \frac{c_1}{c_2}}{1 - \frac{c_1}{c_2}}}{\log c_4} \right) \leq 2 .$$

Théorème 3. (Cela généralise les résultats du travail de J.

Nečas [7].) Soit u la solution de (1). Alors

pour $2 < m < \infty$:

$$\int_{\Omega} \rho^{2k} \left(1 + \sum_{\alpha \in M} |D^\alpha u| \right)^{m-2} \sum_{|i| \leq k+1} (D^i u(x))^2 dx \leq c, \quad N \geq 2 .$$

Théorème 4. (Cf. le résultat de J. Nečas [6].) Soit $m = 2$,

u la solution de (1), $N = 2$. Alors il existe $\infty > \mu_k > 2$ tel que pour $|i| = k + 1$

$$\| D^i u \|_{L_{\mu_k}(L(x_0))} \leq c d^{-(1+k)} ,$$

où $L(x_0) = \{ x \in \Omega, |x - x_0| < \frac{1}{2} d, 2d = \text{distance}(x_0, \partial\Omega) \}$.

La fonction $D^i u \in C^{(0), \mu}(\bar{\Omega}')$, $\Omega' \subset \bar{\Omega}' \subset \Omega$, $\mu = 1 - \frac{2}{\mu_k}$,

$|i| = k$.

Théorème 5. Soit $m > 2$, $N = 2$, u la solution du problème (1). Alors si $\Omega_d = \{ x \in \Omega, \text{dist}(x, \partial\Omega) > d \}$:

$$\sup_{x \in \Omega_d} \sum_{|i| \leq k} |D^i u(x)| \leq c d^{-\frac{2(1+k)}{1-\frac{2}{m}}}$$

Posons $A_d = 1 + \sup_{x \in \Omega_d} \sum_{|i| \leq k} |D^i u(x)|$. Il existe

$0 < c_1 \leq 1$ de sorte que si $p = 2 + c_1 A_d^{2-m}$,
alors pour $|\alpha| = k + 1$:

$$\| D^\alpha u \|_{L_p(x_0)} \leq c d^{-(1+k)[1 + \frac{2(1+k)(m-2)}{1-\frac{2}{p}}]}$$

Enfin, nous avons pour $|\alpha| = 1 + k$:

$$\| D^\alpha u \|_{C^{(k),\alpha}(\Omega_{2d})} \leq c(\Omega_{2d}) \text{ avec } \mu = 1 - \frac{2}{p}$$

Théorème 6. Soit $1 < m < 2$, $N = 2$, u la solution du problème (1). Alors

$$\sup_{x \in \Omega_d} \sum_{|\alpha| \leq k} | D^\alpha u(x) | \leq c d^{-\frac{2(1+k)}{m-1}}$$

Il existe $0 < c_1 \leq 1$ de sorte que si $p = 2 + c_1 A_d^{m-2}$,
alors pour $|\alpha| = 1 + k$:

$$\| D^\alpha u \|_{L_p(x_0)} \leq c d^{-(1+k)[1 + \frac{4(2-m)}{m-1}]}$$

Enfin, pour $|\alpha| = 1 + k$

$$\| D^\alpha u \|_{C^{(k),\alpha}(\Omega_{2d})} \leq c(\Omega_{2d}) \text{ avec } \mu = 1 - \frac{2}{p}$$

B i b l i o g r a p h i e

- [1] E.R. BULEY: The differentiability of solutions of certain variational problems for multiple integrals, Technical Report 16(1960), Univ. Berkeley.
- [2] E. De GIORGI: Sulla differenziabilità e l'analyticità delle estremali degli integrali multipli regolari, Mem. Accad. Sci. Torino, 3(1957), 25-43.

- [3] O.A. LADYŽENSKAJA, N.N. URALCEVA: Linějnyje i kvaziliniějnyje uravněnija elliptičeskogo tipa, Izd.Nauka, Moskva 1964.
- [4] C.B. MORREY: Quelques résultats récents du calcul des variations, Colloque CNRS, Paris 1962.
- [5] C.B. MORREY: Multiple integral problems in the calculus of variations and related topics, Univ. of California Publ. 1 (1943), 1-130.
- [6] J. NEČAS: On the existence and regularity of solutions of nonlinear elliptic equations, Proceedings of Equadiff II, Bratislava 1966.
- [7] J. NEČAS: Sur la méthode variationnelle pour les équations aux dérivées partielles non linéaires du type elliptique; l'existence et la régularité des solutions, Comment. Math. Univ. Carolinae 7, 3 (1966), 301-317.
- [8] F.E. BROWDER: Variational methods for nonlinear elliptic eigenvalue problems, Bull. Amer. Math. Soc. 71 (1965), 176-183.

(Received January 13, 1967)