

Otomar Pankraz

K jisté transformaci obyčejné Volterrovy integro-diferenciální rovnice

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 61 (1932), No. 6, 231--235

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/109426>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1932

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

K jisté transformaci obyčejné Volterrovy integro-diferenciální rovnice.

Otomar Pankraz.

(Došlo 12. ledna 1932.)

Pan prof. E. Schoenbaum odvodil ze statistických úvah obyčejnou integro-diferenciální rovnici pro neznámou funkci $\varphi(x)$ v uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} = f(x) \cdot \varphi(x) + \int_a^x K(x, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad (1)$$

s počáteční podmínkou

$$\varphi(a) = A,$$

kterou substitucí

$$\varphi(x) = e^{\int_a^x f(z) dz} \cdot u(x) \quad (2)$$

redukuje na rovnici

$$u(x) = A + \int_a^x H(x, \xi) u(\xi) d\xi, \quad (3)$$

při čemž

$$H(x, \xi) = \int_{\xi}^x e^{-\int_{\xi}^t f(z) dz} \cdot K(t, \xi) dt. \quad (4)$$

O všech funkcích předpokládáme, že jsou spojitě.

V „Aktuárských vědách“, roč. I., č. 4*) položil jsem si otázku, do jaké míry tato substituce má vliv na jádro rovnice, zvolíme-li

*) V tomto článku se vyskytlo několik tiskových chyb, které ruší četbu.

za $f(x)$ speciální funkci a to $f(x) = \text{konst.}$ Zjistíme, že pak platí: *Rovnice (1) dá se redukovat substitucí (2) na rovnici (3) tehdy a jen tehdy, jestliže jádro $K(x, \xi)$ jest tvaru $K \equiv K(x - \xi)$.*

V následujícím podám zcela jednoduchý důkaz tohoto tvrzení.

[1.] Důkaz se opírá o některé základní pojmy z Volterrový teorie permutačních funkcí. Jsou-li na $a \leq \xi \leq x \leq b$ dány dvě spojité funkce $F(x, \xi)$ a $G(x, \xi)$, nazývá je Volterra *funkcemi permutačními* (záměnnými), jestliže platí

$$\int_{\xi}^x F(x, z) G(z, \xi) dz = \int_{\xi}^x G(x, z) F(z, \xi) dz$$

pro každý bod definičního oboru. Symbolicky identitu píše

$$\overset{*}{F}\overset{*}{G} = \overset{*}{G}\overset{*}{F}.$$

Abych podal základy Volterrový teorie p. f. ve formě pokud možno ucelené, budu postupovati následovně: V teorii p. f. (v podání Volterrově) jest třeba uvažovat dvojí druh objektů: 1. reálné spojité funkce (obecně) dvou proměnných, a 2. objekty, o jejichž povaze stačí jediné vědět, že lze s nimi počítati podle zcela určitých pravidel. Každý objekt z obou druhů nahradím příslušným symbolem a budu uvažovati souhrn všech těchto symbolů. Protože a priori vím, že aspoň některé symboly mohou bezprostředně obsahově interpretovat jako reálné spojité funkce, budu také mluvit o „souhrnu určitých elementů“ místo o „souhrnu určitých symbolů“. Na to budu se symboly počítati podle základních aritmetických pravidel (jako kdyby to byla čísla reálná) a teprve ve výsledku přejdu k obsahově interpretaci symbolů.

Budtež tedy dány objekty, které nazvu „permutačními elementy“.

Je-li nějaký objekt e permutačním elementem, označím jej e^* . O povaze těchto elementů postulujeme:

(I.) *Postulát formální: Libovolné dva permutační elementy lze navzájem sečíst, odečíst, znásobit a dělit v aritmetickém smyslu.*

Definice: Operace aritmetické v (I.) nazvu také operacemi permutačními.

(II.) *Postulát obsahový: Jestliže permutačními elementy jsou dvě reálné spojité funkce $F(x, \xi)$ a $G(x, \xi)$ definované v oboru $a \leq \xi \leq x \leq b$, pak permutační násobení těchto funkcí jest identické s integrální operací*

$$\overset{*}{F}\overset{*}{G} = \int_{\xi}^x F(x, z) G(z, \xi) dz$$

platnou pro každý bod oboru.

Dá se ukázati, že tyto postuláty postačí, abychom bezesporně odvodili všechny výsledky teorie p. f., jak jsou na př. podány v knize „Volterra-Pérés: Leçons sur la composition et les fonctions permutables, 1924“.

Budiž na tomto místě učiněna následující zásadní poznámka. Volterrova teorie p. f. souvisí s obecnější teorií nekonečných matic. Výsledky, ke kterým tato teorie dospěla, jsou celkem chudé a v teorii nekonečných matic jsou to jen zajímavé speciální případy.

[2.] Z vět o permutačních funkcích potřebujeme následující:

1. Mezi permutačními elementy existuje jeden jediný element, označme jej $\overset{*}{1}^0$, takový, že

$$\overset{*}{e} \cdot \overset{*}{1}^0 = \overset{*}{e},$$

kde $\overset{*}{e}$ jest libovolný p. element.

2. Budiž na $a \leq \xi \leq x \leq b$ spojitá reálná funkce $F(x, \xi)$ a utvořme všechny reálné spojitě funkce $G(x, \xi)$, pro které $\overset{*}{F}G = \overset{*}{G}F$. Necht' (S_1) jest souhrn všech těchto funkcí. Pro každou funkci $G(x, \xi)$ z (S_1) nalezneme element $\overset{*}{e}$, že platí $\overset{*}{G}e = \overset{*}{1}^0$. Buď (S_2) souhrn všech těchto elementů $\overset{*}{e}$. Nazveme pak $(S) = (S_1) + (S_2)$ souhrnem všech permutačních elementů s danou funkcí F . Dokáže se: (S) jest grupa permutačních elementů. V každé grupě (S) existuje subgrupa těch elementů, které jsou sestrojeny jedině pomocí dané funkce F .

3. a) Označíme-li $\overset{*}{F} \cdot \overset{*}{F} = \overset{*}{F}^2$, obecně $\overset{*}{F}^{n-1} \cdot \overset{*}{F} = \overset{*}{F}^n$ a $\overset{*}{F} = \overset{*}{F}^1 = F$, $\overset{*}{F} \cdot \overset{*}{F}^{-1} = \overset{*}{1}^0$, pak zmíněná subgrupa jest vytvořena elementy $\overset{*}{F}^k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

b) Aby byla splněna relace $\overset{*}{F}G = \overset{*}{G}F$, kde $\overset{*}{F} \equiv \overset{*}{F}(x, \xi)$ jest spojitá funkce a $\overset{*}{G} \equiv 1$, jest nutné a postačí, aby $\overset{*}{F} \equiv \overset{*}{F}(x - \xi)$. Souhrn všech funkcí toho tvaru patří do grupy, kterou Volterra nazval grupou uzavřeného cyklu.

4. V dalším budeme hledati jen ta řešení integrálních rovnic, pro která platí následující princip: Každá reálná funkce spojitá $\overset{*}{F}(x, \xi)$ v $a \leq \xi \leq x \leq b$ vyskytující se v rovnici integrální (a integro-diferenciální) patří do jisté grupy (subgrupy) permutačních elementů.

[3.] Vraťme se k našemu tvrzení.

Relaci (4) můžeme psáti

$$H(x, \xi) = \overset{*}{1} K_1(x, \xi),$$

kde

$$K_1(x, \xi) = e^{-\int_{\xi}^x f(z) dz} \cdot K(x, \xi).$$

Podle principu ve [2, 4], každá funkce dvou proměnných vyskytující se v rovnici integrální a integro-diferenciální, musí být elementem z nějaké grupy p. elementů. Tedy také funkce $\overset{*}{H}(x, \xi)$ ve (3) musí náležet do nějaké (dosud neurčené) grupy (S). Budiž $\overset{*}{X}$ libovolně zvolený element z (S). Potom musí

$$\overset{*}{H} \cdot \overset{*}{X} = \overset{*}{X} \cdot \overset{*}{H},$$

avšak

$$H = \overset{*}{1} \overset{*}{K}_1,$$

tedy po dosazení a dovolené úpravě

$$(\overset{*}{1} \overset{*}{K}_1) \overset{*}{X} = \overset{*}{1} (\overset{*}{X} \overset{*}{K}_1) = R.$$

Protože funkce R patří do (S), musí být permutační s kterýmkoliv elementem, které v permutaci vstoupily, tedy

$$\overset{*}{1} \overset{*}{R} = \overset{*}{R} \overset{*}{1},$$

z čehož

$$\overset{*}{1} \overset{*}{X} = \overset{*}{X} \overset{*}{1},$$

což znamená, že grupa (S) jest identická s grupou uzavřeného cyklu a tedy také

$$\overset{*}{1} \overset{*}{K}_1 = \overset{*}{K}_1 \overset{*}{1}.$$

Naopak, kdyby K_1 nebyla p. funkcí z grupy uzavřeného cyklu, nemohla by z tohoto cyklu být funkce R a tedy neplatila by relace (4). To však znamená, že by substituce (2) nebyla přípustná, což jest proti předpokladu.

[4.] Zbývá dokázat: Jestliže K_1 patří do grupy uzavřeného cyklu, také K jest elementem z této grupy (a naopak). Toto tvrzení jest speciálním případem následující relace. Budiž dána pro každý bod uvažovaného oboru relace

$$e^{\int_{\xi}^x f(z) dz} \cdot \varphi(x - \xi) = F(x - \xi); \quad (5)$$

jakého tvaru musí být funkce f , aby (5) byla splněna? Pro φ (a F) jest nutné a postačí, aby

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} = 0. \quad (6)$$

Provedme parciální logaritmické derivace výrazu (5)

$$f(x) + \frac{1}{\varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{1}{F} \frac{\partial F}{\partial x}$$

$$-f(\xi) + \frac{1}{\varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} = \frac{1}{F} \frac{\partial F}{\partial \xi},$$

sečtěme a použijme (6). Plyne

$$f(x) = f(\xi) \text{ tedy } = \text{konst.}$$

Obrátíme-li nyní předpoklady, plyne pro náš speciální případ, že jest nutno a stačí, aby $K \equiv K(x - \xi)$, jak bylo dokázati.

*

Sur une transformation de la théorie des équations intégrales.

(Extrait de l'article précédent.)

En s'appuyant sur quelques notions de la théorie de fonctions permutables de Volterra l'auteur démontre: Soit dans l'équation (1) du texte tchéque $f(x) = \text{constante}$. La condition nécessaire et suffisante pour que l'équation (1) soit réductible par la substitution (2) à l'équation (3) est que le noyau $K(x, \xi)$ soit une fonction $K \equiv K(x - \xi)$.