

## Úlohy a problémy

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 79 (1954), No. 4, 367--369

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117135>

### Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1954

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

## ÚLOHY A PROBLÉMY

6. Dá se ukázat (viz na př. HORN, *Gewöhnliche Diff.-Gleichungen beliebiger Ordnung*, 1905, § 72), že řešení dif. rovnice

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\lambda y + \sin x}{y} \quad (\lambda > 0),$$

lze v okolí počátku rozvinout v mocninnou řadu.

Určete poloměr konvergence těchto řad.

O. Vejvoda, Praha.

7. Buď  $c(x)$  po částech spojitá funkce v  $\langle 0, 1 \rangle$ . Nazveme řešení problému  $K$  vzhledem k funkci  $c(x)$  a číslu  $P$  funkci  $y(x)$  a koeficienty  $a, b$ , které splňují rovnici

$$y''(x) + P y(x) = ax + b + c(x)$$

a okrajové podmínky

$$y(0) = y(1) = 0; \quad y''(0) = 0, \quad y'(1) = 0.$$

Charakteristickým číslem problému  $K$  nazveme číslo  $P^0$  takové, že existuje netriviální řešení problému  $K$  vzhledem k funkci  $c(x) = 0$  a  $P = P^0$ . Toto řešení nazveme charakteristickou funkcí problému. Prvou charakteristickou funkcí nazveme charakteristickou funkci příslušnou k nejmenšímu charakteristickému číslu  $P_1^0$ . Buď  $M$  množina všech funkcí  $c(x)$  po částech konstantní (s konečným počtem nespojitostí) v  $\langle 0, 1 \rangle$  splňující tam vztah  $|c(x)| = \varepsilon$ . Lze ukázat, že problém  $K$  vzhledem ke každému  $c(x) \in M$  a  $P \neq P^0$  má jediné řešení a při tom  $y''(x)$  jest po částech spojitá funkce. Definujme na  $M$  funkcionálu  $F$  tímto předpisem:

$$F(c(x)) = \sup_{0 \leq x \leq 1} y''(x),$$

kde  $y(x)$  jest řešením problému  $K$  vzhledem k  $c(x)$  [ $c(x) \in M$ ] a  $0 < P < P_1^0$ .

Domnívám se, že funkcionála  $F$  má tyto vlastnosti:

1. Existuje funkce  $c^*(x) \in M$  pro kterou funkcionála  $F$  nabývá svého maxima.

2. Funkce  $c^*(x)$  má právě tolik bodů nespojitosti, jako má prvá charakteristická funkce bodů, v nichž platí  $y''(x) = 0$ .

3. Funkce  $c^*(x)$  má skoky právě v těch bodech, ve kterých řešení  $y(x)$  problému  $K$  vzhledem k  $c(x)$  a  $P$  splňuje vztah

$$y''(x+0) + y''(x-0) = 0.$$

Ivo Babuška, Praha.

8. Lze dokázat tuto větu:

Buď  $f(x)$  spojitá funkce na  $\langle a, b \rangle$ . Označme

$$G_n(f) = \sum_{k=1}^n E_k f(x_k)$$

Gaussovu kvadraturu funkce  $f(x)$ . Jestliže  $f(x)$  má  $p$  spojitých derivací a  $f^{(p)}(x)$  splňuje Lipschitzovu podmínku s koeficientem  $\alpha$  ( $0 < \alpha \leq 1$ ), potom platí

$$\int_a^b f(x) dx - G_n(f) \leq O\left(\frac{1}{n^{p+\alpha}}\right) \text{ pro } n \rightarrow \infty.$$

Důkaz. Podle Jaksonovy věty (srv. И. П. Натансон, Конструктивная теория функций, str. 164) existují polynomy  $P_n(x)$  stupně  $n$  a konstanta  $C$  tak, že

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{C}{n^{p+\alpha}}.$$

Proto platí

$$\left| \int_a^b f(x) dx - G_n(f) \right| \leq \left| \int_a^b f(x) dx - G_n(P_n) \right| + |G_n(f - P_n)|.$$

Protože všechny koeficienty  $A_k$  Gaussovy kvadratury jsou kladné a  $\sum_{k=1}^{k=n} A_k = b - a$ , platí

$$G_n(f - P_n) \leq \frac{C}{n^{p+\alpha}} (b - a).$$

Dále podle známých vlastností Gaussovy kvadratury jest

$$G_n(P_n) = \int_a^b P_n(x) dx$$

a proto

$$\left| \int_a^b f(x) dx - G_n(f) \right| \leq \frac{\text{konst}}{n^{p+\alpha}},$$

což bylo dokázati.

Rozhodněte, zda tuto větu lze obrátit, t. j. zda platí tato věta:

Buď  $f(x)$  spojitá funkce na intervalu  $\langle a, b \rangle$  a necht' platí

$$\left| \int_a^b f(x) dx - G_n(f) \right| \leq O\left(\frac{1}{n^{p+\alpha}}\right) \text{ pro } n \rightarrow \infty.$$

Potom  $f(x)$  má  $p$  spojitých derivací a  $f^{(p)}(x)$  vyhovuje Lipschitzově podmínce.

(Srv. Bernšteinovu větu, str. 167, výše cit. knihy.)

Ivo Babuška, Praha.

**Poznámka k úloze 1**, uveřejněné ve 2. čísle tohoto ročníku na str. 163.

K této úloze došlo redakci několik upozornění, že jde o známou *Pellovu rovnici*; ta má vždy dokonce nekonečně mnoho řešení. Důkaz není snadný a lze ho nalézt téměř v každé knize o teorii čísel (na př. DICKSON-BODEWIG *Einführung in die Zahlentheorie*, 1931, str. 109, cvič. 5, a str. 144; E. LANDAU, *Vorlesungen über Zahlentheorie*, 1927, I. sv., str. 57 až 64; W. SIERPIŃSKI, *Teoria liczb*, 1950, str. 251—261).

První sdělení zaslal redakci dr MIL. HLAVÁČEK, profesor jedenáctileté stř. školy v Náchodě.

*Jan Mařík, Praha.*