

František Zítek

Poznámka k teorii (BB) -integrálu

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 84 (1959), No. 1, 83--89

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117287>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1959

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

POZNÁMKA K TEORII (BB) -INTEGRÁLU

FRANTIŠEK ZÍTEK, Praha .

(Došlo dne 15. února 1958)

DT : 517.6

Výsledků obsažených v práci [1] je využito k odvození podmínek (BB) -integrability náhodné funkce intervalu.

1. Úvod a shrnutí. V práci [4] jsme zavedli pojem náhodné funkce intervalu s nezávislými přírůstky a pojem (BB) -integrálu takové funkce. Při studiu podmínek (BB) -integrability byla tam v § 5 dokázána věta 15 udávající nutné a postačující podmínky (BB) -integrability dané náhodné funkce X definované v intervalu K , za předpokladu, že X je na K spojitá v \emptyset .¹⁾

H. BERGSTRÖM studoval v [1] podmínky existence limitních zákonů rozložení součtů nezávislých náhodných proměnných a dokázal některé věty, jichž lze využití k odvození podmínek (BB) -integrability náhodné funkce intervalu podobně, jako jsme v [4] využili vět uvedených v § 25 monografie [2]. Místo poměrně složitých podmínek věty 15 z [4] dostaneme tak jednu podmínku jednodušší, ovšem s přihlédnutím k dalšímu předpokladu (b). Bez zajímavosti není ani důsledek pomocné věty z odstavce 2, resp. jejího zobecnění; je uveden v odstavci 4 a týká se souvislosti (BB) -integrability s existencí (BB) -integrálu.

2. Pomocná věta. Provedeme si nejprve některé pomocné úvahy z teorie Burkillova integrálu, které nám později poslouží při důkazu naší hlavní věty. Budiž K konečný interval v $R = (-\infty, \infty)$ a budiž $f(I, x)$ konečná reálná funkce intervalu definovaná pro $I \subset K$, $x \in R$. Řekneme, že Burkillův integrál $\int_K f(I, x)$ konverguje stejnoměrně vzhledem k $x \in R$, jestliže pro libovolnou posloupnost $\{\mathcal{D}_n\}$ dělení intervalu K splňující $v(\mathcal{D}_n) \rightarrow 0$ platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{I \in \mathcal{D}_n} f(I, x) = \int_K f(I, x) < \infty \quad (1)$$

stejnoměrně vzhledem k $x \in R$.

Podmínku stejnoměrné konvergence integrálu $\int_K f(I, x)$ lze vyjádřit též tímto ekvivalentním způsobem (srv. [3], 3.6):

¹⁾ Znalost práce [4] se v tomto článku předpokládá, a proto bez rozpaků používáme pojmů i označení, které jsme v [4] zavedli.

Ke každému kladnému ε existuje kladné δ takové, že pro libovolná dvě dělení \mathcal{D}_1 a \mathcal{D}_2 intervalu K splňující $\nu(\mathcal{D}_1) < \delta$ a $\nu(\mathcal{D}_2) < \delta$ platí

$$\sup_{x \in R} \left| \sum_{I \in \mathcal{D}_1} f(I, x) - \sum_{I \in \mathcal{D}_2} f(I, x) \right| < \varepsilon. \quad (2)$$

Lemma. *Jestliže Burkillův integrál $\int_K f(I, x)$ konverguje stejnoměrně vzhledem k $x \in R$, pak pro každý interval $J \subset K$ integrál $\int_J f(I, x)$ rovněž konverguje stejnoměrně vzhledem k $x \in R$.*

Důkaz. Budiž $\varepsilon > 0$, najdeme takové $\delta > 0$, aby pro každá dvě dělení intervalu K s normami menšími než δ platilo (2). Budiž J libovolný interval $J \subset K$ a buďtež \mathcal{D}'_1 a \mathcal{D}'_2 dvě dělení intervalu J s normami menšími než δ . Dělení \mathcal{D}'_1 a \mathcal{D}'_2 doplníme na dělení \mathcal{D}_1 resp. \mathcal{D}_2 celého intervalu K tak, aby se jejich normy nezvětšily; přitom v intervalech tvořících rozdíl $K - J$ (které mohou být i prázdné), doplňujeme obě dělení týmiž intervaly. Pro dělení \mathcal{D}_1 a \mathcal{D}_2 platí tedy (2), avšak

$$\sum_{I \in \mathcal{D}_1 - \mathcal{D}'_1} f(I, x) = \sum_{I \in \mathcal{D}_2 - \mathcal{D}'_2} f(I, x), \quad (3)$$

takže skutečně

$$\sup_{x \in R} \left| \sum_{I \in \mathcal{D}_1} f(I, x) - \sum_{I \in \mathcal{D}_2} f(I, x) \right| < \varepsilon, \quad (4)$$

c. b. d.

3. Hlavní věta. Budiž K konečný interval v R , budiž X náhodná funkce intervalu s nezávislými přírůstky definovaná v K . Označíme $F(I, x)$ distribuční funkci náhodné proměnné $X(I)$ a pro $0 < \eta < \infty$ položíme pak

$$M_j(I, \eta) = \int_{|x| < \eta} x^j dF(I, x), \quad j = 1, 2. \quad (5)$$

Symbolem $E(x)$ označíme distribuční funkci náhodné proměnné $V\{0\}$, symbolem $\Phi(x)$ označíme distribuční funkci normální, tj.

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (6)$$

O náhodné funkci X budeme v tomto odstavci stále předpokládat, že splňuje následující dvě podmínky:

(a) funkce X je spojitá v \emptyset , tj. platí

$$\lim_{|I| \rightarrow 0} F(I, x) = E(x) \quad (7)$$

stejněměrně vzhledem k $I \subset K$;²⁾

(b) pro každé konečné kladné η existuje konečný horní Burkillův integrál

$$\int_K |M_1(I, \eta)| < \infty. \quad (8)$$

²⁾ Konvergencí distribučních funkcí rozumíme obvyklou konvergenci v podstatě.

Poznámka. Je zřejmé, že podmínka (b) je splněna např. vždy tehdy, jestliže náhodné proměnné $X(I)$ mají symetrické (okolo nuly) zákony rozložení; stačí dokonce, aby tato podmínka byla splněna jen pro dostatečně malé intervaly $I \subset K$. V tomto případě bude ovšem $M_1(I, \eta) = 0$ pro každé $\eta < \infty$, a tedy (8) platí, neboť integrál je roven nule.

Každé distribuční funkci $F(I, x)$ a kladnému číslu σ pak přiřadíme tzv. Weierstrassovu transformaci $F_\sigma(I, x)$ vzorcem

$$F_\sigma(I, x) = F(I, x) * \Phi\left(\frac{x}{\sigma}\right), \quad (9)$$

(používáme přitom obvyklé značky $*$ pro označení konvoluce dvou distribučních funkcí). Položme nyní

$$\begin{aligned} H_\sigma(I, x) &= F_\sigma(I, x) - \Phi\left(\frac{x}{\sigma}\right), \\ &= [F(I, x) - E(x)] * \Phi\left(\frac{x}{\sigma}\right). \end{aligned} \quad (10)$$

Funkce $H_\sigma(I, x)$ je pro každé $\sigma > 0$, $I \subset K$, rozdílem dvou distribučních funkcí, tedy funkcí s omezenou variací, a platí $-1 \leq H_\sigma(I, x) \leq 1$ pro všechna $x \in R$, $\sigma > 0$, $I \subset K$.

Nyní již můžeme vysloviti svou hlavní větu vyjadřující podmínky (BB)-integrability funkce \mathbf{X} v intervalu K za předpokladu, že \mathbf{X} splňuje podmínky (a) a (b):

Věta. Nutnou a postačující podmínkou (BB)-integrability funkce \mathbf{X} v K jest, aby pro každé $\sigma > 0$ Burkillův integrál

$$\int_K H_\sigma(I, x) \quad (11)$$

konvergoval stejnoměrně vzhledem k $x \in R$.

Důkaz. I. Ukážeme si nejprve nutnost této podmínky. Je-li tedy \mathbf{X} (BB)-integrabilní v K , pak ovšem existuje i (BB)- $\int_K \mathbf{X}$. Budiž $\{\mathcal{D}_n\}$ libovolná posloupnost dělení intervalu K splňující podmínku $\nu(\mathcal{D}_n) \rightarrow 0$. Necht dělení \mathcal{D}_n se skládá z intervalů $I_1^{(n)}, I_2^{(n)}, \dots, I_{k_n}^{(n)}$. Položíme-li nyní

$$F_k(n; x) = \begin{cases} F(I_k^{(n)}, x) & \text{pro } 1 \leq k \leq k_n, \\ E(x) & \text{pro } k_n < k, \end{cases} \quad (12)$$

pak tyto distribuční funkce $F_k(n; x)$ tvoří dvojnou posloupnost, která splňuje podmínku C_0 (a tedy také podmínku C) práce Bergströmovy (srv. [1], § 10), tj. platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_k(n; x) = E(x) \quad (13)$$

stejněměrně vzhledem ke k ; to plyne z předpokladu (a). Kromě toho je tato posloupnost také *centrovaná*, tj. platí vzorec (10.4) práce Bergströmovy, což je

důsledkem předpokladu (b). Podle Bergströmovy věty 17.1 pak ovšem posloupnost funkcí

$$f_{0k_n}(n, x) = \sum_{j=1}^{k_n} [F_j(n; x) - E(x)] \quad (14)$$

je cauchyovská ve W -normě, tj. platí pro každé $\sigma > 0$

$$\sup_{x \in R} \left| f_{0k_n}(n, x) * \Phi \left(\frac{x}{\sigma} \right) - f_{0k_m}(m, x) * \Phi \left(\frac{x}{\sigma} \right) \right| < \varepsilon \quad (15)$$

jakmile n a m jsou dostatečně velká. V našem označení je však (15) ekvivalentní se vztahem

$$\sup_{x \in R} \left| \sum_{I \in \mathcal{D}_n} H_\sigma(I, x) - \sum_{I \in \mathcal{D}_m} H_\sigma(I, x) \right| \rightarrow 0 \quad (16)$$

platným pro každé $\sigma > 0$, takže pro každé $\sigma > 0$ existuje limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{I \in \mathcal{D}_n} H_\sigma(I, x), \quad (17)$$

a to stejnoměrná vzhledem k $x \in R$. Zbývá již nyní jen ukázat, že tato limita je nezávislá na konkrétní volbě posloupnosti dělení \mathcal{D}_n . To se však již snadno provede obvyklým způsobem: vezměme dvě takové posloupnosti $\{\mathcal{D}'_n\}$ a $\{\mathcal{D}''_n\}$ splňující $\nu(\mathcal{D}'_n) \rightarrow 0$, $\nu(\mathcal{D}''_n) \rightarrow 0$. Pro obě existují (stejnoměrně vzhledem k $x \in R$) limity (17). Utvoříme kombinovanou posloupnost $\{\mathcal{D}_n\}$ tak, že položíme $\mathcal{D}_{2k-1} = \mathcal{D}'_k$, $\mathcal{D}_{2k} = \mathcal{D}''_k$ pro $k = 1, 2, \dots$. Platí zřejmě opět $\nu(\mathcal{D}_n) \rightarrow 0$, a tedy i vztah obdobný (16), z toho však již vyplývá rovnost obou limit. Dokázali jsme tak skutečně stejnoměrnou konvergenci integrálu (11).

II. Předpokládejme nyní naopak, že podmínka věty je splněna, máme pak dokázat, že pro libovolný interval $J \subset K$ existuje integrál $(BB)\text{-}\int_J \mathbf{X}$. Budiž tedy J libovolný takový interval, v důsledku pomocné věty, kterou jsme si dokázali v odstavci 2, konverguje také integrál $\int_J H_\sigma(I, x)$ stejnoměrně vzhledem k $x \in R$, a to pro každé kladné σ . Budiž $\{\mathcal{D}_n\}$ libovolná posloupnost dělení intervalu J , klademe opět $\mathcal{D}_n = \{I_1^{(n)}, \dots, I_{k_n}^{(n)}\}$, rovněž funkce $F_k(n; x)$ a $f_{0k_n}(n, x)$ definujeme analogicky jako v první části důkazu. Posloupnost $\{f_{0k_n}(n, x)\}_{n=1}^\infty$ je v důsledku stejnoměrné konvergence integrálu $\int_J H_\sigma(I, x)$ opět cauchyovská ve W -normě, takže odtud plyne i existence limity konvolucí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(I_1^{(n)}, x) * \dots * F(I_{k_n}^{(n)}, x) = G(J, x) \quad (18)$$

s limitní distribuční funkcí $G(J, x)$, zřejmě nezávislou na volbě dělení \mathcal{D}_n . Existuje tedy (BB) -integrál náhodné funkce \mathbf{X} v intervalu J , c. b. d.; $G(J, x)$ je příslušná distribuční funkce.

4. Důsledek. Jak vyplývá z důkazu naší věty, stačí k zaručení stejnoměrné konvergence integrálu (11) již existence (BB) -integrálu náhodné funkce \mathbf{X} v intervalu K . Odtud vyplývá bezprostředně tento zajímavý

Důsledek. Za předpokladu splnění podmínek (a) a (b) je existence integrálu $(BB)\text{-}\int_K \mathbf{X}$ nutnou a postačující podmínkou (BB) -integrability náhodné funkce \mathbf{X} v intervalu K .

Jak jsme si ukázali v [4], § 6, není obecně (BB) -integrabilita důsledkem existence (BB) -integrálu; náhodná funkce uvedená v § 6 práce [4] jako protipříklad nevyhovuje ovšem podmínce (a). Předpoklad (b) však přitom splněn je, neboť všechny příslušné náhodné proměnné mají symetrické zákony rozložení, protože jejich charakteristické funkce jsou vesměs reálné.

Dá se však ukázat, že podmínka (b) není zde podstatná a že ji lze vypustit. Lemma dokázané v odstavci 2 lze totiž bezprostředně rozšířit i na komplexní funkce intervalu a na případ, kdy x probíhá libovolnou množinu v R (viz též [6]). Platí tedy

Věta. Budiž \mathbf{X} náhodná funkce intervalu definovaná v intervalu K , spojitá v \emptyset . Nechť existuje $(BB)\text{-}\int_K \mathbf{X}$. Potom je \mathbf{X} v K (BB) -integrabilní.

Důkaz. Budiž $\psi(I, s)$ příslušná ψ -funkce náhodné funkce \mathbf{X} . Ježto

$$(BB)\text{-}\int_K \mathbf{X} \sim B \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{I_j^{(n)} \in \mathcal{D}_n} X(I_j^{(n)}) \quad (19)$$

pro libovolnou posloupnost $\{\mathcal{D}_n\}$ dělení intervalu K , pro kterou $\nu(\mathcal{D}_n) \rightarrow 0$, a náhodné proměnné $X(I_j^{(n)})$ jsou v důsledku spojitosti funkce \mathbf{X} nekonečně malé (srv. [2], [4]), je nutně $(BB)\text{-}\int_K \mathbf{X} \in \mathfrak{X}$ (viz [2], § 24). Pro každé $s \in R$ tedy existuje konečná limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{I_j^{(n)} \in \mathcal{D}_n} \psi(I_j^{(n)}, s) = \int_K \psi(I, s), \quad (20)$$

a dokonce (srv. [5], věta 3, str. 199) Burkilův integrál (20) konverguje stejnoměrně vzhledem k s v každém konečném intervalu $c \subset R$. Podle našeho lemmatu konverguje tedy takto lokálně stejnoměrně také integrál $\int_J \psi(I, s)$ pro libovolný interval $J \subset K$. Odtud však již vyplývá (BB) -integrabilita funkce \mathbf{X} v K , c. b. d.

Poznámka. Je celkem zřejmé, že také $(BB)\text{-}\int_J \mathbf{X} \in \mathfrak{X}$ pro libovolný interval $J \subset K$, takže neurčitý integrál je pak funkcí typu ID.

5. Závěrečné poznámky. Je zřejmé, že předpoklad (a) ve větě odstavce 3 je zbytečně silný, neboť, jak plyne z Bergströmových výsledků, stačí, aby místo podmínky C_0 — odpovídající předpokladu (a) — splňovaly distribuční funkce $F_K(n, x)$ definované vzorci (12) jenom slabší podmínku C . Tímto případem se však zde již nebudeme zabývat; vrátíme se k němu ostatně na jiném místě při studiu jiných, slabších druhů spojitosti náhodných funkcí intervalu než je spojitost v \emptyset , tak jak jsme si ji zavedli v [4].

Podmínka stejnoměrné konvergence integrálu (11) vyjadřuje, jak jsme se o tom již zmínili, cauchyovskost ve W -normě posloupností funkcí $\{f_{0; n}(n, x)\}$.

Jestliže místo této podmínky použijeme ekvivalentní s ní podmínky vyjádřené tzv. QM -konvergencí posloupností $\{f_{0k_n}(n, x)\}$ (srv. [1], § 9, věta 9.4), dostaneme podmínky (existence Burkillova integrálu funkce $H(I, x) = F(I, x) - E(x)$) a podmínky pro funkce $M_j(I, \eta)$, $j = 1, 2$) zřejmě příbuzné podmínkám věty 15 z [4], resp. analogických existenčních vět odvozených z vět § 25 monografie [2].

LITERATURA

- [1] *H. Bergström*: On the limit theorems for convolutions of distribution functions; Journal für die reine und angewandte Mathematik, 198 (1957), 121–142, (Part I), und 199 (1958), 1–22 (Part II).
- [2] *B. W. Gniedenko, A. N. Kolmogorow*: Rozklady graniczne sum zmiennych losowych niezaleznych, Warszawa 1957.
- [3] *L. A. Ringenber*: The theory of the Burkill integral; Duke Math. Journal, 15 (1948), 239–270.
- [4] *F. Zitek*: Fonctions aleatoires d'intervalles; Czechoslovak Math. Journal, 8 (83), 1958, 583–609.
- [5] *O. Onicescu, G. Mihoc, C. T. Ionescu-Tulcea*: Calculul probabilitatilor si aplicatii, Bucuresti 1956.
- [6] *F. Zitek*: Burkillovy integrály závislé na parametru; Časopis pro pěstování matematiky, 84 (1959), v tisku.

Резюме

ЗАМЕТКА К ТЕОРИИ (BV) -ИНТЕГРАЛА

ФРАНТИШЕК ЗИТЭК (František Zitek), Прага

(Поступило в редакцию 15/II 1958 г.)

Опираясь на результаты Г. Бергштрема (см. [1]), автор выводит одно необходимое и достаточное условие (BV) -интегрируемости случайной функции интервала (см. [4]).

Предположим, что изучаемая случайная функция X удовлетворяет основным условиям (7) (равномерно для $I \subset K$), (= непрерывность в \emptyset на K) и (8) (для всех $\eta: 0 < \eta < \infty$), где $F(I, x)$ — функция распределения случайной величины $X(I)$ и функция $M_1(I, \eta)$ определена в (5). Тогда справедлива следующая

теорема. Случайная функция X (BV) -интегрируема в K тогда и только тогда, когда для любого $\sigma > 0$ интеграл Бэркилла (11) сходится равномерно для $x \in R = (-\infty, \infty)$.

Здесь $H_\sigma(I, x)$ — функция, определенная через (10), (9) и (6). Под равномерной сходимостью интеграла Бэркилла (вещественной) функции $f(I, x)$ мы разумеем, что (1) имеет место равномерно для $x \in R$, или, что выполня-

ется (2) для любых двух разбиений $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ интервала K , если только нормы этих двух разбиений достаточно малы.

Из доказательства нашей теоремы вытекает следующее (см. [4], § 6)

следствие. *Если X удовлетворяет основным условиям (7) и (8), то X (BB) -интегрируема в K тогда и только тогда, когда существует (BB) - $\int_K X$.*

Далее однако указывается, что условие (8) здесь можно опустить, так что если X удовлетворяет (7), то уже из существования (BB) - $\int_K X$ следует и (BB) -интегрируемость X в K .

Résumé

UNE REMARQUE SUR L'INTÉGRALE- (BB)

FRANTIŠEK ZÍTEK, Praha

(Reçu le 15 février 1958)

En s'appuyant sur les résultats obtenus par M. H. BERGSTRÖM (voir [1]), l'auteur établit une condition nécessaire et suffisante d'intégrabilité- (BB) d'une fonction aléatoire d'intervalle (voir [4]).

On suppose que la fonction aléatoire X considérée soit continue en \emptyset sur K (condition (a)) et qu'elle satisfasse à (8) pour tout η , $0 < \eta < \infty$ (condition (b)); la fonction $M_1(I, \eta)$ étant définie par (5) où $F(I, x)$ désigne la fonction de répartition de la variable aléatoire $X(I)$. Dans ces conditions, le théorème suivant a lieu:

Théorème. *La fonction aléatoire d'intervalle X définie dans K y est intégrable- (BB) si et seulement si pour tout $\sigma > 0$ l'intégrale de Burkill (11) converge uniformément par rapport à $x \in R$.*

La fonction $H_\sigma(I, x)$ est définie par (10), (9) et (6). Par la convergence uniforme par rapport à $x \in R = (-\infty, \infty)$ de l'intégrale de Burkill d'une fonction (réelle) d'intervalle $f(I, x)$ on entend le fait que (1) a lieu uniformément par rapport à $x \in R$, ou bien que pour toute paire de partitions $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ de l'intervalle K en question et dont les normes sont suffisamment petites, on a (2).

Comme une conséquence directe de la démonstration de ce théorème on obtient le suivant (cf. [4], § 6)

corollaire. *Sous les conditions (a) et (b), X est intégrable- (BB) dans K si et seulement si l'intégrale (BB) - $\int_K X$ existe.*

Ensuite on montre cependant que la condition (b) n'est point nécessaire et qu'il suffit de (a) seul pour garantir l'équivalence de l'intégrabilité- (BB) de X dans K avec l'existence de l'intégrale en question.