

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Karel Koutský

Poznámka k dvojicím prvočísel s konstantním rozdílem

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 62 (1933), No. 2, 5--7

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/121954>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1933

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

Poznámka k dvojicím prvočísel s konstantním rozdílem.

Napsal Karel Kouřský.

(Došlo 20. února 1932.)

Věta, kterou v této práci chci dokázat, zní:

Prvočísla p , pro něž $p + 2k$ (kdež $k \geq 1$ jest dané celé číslo) jest rovněž prvočíslem, jsou tak řídko rozložena, že v řadě všech prvočísel (srovnaných podle velikosti vzestupně) nelze udati žádnou konstantu $c \geq 1$ (c celé číslo) tak, aby mezi každou skupinou c sousedních prvočísel bylo aspoň jedno prvočíslo s žádanou vlastností.

Jinými slovy: V řadě všech prvočísel (srovnaných podle velikosti vzestupně) vyskytují se libovolně velké úseky, v nichž neleží ani jedno prvočíslo p , pro něž $p + 2k$ jest rovněž prvočíslem.

Důkaz: Východiskem jest tu věta, kterou jsem dokázal v práci: „Zobecnění Brunovy věty o prvočíslech“, kterou jsem nedávno předložil Čes. Akademii věd a umění v Praze. — Věta tato jest:

Existuje-li nekonečně mnoho prvočísel p , pro něž číslo $p + 2k$ (kdež $k \geq 1$ jest dané celé číslo) jest rovněž prvočíslem, potom obě nekonečné řady:

$$\sum_p \frac{1}{p}, \text{ resp. } \sum_p \frac{1}{p + 2k} \quad (1)$$

kdež součty vztahují se na prvočísla z dvojic o konstantním rozdílu $2k$, jsou konvergentní.

Nám se jedná hlavně o první z těchto řad.

Všechna prvočísla srovnaná podle velikosti vzestupně buďtež:

$$2 = p_1 < p_2 < p_3 < \dots \text{ in inf.} \quad (2)$$

Dále pak σ_n nechť jest součet převrátných hodnot těch prvočísel p ležících v intervalu

$$p_{\alpha(n-1)} < p \leq p_{\alpha n}, \quad (3)$$

pro něž $p + 2k$ jest rovněž prvočíslem.

Předpokládáme-li existenci aspoň jednoho prvočísla p s žádanou vlastností mezi každou skupinou c sousedních prvočísel, potom z předešlé nerovnice plyne:

$$\frac{1}{p} \geq \frac{1}{p_{cn}}$$

a tedy i

$$\sigma_n = \sum \frac{1}{p} \geq \frac{1}{p} \geq \frac{1}{p_{cn}}, \quad (4)$$

kdež součet Σ vztahuje se jen na prvočísla s žádanou vlastností, ležící v intervalu (3).

Tu však řada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_n, \quad (5)$$

jsouc totožná s první z řad (1) — což snadno lze nahlédnouti — jest konvergentní. — Podle (4) pak ale i řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_{cn}}, \quad (6)$$

mající vesměs kladné členy, nutně by musela býti konvergentní. Dokáží však, že řada (6) jest divergentní pro každé c .

Je-li $c = 1$, pak řada (6) představuje součet převratných hodnot všech prvočísel a tato řada, jak známo jest divergentní.¹⁾

Budiž tedy $c > 1$. Pro r -té prvočíslu v řadě (2) pro $r > 1$ platí vztah²⁾

$$p_r < a \cdot r \cdot \log r,$$

kdež a jest určitá konstanta. Poněvadž jest $c > 1$, jest jistě též $cn > 1$ a tedy platí

$$p_{cn} < a \cdot cn \log cn,$$

čili

$$\frac{1}{p_{cn}} > \frac{1}{ac} \cdot \frac{1}{n \log cn}. \quad (7)$$

Je-li nyní $u_n = \frac{1}{n \log cn}$, potom řada $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ současně konver-

guje nebo diverguje s řadou $\sum_{t=1}^{\infty} a^t \cdot u_{at}$ pro každé $a > 1$.³⁾ Tu jest:

¹⁾ Landau: Vorlesungen über Zahlentheorie. I. str. 69. věta 114. (Lipsko 1927.)

²⁾ Tamtéž: str. 68., věta 113. $\log r$ jest přirozený logaritmus.

³⁾ Petr: Počet diferenciální, str. 62. Praha 1923.

$$a^t u_{a^t} = \frac{a^t}{a^t \log c \cdot a^t} = \frac{1}{\log c \cdot a^t} > \frac{1}{\log (ac)^t} = \frac{1}{t \log ac}, \quad (8)$$

jelikož: $c > 1, t \geq 1$.

Však řada $\sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{t}$ jest harmonická, o níž jest známo, že jest divergentní. Tedy podle (8) jest i řada $\sum_{t=1}^{\infty} a^t \cdot u_{a^t}$, jakož i řada

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \log cn}$ divergentní, tedy podle (7) též řada (6) jest divergentní, c. b. d.

Tím však přicházíme k rozporu, z něhož plyne věta vyslovená na začátku tohoto pojednání.

*

Note sur les paires de nombres premiers à différence finie.

(Extrait de l'article précédent.)

Démonstration du théorème suivant: Les nombres premiers p tels que $p + 2k$ (ou $k \geq 1$ est un entier donné) soit encore premier, sont si rares que, dans la suite des nombres premiers ordonnés dans l'ordre croissant, on ne peut pas indiquer de nombre entier constant $c \geq 1$ de sorte que dans tout groupe de c nombres premiers voisins il y ait au moins un nombre ayant la propriété demandée.