

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Oldřich Dvořák
O funkcích prostých

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 9--16

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/122639>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1934

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O funkcích prostých.

Oldřich Dvořák.

(Došlo dne 22. VI. 1933.)

Hlavní problém z teorie prostých funkcí je následující:

Jaké jsou nutné a postačující podmínky, kterým musí vyhovovat koeficienty potenční řady

$$f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots + a_n z^n + \dots,$$

aby tato byla prostá v kruhu $|z| < 1$? Analytickou funkci nazýváme prostou, je-li vždy pro $z_1 \neq z_2$ také $f(z_1) \neq f(z_2)$.

Dosud je známo, že je $|a_2| \leq 2$.¹⁾ Pro a_3 dokázal ještě Löwner $|a_3| \leq 3$.²⁾ Obě hranice jsou přesné.

Obecně dokázal Littlewood

$$|a_n| \leq n \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} < en.$$
³⁾

Odhad tento zostril ještě Landau na

$$|a_n| \leq \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\right) en.$$
⁴⁾

Bieberbach vyslovil domněnku, že platí

$$|a_n| \leq n, \quad n \geq 2.$$

Tato domněnka byla skutečně dokázána, pokud koeficienty a_n jsou čísla reálná.⁵⁾

Tato domněnka platí přesně pro prosté funkce hvězdovité. To jsou takové prosté funkce, které zobrazují kruh $|z| = r < 1$ na hvězdu, t. j. křivku, která každým polopaprskem vycházejícím z počátku je protáta právě v jednom bodě.

Analyticky je tato vlastnost vyjádřena podmínkou

$$\Re\left(\frac{z f'(z)}{f(z)}\right) > 0.$$

¹⁾ Bieberbach: *Lehrbuch der Funktionentheorie*, II. díl, s. 80.

²⁾ Löwner: *Mathematische Annalen*, 89, 1923, s. 103.

³⁾ Littlewood: *Proc. of the London math. Soc.* (2), 23, 1925, s. 498.

⁴⁾ Landau: *Mathematische Zeitschrift*, 30, 1929, s. 635.

⁵⁾ Dieudonné: *Comptes Rendus*, 192, 1931, s. 1148—1150. Rogosinski: *Mathematische Zeitschrift*, 35, 1932, s. 93—121.

Všechny prosté funkce jsou hvězdovité v kruhu o poloměru $r < 0,65$.

Zde ukážeme, že pro prosté funkce, splňující v kruhu $|z| < 1$ podmínku

$$\Re\left(\sqrt{\frac{f(z)}{z}}\right) > \frac{1}{2},$$

platí také domněnka Bieberbachova a že tuto vlastnost mají všechny prosté funkce v kruhu o poloměru $r < 0,84$.

Dále dokážeme ještě některé věty o prostých funkcích lichých. Použijeme zde jedné věty, která je speciálním případem vět, které odvodil Carathéodory. Věty tyto týkají se funkcí regulárních v kruhu $|z| < 1$ a nabývajících tam hodnot s pozitivní reálnou částí.⁶⁾

§ 1.

Věta 1. *Budiž funkce*

$$f(z) = \frac{1}{2} + c_1 z + c_2 z^2 + \dots$$

regulární v kruhu $|z| < 1$ a necht' nabývá v něm jen hodnot s pozitivní reálnou částí

$$\Re f(z) > 0.$$

Potom platí

$$|c_n| \leq 1, \quad n \geq 1.$$

Hranice je přesná. Číslo 1 nemůžeme nahradit číslem menším.

Důkaz. Vyjádříme koeficienty c_1, c_2, \dots pomocí reálné a imaginární části funkce $f(z)$ na kružnici $|z| = \rho < 1$.

Položme nejprve

$$f(\rho e^{i\vartheta}) = U(\rho, \vartheta) + iV(\rho, \vartheta),$$

$U(\rho, \vartheta)$ a $V(\rho, \vartheta)$ jsou reálné funkce a dále

$$c_n = c'_n + ic''_n.$$

Po úpravě dostaneme

$$U(\rho, \vartheta) = c'_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n (c'_n \cos n\vartheta - c''_n \sin n\vartheta),$$

$$V(\rho, \vartheta) = c''_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n (c''_n \cos n\vartheta + c'_n \sin n\vartheta).$$

Pokud je ϑ v intervalu $0 \leq \vartheta \leq 2\pi$, konvergují oba rozvoje stejnoměrně, tedy můžeme integrovat a máme

⁶⁾ Pólya-Szegő: Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis, dil I, str. 129, př. 235.

$$c_n = c'_n + ic''_n = \frac{1}{\pi \varrho^n} \int_0^{2\pi} U(\varrho, \vartheta) e^{-in\vartheta} d\vartheta \\ = \frac{i}{\pi \varrho^n} \int_0^{2\pi} V(\varrho, \vartheta) e^{-in\vartheta} d\vartheta.$$

Dále platí

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} c^{in\vartheta} d\vartheta = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Bude tedy

$$|c_n| \leq \frac{1}{\pi \varrho^n} \int_0^{2\pi} U(\varrho, \vartheta) d\vartheta = \frac{1}{\varrho^n};$$

když $\varrho \rightarrow 1$, máme

$$|c_n| \leq 1.$$

Hranice je přesná, je dosažena na př. funkci

$$f(z) = \frac{1}{2} \frac{1+z}{1-z} = \frac{1}{2} + z + z^2 + \dots$$

Poznámka. Uvedená věta platí zřejmě, je-li uvažovaná funkce třebas sudá. Na př.

$$f(z) = \frac{1}{2} \frac{1+z^2}{1-z^2} = \frac{1}{2} + z^2 + z^4 + \dots$$

§ 2.

Budiž

$$f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots$$

regulární a prostá funkce v kruhu $|z| < 1$. Uvažujme nyní pod-
třidu těchto funkcí, pro něž platí

$$\Re \sqrt{\frac{f(z)}{z}} > \frac{1}{2}, \quad |z| < 1. \quad (1)$$

Takové prosté funkce skutečně existují, na př.

$$f(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$$

$$\Re \frac{1}{1-z} > \frac{1}{2}, \quad |z| < 1.$$

Nyní dokážeme dvě věty o prostých funkcích, splňujících podmínku (1).

Věta 2. Vztah (1) platí pro všechny prosté funkce, pokud z leží v kruhu $|z| \leq r < 0,84$.

Důkaz. (1) je zřejmě ekvivalentní s výrazem

$$\left| \sqrt{\frac{f(z)}{z}} - 1 \right| < \left| \sqrt{\frac{f(z)}{z}} \right|$$

nebo jinak psáno

$$\left| 1 - \sqrt{\frac{z}{f(z)}} \right| < 1. \quad (1')$$

Výraz $\sqrt{\frac{z}{f(z)}}$ můžeme však upravit následovně. Je-li funkce $f(z)$ prostá, je, jak známo, prostá i funkce

$$\frac{1}{\sqrt{f(z^2)}} = \frac{1}{z} + b_1 z + b_3 z^3 + \dots + b_{2n-1} z^{2n-1} + \dots \quad (2)$$

Podle Bieberbachovy věty o ploše zde platí

$$|b_1|^2 + 3|b_3|^2 + \dots + (2n-1)|b_{2n-1}|^2 + \dots \leq 1. \quad (3)$$

Upravujeme (2) dále

$$\sqrt{\frac{z^2}{f(z^2)}} = 1 + b_1 z^2 + b_3 z^4 + \dots + b_{2n-1} z^{2n} + \dots$$

Nyní vyměníme z^2 za z a máme

$$\sqrt{\frac{z}{f(z)}} = 1 + b_1 z + b_3 z^2 + \dots + b_{2n-1} z^n + \dots$$

Po dosazení do (1') dostaneme

$$|b_1 z + b_2 z^2 + \dots + b_{2n-1} z^n + \dots| < 1. \quad (1'')$$

Dále použijeme Schwarzovy nerovnosti

$$\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3 + \dots \leq \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots} \sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2 + \dots}$$

$$\alpha_n \geq 0, \quad \beta_n \geq 0.$$

Z výrazu (1'') obdržíme

$$|b_1 z + b_3 z^2 + \dots + b_{2n-1} z^n + \dots| \leq |b_1 z| + |b_3 z^2| + \dots$$

$$\dots + |b_{2n-1} z^n| + \dots$$

$$\leq \sqrt{|b_1|^2 + 3|b_3|^2 + \dots + (2n-1)|b_{2n-1}|^2 + \dots} \times$$

$$\times \sqrt{r^2 + \frac{r^4}{3} + \dots + \frac{r^{2n}}{2n-1} + \dots},$$

kde jsme položili

$$\alpha_n = \sqrt{2n-1} |b_{2n-1}|, \quad \beta_n = \frac{r^n}{\sqrt{2n-1}}$$

Pravá strana se však vzhledem k (3) a k tomu, že pro $r < 1$ platí

$$r \log \frac{1+r}{1-r} = 2 \left(r^2 + \frac{r^4}{3} + \dots + \frac{r^{2n}}{2n-1} + \dots \right).$$

redukuje na výraz

$$\sqrt{\frac{r}{2} \log \frac{1+r}{1-r}}. \quad (4)$$

Je-li nyní

$$r \log \frac{1+r}{1-r} < 2,$$

je tím spíše potom splněn vztah (1''). Hledané r je však v mezích $0,83 < r < 0,84$.

Věta 3. Pro funkce prosté splňující v kruhu $|z| < 1$ podmínku (1) platí

$$|a_n| \leq n, \quad n \geq 2.$$

Důkaz. Funkce $\sqrt{\frac{f(z)}{z}}$ je zřejmě regulární v kruhu $|z| < 1$ a její rozvoj je následující

$$\sqrt{\frac{f(z)}{z}} = 1 + \frac{1}{2}a_2z - \frac{1}{8}(a_2^2 - 4a_3)z^2 + \dots \quad (5)$$

nebo jinak psáno

$$\sqrt{\frac{f(z)}{z}} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a_2z - \frac{1}{8}(a_2^2 - 4a_3)z^2 + \dots$$

Platí tedy za předpokladu (1)

$$\Re \left(\sqrt{\frac{f(z)}{z}} - \frac{1}{2} \right) > 0,$$

a s použitím věty (1)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}a_2 &\leq 1, & |a_2| &\leq 2, \\ |a_2^2 - 4a_3| &\leq 8, & 4|a_3| &\leq 8 + |a_2|^2 \leq 12, & |a_3| &\leq 3. \end{aligned}$$

Obecně:

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + a_2z + a_3z^2 + \dots + a_{n+1}z^n + \dots} &= \\ &= 1 + c_1z + c_2z^2 + \dots + c_nz^n + \dots \\ 1 + a_2z + a_3z^2 + \dots + a_{n+1}z^n + \dots &= \\ &= (1 + c_1z + c_2z^2 + \dots + c_nz^n + \dots)^2. \end{aligned}$$

Srovnáním členů při z^n obdržíme

$$\begin{aligned}
 n \text{ sudé } a_{n+1} &= 2c_n + 2c_1c_{n-1} + \dots + c_n^2, \\
 n \text{ liché } a_{n+1} &= 2c_n + 2c_1c_{n-1} + \dots + \frac{2c_{n-1}}{2} \frac{c_{n+1}}{2}.
 \end{aligned}
 \tag{6}$$

Podle věty (1) platí pro každé n , že $|c_n| \leq 1$. Bude tedy: n sudé, členů je $\frac{n}{2} + 1$, poslední ≤ 1 , kdežto předcházející ≤ 2 , co do absolutní hodnoty. Z toho plyne

$$|a_{n+1}| \leq 2 \frac{n}{2} + 1 = n + 1,$$

n liché, členů je $\frac{n+1}{2}$ a každý ≤ 2 , co do absolutní hodnoty

$$|a_{n+1}| \leq 2 \frac{n+1}{2} = n + 1.$$

Tedy obecně

$$|a_n| \leq n, \quad n \geq 2. \tag{7}$$

Věty (2) a (3) podávají nám vlastně jakýsi příspěvek k domněnce Bieberbachově, (7) platí přesně, jak bylo již uvedeno, pro funkce hvězdovité.

Každá funkce prostá je však hvězdovitá v jistém kruhu o poloměru

$$r \leq 0,65.$$

Pro funkce prosté splňující (1) platí přesně (7). Hranice je dosažena uvedenou již funkcí

$$f(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$$

a každá funkce prostá splňuje (1) v kruhu o poloměru

$$r < 0,84.$$

§ 3.

Věta 4. *Jestliže pro lichou prostou funkci*

$$f_1(z) = z + c_3z^3 + c_5z^5 + \dots$$

platí

$$|c_n| \leq 1,$$

potom pro prostou funkci

$$[f_1(z^{\frac{1}{2}})]^2 = f(z) = z + a_2z^2 + a_3z^3 + \dots$$

platí

$$|a_n| \leq n.$$

Důkaz. Funkce $\sqrt{f(z^2)}$ je, jak známo, prostá a lichá

$$f_1(z) = \sqrt{f(z^2)} = z + c_3 z^3 + c_5 z^5 + \dots$$

Uvažujme nyní funkci

$$\sqrt{\frac{f(z^2)}{z^2}} = 1 + c_3 z^2 + c_5 z^4 + \dots + c_{2n+1} z^{2n} + \dots$$

Z toho plyne

$$1 + a_2 z^2 + a_3 z^4 + \dots + a_{n+1} z^{2n} + \dots = (1 + c_3 z^2 + \dots + c_{2n+1} z^{2n} + \dots)^2.$$

Obdržíme zde úplně analogické formule jak ve výrazech (6) a z nich plyne

$$|a_n| \leq n.$$

Věta 5. Platí-li pro lichou funkci prostou v kruhu jednotkovém

$$\Re \left(\frac{f(z)}{z} \right) > \frac{1}{2}, \quad |z| < 1, \quad (8)$$

potom pro její koeficienty platí

$$|c_n| \leq 1.$$

Důkaz. Důkaz plyne ihned z věty (1), aplikujeme-li ji na sudou funkci tvaru

$$\frac{f(z)}{z} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + c_3 z^2 + c_5 z^4 + \dots,$$

Věta 6. Všechny prosté funkce liché splňují požadavek (8) v kruhu o poloměru

$$r < 0,92.$$

Důkaz. Postupujeme úplně stejně jako ve větě (2).

(8) je vyjádřeno vztahem

$$\left| 1 - \frac{z}{f(z)} \right| < 1. \quad (9)$$

Dále je

$$\frac{z}{f(z)} = z \left(\frac{1}{z} + b_1 z + b_3 z^3 + \dots \right),$$

kde

$$|b_1|^2 + 3|b_3|^2 + \dots + (2n-1)|b_{2n-1}|^2 + \dots \leq 1.$$

Po dosazení do (9) vidíme, že musí být splněna nerovnost

$$|b_1 z^2 + b_3 z^4 + \dots + b_{2n-1} z^{2n} + \dots| < 1. \quad (9')$$

Tento výraz liší se však od vztahu (1'') jen tím, že místo z^n je zde všude z^{2n} .

(9') je tedy splněno vždy, je-li splněna nerovnost

$$r^2 \log \frac{1+r^2}{1-r^2} < 2.$$

Z této nerovnosti plyne pak udaný odhad.

Poznámka. Z vět (2) a (3) plynou o něco málo ostřejší odhady pro a_4 a a_5 , než vyplývají z odhadu Littlewoodova a Landauova.

Neboť provedeme-li odhad ve větě (2) až po jisté pevné $r < 1$, pak plyne z vět (1) a (3)

$$|a_n| \leq \frac{n}{r^{n-1}}.$$

Je tedy

$$|a_4| < \frac{4}{0,83^3}, \quad |a_5| < \frac{5}{0,83^4}.$$

Ke konci jest mojí milou povinností poděkovati p. prof. dr. Kösslerovi za některé pokyny a zájem, který projevil o tuto práci, a rovněž tak p. prof. dr. Jarníkovi za některá upozornění.

*

Sur les fonctions univalentes.

(Extrait de l'article précédent.)

Étant donnée une fonction holomorphe univalente dans le cercle unité

$$f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots,$$

l'auteur démontre: Si pour la fonction

$$\varphi(z) = \sqrt{\frac{f(z)}{z}}$$

est

$$\Re \sqrt{\frac{f(z)}{z}} > \frac{1}{2}, \quad |z| < 1,$$

on a

$$|a_n| \leq n.$$