

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Karel Zahradník

Příspěvek ku teorii Descartes-ova listu

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 33 (1904), No. 5, 481--500

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/123518>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1904

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

Príspevek ku theorii Descartes-ova listu.

Podává

Dr. Karel Zahradník,
professor české vysoké školy technické v Brně.

1. Rovnice Descartes-ova listu*) jest

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0,$$

aneb, užijeme-li racionálního parametru u daného relací $y = ux$,

$$(1) \quad \begin{aligned} x &= \frac{3au}{1+u^3}, \\ y &= \frac{3au^2}{1+u^3}, \end{aligned}$$

kdež význam parametru u je patrný.

Tři body listu u_1, u_2, u_3 leží na přímce, vyhovují-li parametry jejich relaci

$$(2) \quad u_1 u_2 u_3 = -1.$$

Splyne-li bod u_2 s bodem u_3 , platí $u_2 = u_3 = u$, a relace (2) přejde ve

$$(3) \quad u_1 u^2 = -1,$$

relaci to mezi parametrem bodu dotyku u přímky s listem Descartes-ovým a příslušným mu bodem tangenciálním u_1 .

Jsou-li u', u'' kořeny rovnice (3), máme

*) O této křivce viz historické poznámky Dr. G. Loria, *Spezielle algeb. und transc. ebene Curven, Theorie und Geschichte*. Překlad F. Schütte-ho, Lipsko 1902. Ze svých prací uvádím: *Zur Theorie der Curven dritter Ordnung und vierter Classe*. Zprávy o zasedání učené společnosti, Praha 1872. O skupinách bodů dotýčných na listu Descartesové. *Časopis pro pěst. mathem. a fys.* roč. XXIV. pag. 282.

$$(4) \quad u' + u'' = 0, \quad u'u'' = \frac{1}{u_1}.$$

Prvá z rovnic (4) praví, že body dotyku tečen vedených z bodu listu jsou ve vztahu výměnlivém — involutorním.

Píšeme-li $\overline{Ou'} = U'$, $\overline{Ou''} = U''$, můžeme tuto rovnici psáti

$$(XYU'U'') = -1,$$

t. j. body dotyku sdružené k témuž tangenciálnímu bodu promítají se z dvojného bodu v paprscích, jež harmonicky dělí tečny dvojného bodu.

Dále vysvětluje z téže rovnice, že, leží-li jeden bod dotyku u' na smyčce, leží druhý bod dotyku u'' na ostatní části křivky, a z rovnice (3) jde, že body dotyku u' , u'' tečen bodu u_1 jsou reálné, je-li $u_1 < 0$, t. j. neleží-li bod na smyčce listu.

2. Kdyby všechny tři průsečíky přímky s listem splývaly, bylo by $u_1 = u_2 = u_3 = u$; přímka byla by tečnou inflexní v bodě u , jež je bodem inflexním listu a hodnoty parametru jeho plynou z rovnice

$$(5) \quad u^3 = -1.$$

Má tedy Descartes-ův list jeden bod inflexní reálný, připadající parametru $u_1 = -1$ a dva body inflexní imaginární o parametrech

$$u_2 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad u_3 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

Tyto body inflexní leží na přímce, neb součin parametrů jejich jest $= -1$.

3. Body úběžné křivky obdržíme, kladouce

$$u^3 + 1 = 0,$$

ale to je rovnice (5), z kteréž jsme určili parametry bodů inflexních. Z toho vyplývá, že body úběžné jsou inflexními body Descartes-ova listu, a tudíž jsou i tečny inflexní jeho asymptotami.

O kvadratické involuci bodů sdružených u' , u'' .

4. Rovnice spojnice dvou bodů u' , u'' křivky jest

$$[u'^2 u''^2 - (u' + u'')]x + [1 - u'u''(u' + u'')]y + 3au'u'' = 0.$$

Mají-li ty body společný tangenciální bod u_1 , platí rovnice (4), a tím je rovnice spojnice bodů u' , u'' sdružených k bodu u_1

$$(6) \quad S_{u_1} \equiv x + u_1^2 y + 3au_1 = 0.$$

Opíše-li bod u_1 Descartes-ův list, obaluje sdružená mu přímka S_{u_1} kuželosečku, jež se jmenuje Weyr-Cayley-ova kuželosečka kvadratické involuce bodové na listu dané rovnicí (3). Rovnice této kuželosečky v souřadnicích tangenciálních jsou

$$\xi = -\frac{1}{3a} \cdot \frac{1}{u_1},$$

$$\eta = \frac{1}{3a} \cdot u_1;$$

rovnici její v souřadnicích bodových obdržíme z rovnice (5) tím, že diskriminant levé strany klademe $= 0$. Obdržíme tak

$$(7) \quad xy - \left(\frac{3a}{2}\right)^2 = 0.$$

Zmíněná kuželosečka jest rovnostranná hyperbola, jejíž asymptoty jsou tečnami dvojného bodu listu. Osa symetrie $x = y$ listu je reálnou osou hyperboly, kteráž se dotýká smyčky listu v bodě $\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$ příslušném parametru $u = 1$.

Parametry průseků Descartes-ova listu s kuželosečkou involuce obdržíme, vložíme-li do rovnice (7) za x , y hodnoty z (1). Tak obdržíme

$$(u^3 - 1)^2 = 0.$$

Je-li α imaginární třetí kořen z jedničky, jsou

$$u = 1, \quad \alpha, \quad \alpha^2$$

hledané parametry průseků, a to každý dvakrát, t. j. hyper-

bola kvadratické involuce (3) na Descartes-ově listu dotýká se ho třikrát.

Je-li $u_1 = u_2 = u_3 = u$, obdržíme z relace (2), kteráž zde přechází v $u^3 = -1$, parametry bodů obratu (odst. 2.) listu

$$u = -1, \quad -\alpha, \quad -\alpha^2.$$

Body dotyku Weyr-ovy kuželosečky kvadratické involuce s Descartes-ovým listem jsou dle toho sdružené body*) bodům obratu listu.

Souřadnice bodu dotyku tečny S_{u_1} jsou

$$(8) \quad \begin{aligned} x_1 &= -\frac{3a}{2} \cdot u_1, \\ y_1 &= -\frac{3a}{2} \cdot \frac{1}{u_1}, \end{aligned}$$

Rovnice (8) vyjadřuje současně parametricky kuželosečku involuce (7) v souřadnicích bodových.

5. Označíme-li S_h spojnicí bodů sdružených ku bodu u_h , a podobně $S^{(h)}$ pro bod $u^{(h)}$, můžeme říci:

Přímky S' , S'' jsou rovnoběžné, jsou-li body u' , u'' sdružené body ku u_1 . Je totiž vzhledem k rovnicím (4)

$$\operatorname{tg}(S'S'') = 0.$$

6. Ježto přímka $S_{u_1} \equiv S_1 \equiv \overline{u'u''}$ protíná Descartes-ův list ještě v bodě v , platí tudíž

$$u'u''v = -1$$

a vzhledem k rovnicím (4) jest

$$(9) \quad v + u_1 = 0.$$

Bod u_1 i průsek v přímky $\overline{u'u''}$ s listem tvoří dvojinu bodů téže kvadratické involuce, ku které dvojina bodů u' , u'' spadá; dle toho je spojnice $\overline{u_1v}$ tečnou kuželosečky involuce (7).

Společný tangencialní bod bodů u_1 , v budiž t ; parametr jeho je dán rovnicí

*) Srovnej Dr. Em. Weyr, O involucích na křivkách třetího stupně. Casopis pro pěst. mathem. a fys. IX. pag. 145.

$$t = -\frac{1}{u_1^2}.$$

Průsek spojnice $\overline{u_1v}$ s listem budiž bod w , tudíž je

$$u_1vw = -1,$$

a jelikož platí

$$u + v = 0,$$

jest

$$w = \frac{1}{u_1^2},$$

tudíž

$$t + w = 0.$$

Body t, w tvoří dle toho dvojinnu kvadratické involuce (3). Při bodech t, w mohli bychom stejně postupovati jako při bodech u', u'' neb u_1, v atd.

7. Budiž bod v_1 na spojnici S_1 harmonicky sdružen s bodem v vzhledem k dvojinně bodů u', u'' . Promítáme-li body u', u'', v, v_1 z dvojného bodu O listu, obdržíme

$$O(u'u''vv_1) = -1,$$

t. j.

$$\frac{u' - v}{u'' - v} : \frac{u' - v_1}{u'' - v_1} = -1,$$

aneb

$$(10) \quad u'u'' - \frac{1}{2}(u' + u'')(v + v_1) + vv_1 = 0.$$

Vzhledem k rovnicím (4) obdržíme z rovnice (10)

$$(11) \quad v_1 = \frac{1}{v^2},$$

aneb, hledíme-li k rovnici (9),

$$v_1 = \frac{1}{u_1^2}.$$

Rovnice paprsku*) Ov_1 je tudíž

*) $Ov_1 \equiv Ow$, w leží na listu, v_1 na S_1 , $t = -w = -v_1$ a jak z dalšího vysvítá, jest $w \equiv \tau$.

$$y = \frac{1}{u_1^2} x^2$$

a souřadnice bodu v_1 , průseku to paprsku Ov_1 se spojnicí S_1 , jsou

$$x = -\frac{3a}{2} u_1,$$

$$y = -\frac{3a}{2} \cdot \frac{1}{u_1}.$$

Srovnáme-li tento výsledek s rovnicemi (8), shledáváme ihned, že bod v_1 jest bodem dotyku tečny $S_1 \equiv \overline{u'u''}$ kuželosečky involuční, t. j. *bod dotyku tečny $\overline{u'u''}$ involuční kuželosečky je harmonicky sdružený bod s bodem v vzhledem k bodům u' , u'' .*

Z relace (11) vychází

$$v^2(-v_1) = -1,$$

t. j. bod t o parametru $-v_1$ jest tangenciálním bodem bodů v a u_1 (odst. 6.); můžeme tudíž říci: *bod v_1 leží na paprsku harmonicky sdruženém s paprskem Ot vzhledem na tečny dvojného bodu.*

8. Bod v_1 neleží na listu, avšak paprsek Ov_1 protíná list v bodě t , pro nějž platí (rov. 11)

$$v^2\tau = 1;$$

jest totiž směrnice přímky Ov_1 , označená krátce v_1 , současně parametr bodu τ . Spojnice $\overline{u_1v}$ protíná Descartes-ův list v bodě w , pročež platí

$$u_1vw = -1$$

a ježto

$$u_1 + v = 0,$$

máme

$$v^2w = 1.$$

Jest tedy bod $w \equiv s$ bodem τ , t. j. paprsek $\overline{Ov_1}$ a spojnice $\overline{u_1v}$ protínají se v témž bodě na Descartes-ově listu. Z toho plyne i sestrogení bodu v_1 . Třetí průsek w spojnice $\overline{u_1v}$ s listem spojíme s dvojným bodem O . Průsek $\overline{Ow} \cdot \overline{u'u''}$ je hledaný bod v_1 .

9. Spojnice $\overline{u_1 v}$ má rovnici

$$u_1^3 x + y - 3au_1^2 = 0,$$

která substitucí

$$u_1^2 = -\frac{1}{\tau}$$

přechází ve

$$S_\tau \equiv x + \tau^2 y + 3a\tau = 0,$$

což jest i z odst. 5. patrné. Souřadnice bodu dotyku tečny S_τ s kuželosečkou involuční jsou

$$(12) \quad x_2 = \frac{3a}{2} \frac{1}{u_1^2}, \quad y_2 = \frac{3a}{2} u_1^2.$$

Z rovnic (8) a (12) vychází

$$x_2 - x_1 = \frac{3a}{2} \frac{1 + u_1^3}{u_1^2} = \frac{3a}{2} \cdot \frac{3a}{y},$$

$$y_2 - y_1 = \frac{3a}{2} \frac{1 + u_1^3}{u_1} = \frac{3a}{2} \cdot \frac{3a}{x},$$

tedy

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y}{x},$$

t. j. spojnice bodů dotyku tečen $\overline{u'u''}$ a $\overline{u_1 v}$ s kuželosečkou involuční jest rovnoběžná se spojnicí bodu u_1 s dvojným bodem listu.

Další relace mezi bodem u_1 a přímkou S_{u_1} .

10. Vzdálenost q_1 bodu u_1 od přímky S_{u_1} jest

$$q_1 = \frac{6au}{\sqrt{1 + u^4}},$$

podobně vzdálenost q_0 bodu dvojného od přímky S_{u_1}

$$q_0 = \frac{3au}{\sqrt{1 + u^4}},$$

tak že platí

$$(13) \quad q_1 = 2q_0.$$

Spojnice $\bar{u}_1 O$ protíná přímkou S_{u_1} v bodě M , a z podobnosti trojúhelníků plyne

$$u_1 O = OM.$$

Bod M je symmetrickým bodem bodu u_1 vzhledem ku bodu dvojnému listu.

Hledáme-li střed délky $\overline{u'u''}$ sdružené k bodu u_1 , obdržíme

$$(14) \quad \begin{aligned} x_1 &= \frac{3a}{2} \left(\frac{u'}{1+u'^3} + \frac{u''}{1+u''^3} \right) = -\frac{3au_1}{1+u_1^3}, \\ y_1 &= \frac{3a}{2} \left(\frac{u''^2}{1+u''^3} + \frac{u'^2}{1+u'^3} \right) = -\frac{3au_1}{1+u_1^3}, \end{aligned}$$

použijeme-li vztahu (4). Střed délky $\overline{u'u''}$ sdružené k bodu u_1 , je bod symmetrický tomuto bodu vzhledem k dvojnému bodu. Můžeme tedy říci: *spojnice $\bar{u}_1 O$ půlí vzdálenost bodů sdružených. Místo středů vzdáleností bodů sdružených k bodům listu Descartes-ova jest opět též list Descartes-ův, pouze pootočený okolo dvojného bodu o 180° .*

11. V odst. 10. našli jsme, že

$$q_1 = \frac{6au_1}{\sqrt{1+u_1^4}},$$

a pro vzdálenost Ov_1 bodu dotyku v_1 přímky S_1 s involuční kuželosečkou našli bychom

$$Ov_1 = \frac{3a}{2} \cdot \frac{\sqrt{1+u_1^4}}{u_1},$$

tudíž

$$q_1 \cdot \overline{Ov_1} = (3a)^2.$$

Relace této lze při konstrukci vhodně upotřebiti.

12. Na každé přímce vedené určitým bodem k listu a protínající list v dalších dvou bodech u_1, u_2 máme bod půlčí délku $\overline{u_1 u_2}$.

Souřadnice toho bodu jsou

$$x_1 = \frac{3a}{2} \frac{A}{C}, \quad y_1 = \frac{3a}{2} \frac{B}{C},$$

kdež jest, píšeme-li

$$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{1}{u}, & t &= u_1 + u_2, \\ A &= \Sigma u + \Sigma u^3 u = -2\alpha^2 + t + \alpha t^2, \\ B &= \Sigma u^2 + \Sigma u^3 u^2 = -2\alpha + \alpha^2 t + t^2, \\ C &= 1 + \Sigma u^3 + \Sigma u^3 u^3 = 1 + \alpha^2 - 3\alpha t + t^3. \end{aligned}$$

Jest tedy místo středů délek $\overline{u_1 u_2}$ pro všechny přímky jdoucí bodem u opět racionální křivka stupně třetího, kteráž přechází v Descartesův list, stejně položený s daným listem, při němž místo a třeba vzíti $\frac{a}{2}$, je-li $\alpha = 0$, t. j. $u = \infty$, což jest samozřejmé.

13. Bod u_1 tvoří se svými sdruženými body u' , u'' trojúhelník u, u', u'' ; jsou-li x_2, y_2 souřadnice těžiště tohoto trojúhelníka, jest

$$\begin{aligned} x_2 &= a \sum \frac{u}{1+u^3} = a \frac{A_1}{C_1}, \\ &\sum \frac{u^2}{1+u^3} = a \frac{B_1}{C_1}. \end{aligned}$$

Vzhledem k rovnicím (4) odstavce 1. jest

$$\begin{aligned} u_1 + u' + u'' &= u_1, \\ u_1(u' + u'') + u'u'' &= \frac{1}{u_1}, \\ u_1 u' u'' &= 1, \end{aligned}$$

tedy

$$\begin{aligned} A_1 &= -\frac{1+u_1^3}{u_1^2}, \\ B_1 &= -\frac{1+u_1^3}{u_1}, \\ C_1 &= \frac{(u_1^3+1)^2}{u_1^2}, \end{aligned}$$

pročež

$$(15) \quad \begin{aligned} x_2 &= -\frac{a u_1}{1+u_1^3}, \\ y_2 &= -\frac{a u_1^2}{1+u_1^3}. \end{aligned}$$

Místo těžišť trojúhelníků u, u', u'' jest opět list Descartes-ův, a to zmenšený v poměru 1:3 a pootočený o 180° okolo dvojného bodu.

Přímka a list.

14. Přímka $\xi | \eta$ protíná list v bodech u_1, u_2, u_3 , jež vyhovují relacím

$$(16) \quad (u)_1 = -3a\eta, \quad (u)_2 = 3a\xi, \quad (u)_3 = -1.$$

Bod středních vzdáleností průseků má souřadnice

$$x_2 = a \sum_{h=1}^3 \frac{u_h}{1 + u_h^3} = \frac{A_2}{C_2},$$

$$y_2 = a \sum_{h=1}^3 \frac{u_h^2}{1 + u_h^3} = \frac{B_2}{C_2}.$$

Vzhledem k horním relacím obdržíme

$$(17) \quad x_3 = \frac{\xi (a\eta^2 - \xi)}{\xi^3 - \eta^3},$$

$$y_3 = \frac{\eta (\eta - a\xi^2)}{\xi^3 - \eta^3}.$$

Leží-li bod $x_3 | y_3$ na reálné asymptotě listu, jest v platnosti

$$(18) \quad a(\xi^2 + \eta^2) - (\xi + \eta) = 0,$$

aneb v souřadnicích bodových

$$(19) \quad x^2 + y^2 - 2xy - 4a(a + y) = 0.$$

Je-li tedy přímka $\xi | \eta$ tečnou paraboly (19), leží bod středních vzdáleností průseků přímky s listem na reálné asymptotě listu.

Je-li přímka $\xi | \eta$ tečnou paraboly $a\eta^2 - \xi = 0$, leží bod středních vzdáleností průseků na ose Y , tangentě to dvojného bodu. Podobně leží bod ten na ose X , t. j. na druhé tangentě dvojného bodu listu, je-li $\xi | \eta$ tečnou paraboly $a\xi^2 - \eta = 0$.

Rovnice tečny.

15. Z rovnice spojnice dvou bodů (odst. 4.) plyne rovnice tečny bodu u , klademe-li

$$u' = u'' = u.$$

Tak obdržíme

$$(20) \quad u(u^3 - 2)x + (1 - 2u^3)y + 3au^2 = 0.$$

Jsou-li $x | y$ souřadnice určitého bodu v rovině listu, najdeme parametry bodů dotyku tečen vedených z bodu $x | y$ na list jako kořeny rovnice (20); a ježto jest tato rovnice vzhledem k parametru u stupně čtvrtého, je patrné, že z každého bodu $x | y$ můžeme na list vésti čtyři tečny, t. j. Descartes-ův list je křivka čtvrté třídy.

Vložíme-li do rovnice tečny parametry bodů úběžných listu, obdržíme rovnice asymptot listu a to

$$(21) \quad \begin{aligned} x + y + a &= 0, \\ (1 - i\sqrt{3})x + (1 + i\sqrt{3})y - 2a &= 0, \\ (1 + i\sqrt{3})x + (1 - i\sqrt{3})y - 2a &= 0. \end{aligned}$$

Průsek imaginárných asymptot jest reálný bod ($a | a$), těžiště trojúhelníka asymptot pak leží ve dvojném bodě listu.

O průsecích kruhu s Descartes-ovým listem.

16. Parametry průseků kruhu s Descartes-ovým listem obdržíme vložením hodnot pro x, y z (1) do rovnice kruhu

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + m^2 = 0.$$

Tím obdržíme rovnici šestého stupně vzhledem k u , odpovídající šesti průsekům kruhu s Descartes-ovým listem, totiž

$$(22) \quad \begin{aligned} m^2u^6 - 6a\beta u^5 + 3a(3a - 2\alpha)u^4 - 2m^2u^3 \\ + 3a(3a - 2\beta)u^2 - 6\alpha\alpha u + m^2 = 0. \end{aligned}$$

Ježto již tři body kruh úplně určují, musí mezi parametry průseků existovati tři relace, z nichž lze vypočítati parametry ostatních tří průseků. Tyto relace jsou

$$(23) \quad \begin{aligned} \Sigma u_1 - \Sigma u_1 u_2 + \Sigma u_1 u_2 u_3 u_4 - \Sigma u_1 u_2 u_3 u_4 u_5 &= 0, \\ \Sigma u_1 u_2 u_3 &= 0, \\ u_1 u_2 u_3 u_4 u_5 u_6 &= 1. \end{aligned}$$

Chceme-li naléztí podmínku, kdy čtyři body u_1, u_2, u_3, u_4 leží na kruhu, třeba z rovnice (23) vyloučítí $(u_5 + u_6), u_5 u_6$ jako neznámé.

V následujícím budeme předpokládati, že kruh probíhá dvojným bodem Descartes-ova listu, t. j. počátkem souřadnic. Dle toho bude $m^2 = 0$, tudíž $u_5 = 0, u_6 = \infty$, a rovnice (22) přejde ve

$$(24) \quad \beta u^4 + \left(\alpha - \frac{3a}{2}\right) u^3 + \left(\beta - \frac{3a}{2}\right) u + \alpha = 0,$$

z níž vycházejí vztahy

$$(25) \quad \begin{aligned} \Sigma u_1 &= \frac{3a}{2\beta} - \frac{\alpha}{\beta}, \\ \Sigma u_1 u_2 &= 0, \\ \Sigma u_1 u_2 u_3 &= \frac{3a}{2\beta} - 1, \\ \Sigma u_1 u_2 u_3 u_4 &= \frac{\alpha}{\beta}, \end{aligned}$$

kdež se vztahuje součet na kořeny rovnice (24).

Z rovnic (25) plyne

$$(26) \quad \begin{aligned} \Sigma u_1 - \Sigma u_1 u_2 u_3 + \Sigma u_1 u_2 u_3 u_4 &= 1, \\ \Sigma u_1 u_2 &= 0. \end{aligned}$$

Vyloučíme-li z těch rovnic bod u_4 a značíme-li $(u)_h$ kombinace h -tého stupně parametrů tří bodů u_1, u_2, u_3 , máme

$$\left| \begin{array}{cc} 1 + (u)_1 - (u)_3, & 1 - (u)_2 + (u)_3 \\ (u)_2, & (u)_1 \end{array} \right| = 0$$

čili

$$(27) \quad [(u)_1 + (u)_2][1 + (u)_3] = (u)_1^2 + (u)_2^2.$$

Rovnice tato vyjadřuje podmínku, kdy tři body Descartes-ova listu leží na kruhu jdoucím dvojným bodem listu.

17. Dvojný bodů kvadratické involuce dané rovnicí (3) a jí sdružené body leží tehdy na kruhu jdoucím počátkem sou-

řadnic, vyhovují li parametry těch bodů rovnici (27). Dle toho obdržíme

$$(28) \quad u^4 - 2u^3 - 2u + 1 = 0.$$

Existují tudíž čtyři body u_h ($h = 1, 2, 3, 4$), které i se sdruženými jim body styku u'_h, u''_h leží na kruhu jdoucím dvojným bodem listu. Jelikož parametry u_h těch bodů vyhovují rovnicím (26), obdržíme vlastnost, že tyto čtyři body u_h leží opět na kruhu, jenž prochází dvojným bodem Descartes-ova listu. Z rovnic (25) a (28) obdržíme souřadnice středu tohoto kruhu

$$\alpha = \frac{a}{2}, \quad \beta = \frac{a}{2},$$

a jelikož jest $m^2 = 0$, plyne, že poloměr toho kruhu $= \frac{a}{\sqrt{2}}$.

18. Hledáme-li rovnici kruhu, jenž prochází involutorní dvojinou u', u'' na Descartes-ově listu a dvojným bodem listu, obdržíme vzhledem k

$$u' + u'' = 0, \quad u'u'' = \frac{1}{u}$$

z rovnic (25) při $u' = u_3, u'' = u_4$

$$u_1 + u_2 = \frac{3a}{2\beta} - \frac{\alpha}{\beta},$$

$$u_1 u_2 + \frac{1}{u} = 0,$$

$$\frac{u_1 + u_2}{u} = \frac{3a}{2\beta} - 1,$$

$$\frac{u_1 u_2}{u} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

Z rovnice druhé a čtvrté máme

$$\frac{\alpha}{\beta} = -\frac{1}{u^3}$$

a z první rovnice a třetí vzhledem na předcházející rovnici nabudeme

$$\beta = \frac{3au^2(u-1)}{2(u^3+1)},$$

tím

$$\alpha = -\frac{3a(u-1)}{2(u^3+1)}$$

jakožto souřadnice středu kruhu hledaného, jehož poloměr

$$= \frac{3a}{2} \cdot \frac{u-1}{u^3+1} \sqrt{u^4+1}.$$

Geometrické místo středů (α, β) kruhů opsaných trojúhelníkům z dvojiny kvadratické involuce (3) na Descartes-ově listu a jeho dvojného bodu je tedy racionální křivka třetího stupně. Pro souřadnice bodu u listu a souřadnice středu kruhu příslušné involutorní dvojiny je v platnosti relace

$$\frac{x}{4\alpha} + \frac{y}{4\beta} + 1 = 0.$$

0 křivce harmonicky sdružené.

19. Každá přímka jdoucí dvojným bodem křivky protíná křivku v dalším bodě A a reálnou její asymptotu v bodě B . Určme na každé takové přímce bod C , aby bylo $(ABOC) = -1$, t. j. harmonicky sdružený s dvojným bodem O vzhledem k dvojině A, B . Jsou-li ξ, η souřadnice bodu C , x_1, y_1 souřadnice bodu B , máme

$$\frac{2}{\xi} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x_1} = \frac{1+u^3}{3au} - \frac{1+u}{a},$$

$$\frac{2}{\eta} = \frac{1}{y} + \frac{1}{y_1} = \frac{1+u^3}{3au^2} - \frac{1+u}{au},$$

tudíž jest

$$(29) \quad \xi = \frac{6au}{(1+u)(u^2-4u+1)},$$

$$\eta = u\xi.$$

Křivka tato je racionální třetího stupně a čtvrté třídy, má veškeré asymptoty reálné, což již z konstrukce jest patrné.

0 harmonických bodech a tečnách Descartes-ova listu.

20. Každý kruh jdoucí dvojným bodem Descartes-ova listu protíná list mimo v dvojném bodě ještě ve čtyřech bodech,

jichž parametry plynou z rovnice (24). Avšak čtyři body, jichž parametry jsou kořeny bikvadratické rovnice

$$A_0 u^4 + 4A_1 u^3 + 6A_2 u^2 + 4A_3 u + A_4 = 0,$$

jsou harmonické, je-li v platnosti

$$(30) \quad \begin{vmatrix} A_0 & A_1 & A_2 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ A_2 & A_3 & A_4 \end{vmatrix} = 0.$$

V našem případě jest

$$A_0 = \beta, \quad A_1 = \frac{\alpha}{4} - \frac{3a}{8}, \quad A_2 = 0, \\ A_3 = \frac{\beta}{4} - \frac{3a}{8}, \quad A_4 = \alpha.$$

Podmínka, aby kruh protínal list ve čtyřech bodech harmonických (nepřehlížeje k dvojnému bodu), je tudíž

$$\begin{vmatrix} \beta & \frac{\alpha}{4} - \frac{3}{8}a & 0 \\ \frac{\alpha}{4} - \frac{3}{8}a & 0 & \frac{\beta}{4} - \frac{3}{8}a \\ 0 & \frac{\beta}{4} - \frac{3}{8}a & \alpha \end{vmatrix} = 0$$

čili

$$(31) \quad \beta \left(\frac{\beta}{4} - \frac{3}{8}a \right)^2 + \alpha \left(\frac{\alpha}{4} - \frac{3}{8}a \right)^2 = 0.$$

21. Parametry dotýčných bodů tečen vedených z bodu (xy) na list plynou z rovnice tečny (20), již můžeme psát ve tvaru

$$xu^4 - 2yu^3 + 3au^2 - 2xu + y = 0.$$

Zde jest

$$A_0 = x, \quad A_1 = -\frac{y}{2}, \quad A_2 = \frac{a}{2}, \quad A_3 = -\frac{x}{2}, \quad A_4 = y.$$

Podmínka, aby tečny z bodu (xy) na list tvořily skupinu čtyř harmonických paprsků, jest v tomto případě

$$\begin{vmatrix} x - \frac{y}{2} & \frac{a}{2} \\ -\frac{y}{2} & \frac{a}{2} - \frac{x}{2} \\ \frac{a}{2} - \frac{x}{2} & y \end{vmatrix} = 0.$$

Vypočítáme-li determinant, obdržíme

$$(32) \quad 2(x^3 + y^3 - 3axy) + a^3 = 0$$

jako rovnici místa bodů $(x | y)$, z nichž tangenty vedené ku Descartes-ovu listu tvoří harmonický svazek. Rovnici tuto lze psáti ve tvaru

$$x^3 + y^3 + \frac{a^3}{2}z^3 - 6axyz = 0;$$

i shledáváme, že křivka (32) má styk trojbodový s Descartes-ovým listem v jeho bodech inflexních.

22. Hledáme-li totéž pro křivku harmonicky sdruženou (odst. 19.), je

$$A_0 = x, \quad A_1 = -\frac{y}{2}, \quad A_2 = -\frac{1}{2}(x + y - 2a), \quad A_3 = -\frac{x}{2}, \quad A_4 = y,$$

a píšeme-li

$$P \equiv x + y - 2a = 0,$$

je hledané místo

$$2(x^3 + y^3 + 3Pxy) - P^3 = 0.$$

Volíme-li za strany trojúhelníka souřadnicového osy X, Y , a přímku $P = 0$, můžeme rovnici toho místa psáti v kanonickém tvaru

$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - mx_1x_2x_3 = 0.$$

Ekvianharmonické body a tečny Descartes-ova listu.

23. Kruh jdoucí dvojným bodem listu protíná list ve skupině ekvianharmonických bodů, je-li v platnosti

$$A_0 A_4 = 3A_2^2 - 4A_1 A_3 = 0.$$

Klademe-li za A_h hodnoty odst. 20., obdržíme

$$\alpha\beta - 4 \left(\frac{\alpha}{4} - \frac{3}{8}a \right) \left(\frac{\beta}{4} - \frac{3}{8}a \right) = 0.$$

Píšeme-li

$$\alpha = \xi + \frac{a}{2}, \quad \beta = \eta + \frac{a}{2},$$

můžeme horní rovnici psáti

$$3\xi\eta + a(\xi + \eta) = 0,$$

t. j. geometrické místo středů kruhů, jež procházejí dvojným bodem Descartes-ova listu a list v ekvianharmonických bodech protínají, jest hyperbola stejnostranná, jejíž asymptoty jsou rovnoběžny s tečnami dvojného bodu.

24. Přihlížíme-li k hodnotám A_h v odst. 21. a 22., můžeme říci: „geometrické místo bodů, z nichž tangenty vedené ku listu tvoří ekvianharmonický svazek, jest přímka úběžná dvakrát vzatá“.

A dále: „geometrické místo bodů, z nichž tangenty vedené ku křivce harmonicky sdružené tvoří ekvianharmonický svazek paprsků, jest přímka $P = 0$ dvakrát vzatá“.

O kruhu jdoucím involutorní dvojinou a dvojným bodem listu.

25. V následujícím zobecníme některé výsledky. Budiž dána kvadratická involuce rovnicí

$$(33) \quad l(u_1 + u_2) + mu_1u_2 + n = 0.$$

Vyloučíme-li $(u_1 + u_2)$ z rovnice spojnice bodů u_1, u_2 , obdržíme

$$(lu_1^2u_2^2 + mu_1u_2 + n)x + (l + mu_1^2u_2^2 + mu_1u_2)y + 3alu_1u_2 = 0$$

čili

$$(lx + my)u_1^2u_2^2 + (mx + ny + 3al)u_1u_2 + (nx + ly) = 0.$$

Diskriminant této rovnice položen na roveň nulle poskytuje rovnici křivky, kterou spojnice dvojin involučních obalují, totiž

$$(mx + ny + 3a)^2 - 4(lx + my)(nx + ly) = 0,$$

což je Weyr-Cayley-ova kuželosečka.

Klademe-li $m = n = 0$, obdržíme rovnici (7) odst. 4.

26. Rovnice kruhu jdoucího dvojným bodem listu a dvěma jeho body u_1, u_2 jest, užijeme-li označení

$$(34) \quad \begin{aligned} u_1 + u_2 = \lambda, \quad u_1 u_2 = \mu, \\ x^2 + y^2 - 3a \frac{-\lambda - \lambda^2 - \mu + \mu^3}{1 + \lambda^3 - 3\lambda\mu + \mu^3} x + 3a \frac{-1 + \lambda\mu - \lambda^2 + \mu}{1 + \lambda^3 - 3\lambda\mu + \mu^3} y = 0. \end{aligned}$$

Tvoří-li body u_1, u_2 dvojiny kvadratické involuce dané rovnicí

$$(35) \quad l\lambda + m\mu + n = 0,$$

můžeme λ vyjádřit pomocí μ aneb obráceně. Jsou-li α, β souřadnice středu toho kruhu, je

$$(36) \quad \begin{aligned} \alpha &= \frac{3a}{2} \frac{(-\lambda - \mu + \lambda^2 + \mu^2)\mu}{1 - 3\lambda\mu + \lambda^3 + \mu^3} \\ \beta &= -\frac{3a}{2} \frac{-1 + \mu + \lambda\mu - \lambda^2}{1 - 3\lambda\mu + \lambda^3 + \mu^3} \end{aligned}$$

a ježto λ a μ vázány jsou lineární relací (35), je místo středů kruhů opsaných trojúhelníku z dvojiny involuční a z dvojného bodu listu racionální křivka třetího stupně.

27. Ve zvláštním případě, když $m = 0, n = 0$, tedy $\lambda = 0$, obdržíme, píšeme-li $\mu = \frac{1}{u}$,

$$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{3a}{2} \frac{u-1}{1+u^3} \\ \beta &= \frac{3a}{2} \frac{u^2(u-1)}{1+u^3} \end{aligned}$$

jako v odst. 18.

28. V případě, že

$$u_1 u_2 = \mu = -1,$$

máme centrální involuci na Descartes-ovu listu. Spojnice $\overline{u_1 u_2}$ dvojin involučních protínají Descartes-ův list v bodě $u_3 = 1$,

tedy v bodě ležícím na ose symetrie listu. Toto plyne jak z rovnic

$$u_1 u_2 u_3 = -1, \quad u_1 u_2 = -1,$$

tak i z rovnice spojnice $\overline{u_1 u_2}$ v odst. 4.

Jednotlivé dvojiny kvadratické involuce uvedené promítají se z dvojného bodu pod pravým úhlem.

Kruh jdoucí dvojinou involuční a dvojným bodem listu má délku $\overline{u_1 u_2}$ za svůj průměr a střed té délky za svůj střed. Dle toho mohli bychom přímo vypočítati souřadnice $(\alpha_1 | \beta_1)$ toho středu, než obdržíme je z rovnice (36), kladouce $\mu = -1$, totiž

$$(37) \quad \begin{aligned} \alpha_1 &= -\frac{3a^2 - \lambda + \lambda^2}{2 \cdot 3\lambda + \lambda^3} \\ \beta_1 &= \frac{3a^2 + \lambda + \lambda^2}{2 \cdot 3\lambda + \lambda^3}. \end{aligned}$$

Jest tudíž místo středů takových kruhů racionální křivka stupně třetího. Rovnici její ve tvaru $f(\alpha_1, \beta_1) = 0$ najdeme vyloučením parametru λ z rovnic (37); výsledek eliminace jest

$$(\alpha_1 + \beta_1 - 3a)^2 (\alpha_1 + \beta_1) + 3(\alpha_1 + \beta_1 - a) (\alpha_1 - \beta_1)^2 = 0.$$

Křivka tato má dvojný bod v průseku přímek

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \beta_1 - 3a &= 0 \\ \alpha_1 - \beta_1 &= 0, \end{aligned}$$

tedy v bodě Descartes-ova listu příslušném parametru $u = 1$. První rovnice je tečnou toho bodu a druhá rovnice je osou symetrie listu. Vezmeme-li prvou přímku za osu Y , druhou za osu X , obdržíme

$$y = x \sqrt{-\frac{x+3a}{x+a}}$$

jakožto rovnici geometrického místa středů kruhů jdoucích dvojným bodem listu a dvojinou kvadratické involuce bodové na Descartes-ově listu určené rovnicí $u_1 u_2 = 1$.

29. Kdybychom chtěli užítí souřadnic trojúhelníkových, vezmeme tečny dvojného bodu a reálnou asymptotu za strany fundamentálního trojúhelníka. Rovnici listu

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

můžeme psát ve tvaru

$$(x + y)^3 - 3xy(x + y + a) = 0,$$

tudíž, klademe-li

$$\rho x_1 = x$$

$$\rho x_2 = y$$

$$\rho x_3 = \frac{x + y + a}{-\sqrt{2}},$$

jest

$$(x_1 + x_2)^3 + 3\sqrt{2}x_1x_2x_3 = 0$$

rovnice Descartes-ova listu v těchto speciálních homogenních souřadnicích. Parametrické vyjádření souřadnic obdržíme ihned pomocí rovnic (1), čímž však při našem vyšetřování větších výhod bychom nedocílili.

O vodivosti vzduchu způsobené fosforem.

Napsal

Stanislav Petřra,

professor státní prům. školy na Smíchově.

Rychlost oxydace fosforu, síry a j. shledána *Ewanem**) úměrnou druhé odmocnině z panujícího právě tlaku kyslíku. K vysvětlení toho učinil *van t'Hoff****) hypothesu, že v obyčejném kyslíku nastává již před oxydací rozštěpení v jednotlivé atomy, jež jsou pravděpodobně opačně nabitý. Těleso oxydující přitahuje jednu z obou částí rozštěpením molekuly kyslíku vzniklých, takže druhá je k dispozici k jiným oxydacím; tímto způsobem možno vysvětliti vznik ozonu při pozvolném spalování fosforu.

Podobnou hypothesu učinil již dříve *Clausius****)) Vzhle-

*) *Th. Ewan*, *Zeitschr. für physikal. Chem.* 16. 315. 1895.

**) *J. H. van t'Hoff*, *Zeitschr. für physikal. Chem.* 16. 411. 1895.

***)) *R. Clausius*, *Pogg. Ann.* 103. 644. 1858 a 121. 250. 1864.