

Zdeněk Pírko

Poznámka k teorii křivek kaustických

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 65 (1936), No. 1, D14--D15

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/123694>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1936

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

Poznámka k teorii křivek kaustických.

Zdeněk Pírko, Praha.

1. Vrcholným bodem metricko-analytické teorie křivek kaustických jest známá věta *Queteletova-Gergonneova*,¹⁾ která praví: Kaustika B (zrcadlíci nebo lámavé) křivky Γ pro takové paprsky, které se dotýkají křivky A (čili jsou normálami jiné křivky A' , evolventy to křivky A), jest evolutou sekundární kaustiky B' . Sekundární kaustika B' jest obálkou kružnic K , jejichž středy leží v incidenčních bodech na křivce Γ a které se dotýkají křivky A (v případě katakaustik), nebo mají poloměr rovný $1/\lambda$ poloměru kružnice K (v případě diakaustik); při tom zákon lomu je dán vztahem

$$\frac{\sin \nu}{\sin \nu'} = \lambda.$$

Jestliže křivka A se redukuje na bod, platí rovněž známá věta *Weyrova*²⁾ pro katakaustiky: Sekundární katakaustika B' jest podobou křivky Γ vzhledem k svítícímu bodu jako pólu. Při tom podobou rozumíme podle *Brocarda*³⁾ geom. místo bodů souměrně sdružených s daným bodem (pólem) podle všech tečen dané křivky (křivky základní). Je patrné tudíž, že podobida není nic jiného než křivka homotetická v poměru 2 : 1 k úpatnici křivky základní vzhledem k pólu.

Větou Weyrovou stává se teorie křivek katakaustických pro bodový zdroj kapitolou teorie úpatnic. V následujícím platnost věty Weyrovy, jde-li opět o bodový zdroj, rozšíříme i na případ diakaustik.

2. Budiž dána základní křivka Γ_0 s rovnicí $f(x, y) = 0$. Rovnici šikmé úpatnice pro úhel ε , Γ_1^ε (definujeme-li jistý smysl) vzhledem k počátku jako pólu obdržíme eliminací x, y z rovnic $f(x, y) = 0$ a

$$\xi = \frac{1}{\mu} \left(\mu \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) \frac{x \partial f / \partial x + y \partial f / \partial y}{(\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2}, \quad (1)$$

$$\eta = \frac{1}{\mu} \left(\mu \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial x} \right) \frac{x \partial f / \partial x + y \partial f / \partial y}{(\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2},$$

($\mu = \operatorname{tg} \varepsilon$). Výsledek budiž tvaru $F(\xi, \eta) = 0$.

¹⁾ *Quetelet*, Démonstration et développements des principes fondamentaux de la théorie des caustiques secondaires, Mém. Acad. Belg., V, 1829; *Gergonne*, Sur les caustiques planes, Ann. de Math., XV, 1824—1825; viz na př. *Loria*, Spezielle algebraische und transzendente ebene Kurven, II, 1911, str. 306 a n.

²⁾ *Emil Weyr*, Über die Identität der Brennlinien mit den Evoluten der Fußpunktcurven, Zeitschrift Math. Phys., XIV, 1869, str. 376 a n.

³⁾ *Brocard*, Notes de bibliographie des courbes géométriques, 1897, str. 221.

Rovnice (1) — spolu s příslušnou rovnicí pro $\frac{d\eta}{d\xi}$ — určují speciální případ *Ludwigových-Wilsonových*⁴⁾ lineárně-kvadratických dotykových transformací s aequatio directrix tvaru

$$\Omega(\xi, \eta; x, y) \equiv \xi^2 + \eta^2 - \left(x - \frac{y}{\mu}\right) \xi - \left(\frac{x}{\mu} + y\right) \eta = 0.$$

Rovnice tato v souřadnicích ξ, η představuje kružnici

$$\left[\frac{1}{2} \left(x - \frac{y}{\mu}\right), \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\mu} + y\right); \frac{\sqrt{1 + \mu^2}}{2\mu} r \right],$$

jdoucí pólem. Při tom r je průvodič základní křivky měřený od pólu, tudíž poloměr uvažované kružnice je ve stálém poměru k poloměrům kružnic majících středu na křivce Γ_0 a jdoucích počátkem.

Dokážeme nyní snadno, že šikmá úpatnice Γ_1^ε je obálkou kružnic $\Omega = 0$. Speciálně pro $\varepsilon = \frac{1}{2}\pi$ obdržíme známou větu *Stubbsovu*⁵⁾ o obyčejných úpatnicích.

Hledejme dále geom. místo bodů souměrně sdružených s pólem podle bodů šikmé úpatnice Γ_1^ε . Křivku označíme $*\Gamma_1^\varepsilon$; její rovnice jsou $*\xi = 2\xi, *\eta = 2\eta$, kde ξ, η jsou dány rovnicemi (1); nazveme ji analogicky k podobě Brocardově šikmou podobou křivky Γ_0 . Tato křivka je tedy obálkou kružnic

$$\left(x - \frac{y}{\mu}, \frac{x}{\mu} + y; \frac{\sqrt{1 + \mu^2}}{\mu} r\right).$$

3. Tuto kružnici můžeme tedy co do velikosti identifikovati s kružnicí K z odstavce 1, položíme-li

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\sqrt{1 + \mu^2}}{\mu}, \text{ t. j. } \lambda = \sin \varepsilon. \quad (2)$$

Máme tedy hledané rozšíření věty Weyrovy ve tvaru: Sekundární kaustika B' jest šikmou podobou křivky Γ' vzhledem k svítícímu bodu jako pólu; je-li rovnice křivky Γ tvaru $f(x, y) = 0$, přísluší jí křivka Γ' s rovnicí $f\left(x - \frac{y}{\mu}, \frac{x}{\mu} + y\right) = 0$, úhel promítání má oblouk $\arcsin \lambda$, je-li λ index lomu.

Vlastní větu Weyrovu obdržíme pro $\lambda = 1$ ($\varepsilon = \frac{1}{2}\pi, \mu = \infty$); šikmá podoba přejde v podobu Brocardovu, křivky Γ a Γ' splynou.

⁴⁾ *Wilson*, Untersuchung einer linearquadratischen Berührungstransformation, 1913. (Thomas & Hubert, Weida i. Thüringen.)

⁵⁾ *Salmon-Fiedler*, Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven, 1882, str. 390 (pozn. str. 504).