

Matematicko-fyzikálny časopis

Renáta Hrmová

Pologrupy, v ktorých každý ľavý vlastný ideál je grupou

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 11 (1961), No. 1, 75--80

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126347>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1961

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

POLOGRUPY, V KTORÝCH KAŽDÝ ĽAVÝ VLASTNÝ IDEÁL JE GRUPOU

RENÁTA HRMOVÁ, Bratislava

Nech S je pologrupa. Ľavým ideálom pologrupy S nazývame neprázdnu podmnožinu $L \subset S$, pre ktorú platí $SL \subset L$; pravý ideál pologrupy S je neprázdna podmnožina $R \subset S$, pre ktorú platí $RS \subset R$. Množina $N \subset S$, ktorá je súčasne ľavým i pravým ideálom, nazýva sa obojstranný ideál.

Ľavý ideál L nazýva sa minimálnym ľavým ideálom pologrupy S , ak neexistuje ľavý ideál $L' \neq L$, pre ktorý platí $L' \subset L$. Analogicky definujeme pojem minimálneho pravého a obojstranného ideálu.

Ľavý ideál L pologrupy S nazýva sa jej maximálnym ľavým ideálom, ak neexistuje ľavý ideál $\bar{L} \neq S$, pre ktorý platí $L \subsetneq \bar{L}$. Analogicky definujeme maximálny pravý a obojstranný ideál.

Pologrupa P nazýva sa zľava jednoduchá, ak pre každé $a \in P$ platí $Pa = P$. Takáto pologrupa neobsahuje ľavý ideál $L \neq P$. Pologrupa P je teda zľava jednoduchá práve vtedy, keď ku každej dvojici $a, b \in P$ existuje také $x \in P$, že $xa = b$.

Š. Schwarz v práci [1] našiel konštrukciu všetkých pologrúp, ktoré nie sú grupami a v ktorých každý vlastný ľavý i pravý ideál je grupa. Takéto pologrupy nazval F -pologrupami.

V tejto práci sa budeme zaoberať pologrupami, v ktorých každý ľavý vlastný ideál je grupa. Pretože zľava jednoduchá pologrupa neobsahuje ľavý ideál $\neq P$, je účelné zaviesť túto definíciu:

Definícia 1. *Pologrupa S nazýva sa F_1 -pologrupou, ak nie je zľava jednoduchá a každý jej vlastný ľavý ideál je grupa.*

V tejto práci nájdeme konštrukciu všetkých F_1 -pologrúp.

Na začiatku uvedieme niekoľko pomocných viet, ktoré sú väčšinou známe.

Lemma 1. *Nech L je ľavý ideál pologrupy S a P zľava jednoduchá pologrupa, pre ktorú platí $P \subset S$. Ak $L \cap P \neq ()$, potom $P \subset L$.*

Dôkaz. Nech $a \in L \cap P$. Potom $P = Pa \subset PL \subset L$, č. b. t. d.

Lemma 2. *Nech L je minimálny ľavý ideál pologrupy S . Nech $a \in S$. Potom aj La je minimálny ľavý ideál pologrupy S .*

Dôkaz. Pozri [1], Lemma 3.

Priamym dôsledkom lemy 2 je

Lemma 3. Ak pologrupa S obsahuje práve jeden minimálny ľavý ideál L , potom pre každý prvok $a \in S$ platí $La = L$ a L je aj minimálny obojstranný ideál pologrupy S .

Lemma 4. Nech N je maximálny obojstranný ideál, ktorý nie je obsažený v žiadnom ľavom ideáli $\neq S$. Označme $T = S - N$.

a) Ak T obsahuje viac elementov než jeden, alebo ak T obsahuje práve jeden idempotentný element, potom T je zľava jednoduchá pologrupa.

b) Ak T obsahuje práve jeden element u , ktorý nie je idempotent, je $u^2 \in N$.

Dôkaz. Je obsiahnutý v dôkaze lemy 4 práce [1].

Lemma 5. Nech P je zľava jednoduchá pologrupa a G je grupa. Nech φ je homomorfne zobrazenie P do G . Potom $\varphi(P)$ je grupa.

Dôkaz. Množina $\varphi(P)$ nevyhnutne obsahuje jednotku e grupy G . Pre každé $a \in P$ platí totiž $Pa = P$, takže ku každému prvku $a \in P$ existuje prvok $e_a \in P$ taký, že $e_a a = a$. Označme $\varphi(e_a) = x$, $\varphi(a) = y$. Potom $\varphi(e_a a) = \varphi(e_a) \varphi(a) = xy$. Pretože však $\varphi(e_a a) = \varphi(a) = y$, platí $y = xy$. Keďže $x, y \in G$, je $x = e$. Treba ešte ukázať, že ku každému prvku $\varphi(a) \in \varphi(P)$ existuje ľavý inverzný element. Podľa predošlého existuje ku každému prvku $c \in P$ také $e_c \in P$, že $e_c c = c$ a $\varphi(e_c) = e$. Pretože P je zľava jednoduchá pologrupa, existuje ku každej dvojici prvkov $a, e_c \in P$ prvok $b \in P$ taký, že $ba = e_c$. Teda $\varphi(ba) = \varphi(b) \varphi(a) = e$, t. j. ku každému prvku $\varphi(a) \in \varphi(P)$ existuje ľavý inverzný element $[\varphi(a)]^{-1} = \varphi(b)$.

* * *

Teraz si všimneme niektoré vlastnosti F_I -pologrúp.

Lemma 6. V F_I -pologrupe je každý jej vlastný ľavý ideál súčasne jej maximálnym i minimálnym ľavým ideálom.

Dôkaz. Nech S je F_I -pologrupa a nech L je jej vlastný ľavý ideál. Nech $L' = S$ je ľavý vlastný ideál pologrupy S , pre ktorý platí $L \subset L'$. Pretože L' je grupa, je nevyhnutne $L = L'$, a teda L je maximálnym ideálom pologrupy S . Podobne ukážeme, že L je minimálny ľavý ideál.

Na príkladoch možno ukázať, že existujú F_I -pologrupy, ktoré obsahujú dva ľavé vlastné ideály, i F_I -pologrupy iba s jedným vlastným ľavým ideálom.

Lemma 7. Keď S je F_I -pologrupa, potom nastane práve jeden z týchto dvoch prípadov:

- A. S má práve dva vlastné ľavé ideály L_1, L_2 a platí $S = L_1 \cup L_2, L_1 \cap L_2 = \emptyset$.
- B. S má práve jeden ľavý vlastný ideál.

Dôkaz je obsiahnutý v dôkaze lemy 2 práce [1].

Lemma 8. *Nech S je F_1 -pologrupa, ktorá obsahuje práve jeden minimálny ľavý ideál $L \neq S$. Potom L je súčasne jediným maximálnym ľavým i jediným maximálnym obojstranným vlastným ideálom pologrupy S .*

Dôkaz. Z lemy 3 vyplýva, že L je vlastným obojstranným ideálom pologrupy S . Z lemy 6 vyplýva, že L je maximálnym ľavým i maximálnym obojstranným vlastným ideálom pologrupy S .

V ďalšom sa budeme osobitne zaoberať prípadmi A a B z lemy 7.

Prípad A

Podobne ako v práci [1] možno dokázať tvrdenia:

Nech S je F_1 -pologrupa, ktorá obsahuje práve dva ľavé vlastné ideály L_1, L_2 . Nech e_1, e_2 sú jednotkové elementy grúp L_1, L_2 . Potom $L_1 \approx L_2$, platí $e_i e_k = e_k$ ($i, k = 1, 2$) a S je sprava jednoduchá pologrupa, izomorfná s direktným súčinom $G \times \{e_1, e_2\}$, kde G je grupa, izomorfná s grupami L_1, L_2 .

Naopak, keď G je ľubovoľná grupa a množina $\{e_1, e_2\}$ je pologrupa, v ktorej je definované násobenie vzťahom $e_i e_k = e_k$ ($i, k = 1, 2$), potom direktný súčin $S = G \times \{e_1, e_2\}$ je F_1 -pologrupa. Pologrupa S obsahuje práve dva vlastné ľavé ideály $G \times e_1, G \times e_2$, ktoré sú zrejme grupami.

Prípad B

Nech S je F_1 -pologrupa, ktorá má práve jeden ľavý vlastný ideál L . V dôsledku lemy 8 je L maximálnym obojstranným i maximálnym ľavým ideálom pologrupy S , a teda podľa lemy 4 treba rozoznávať dva prípady:

x) $S - L = \{u\}$, kde u nie je idempotent, teda $u^2 \in L$. Nech e je jednotka grupy L . Označme $b = eu$. Potom $b \in L$ a zrejme $u^2 = b^2$. Ďalej pre každé $x \in L$ platí $bx = ux$ a $xu = xb$.

Nech teraz naopak G je grupa a nech u je ľubovoľný element, pre ktorý platí $u \text{ non} \in G$. Zvoľme ľubovoľný prvok $b \in G$, utvoríme množinu $S = G \cup \{u\}$ a definujme v nej násobenie takto:

- a) $x \circledast y = xy$, keď $x, y \in G$,
- b) $u \circledast u = b^2$,
- c) $u \circledast x = bx, x \circledast u = xb$ pre každé $x \in G$.

Ľahko možno dokázať, že S je pologrupa. Budeme ju označovať znakom $S[G, u, b]$.

Rovnako je zrejmé, že S je F_1 -pologrupa, ktorá obsahuje jediný vlastný ľavý ideál G .

$\beta)$ Nech S je F_1 -pologrupa, ktorá má práve jeden ľavý ideál L a nech množina $S - L = P$ pozostáva alebo z jedného idempotentného elementu, alebo nech pozostáva z viac prvkov než jedného. Podľa lemy 8 a podľa lemy 4 platí $S = L \cup P$, $L \cap P = \emptyset$, kde L je grupa a P zľava jednoduchá pologrupa.

Nech e_0 je jednotkový element grupy L . Pre každý prvok $a \in P$ platí $ae_0 \in aL \subset L$. Ukážeme, že zobrazenie $a \rightarrow ae_0$ je homomorfné zobrazenie pologrupy P do grupy L . Ak totiž $a \in P$, $b \in P$ a $a \rightarrow ae_0$, $b \rightarrow be_0$, platí $(ab)e_0 = a(be_0) = a[e_0(be_0)] = (ae_0)(be_0)$. Podľa lemy 5 je teda zobrazenie $\varphi(a) = ae_0$ zobrazením zľava jednoduchej pologrupy P na istú podgrupu grupy L .

Nech naopak P je ľubovoľná zľava jednoduchá pologrupa a G ľubovoľná grupa, pre ktorú platí $G \cap P = \emptyset$. Nech φ je homomorfné zobrazenie pologrupy P do grupy G .*) Označme násobenie v pologrupe P znakom $(. .)$, násobenie v grupe G znakom $(.)$. Zostrojme množinu $S = \{P \cup G\}$ s násobením \odot , definovaným takto:

$$x \odot y = \begin{cases} x . y, & \text{keď } x, y \in P, \\ x . y, & \text{keď } x, y \in G, \\ \varphi(x) . y, & \text{keď } x \in P, y \in G \\ x . \varphi(y), & \text{keď } x \in G, y \in P \end{cases}$$

Ľahko dokážeme, že násobenie \odot je asociatívne a že množina S je teda pologrupa. Budeme ju označovať znakom $S[P, G, \varphi]$.

Nech teraz e_0 je jednotkový prvok grupy G . Potom pre každý prvok $a \in P$ platí $\varphi(a) = \varphi(a) . e_0 = a \odot e_0$. Zobrazenie φ pologrupy P do grupy G je teda charakterizované vzťahom $\varphi(a) = a \odot e_0$.

Nakoniec ukážeme, že pologrupa $S = S[P, G, \varphi]$ je F_1 -pologrupa, ktorá obsahuje práve jeden ľavý vlastný ideál. Grupa G je zrejme vlastný ľavý a dokonca obojstranný ideál pologrupy $S[P, G, \varphi]$. Nech $L \neq G$ je ľavý ideál pologrupy $S[P, G, \varphi]$. Potom $L \cap P \neq \emptyset$ a z lemy 1 vyplýva $P \subset L$. Ďalej platí $S \odot L \subset L$. Keďže pre každý $a \in L$ vyplýva $e_0 \odot a = e_0 . \varphi(a) \in G$, $G \cap L \neq \emptyset$. Preto je podľa lemy 1 $G \subset L$. Úhrnom $S = P \cup G \subset L$, t. j. $S = L$ č. b. t. d.

Z úvah v odsekoch A a B vyplýva priamo tento konečný výsledok:

Veta. Pologrupa S je F_1 -pologrupou vtedy a len vtedy, keď je izomorfná s pologrupou, ktorá patrí do niektorej z týchto tried pologrúp:

a) trieda pologrúp typu $G \times H$, kde G je grupa a H je pologrupa pozostávajúca z dvoch idempotentov, medzi ktorými je definované násobenie vzťahom $e_i e_k = e_k$, ($i, k = 1, 2$)

b) trieda pologrúp typu $S[G, u, b]$,

c) trieda pologrúp typu $S[P, G, \varphi]$.

* Konštrukcia všetkých homomorfných zobrazení zľava jednoduchých pologrúp do grupy je opísaná v práci [3]. O homomorfizmoch špeciálnejších pologrúp hovorí práca [4].

LITERATÚRA

- [1] Schwarz Š., *Semigroups in which every proper subideal is a group*, Acta scientiarum Mathematicarum, Szeged, 21, (1960), 125--134.
- [2] Schwarz Š., *Максимальные идеалы в теории полугрупп*, Чех. Мат. Журнал 3 (78) (1953), 365--383.
- [3] Глушкин Л. М., *Гомоморфизмы односторонне простых полугрупп на группу*, Доклады АН СССР 102 (1955), 673--676.
- [4] Cohn P. M., *On the structure of sesquilateral division semigroups*, Proc. London Math. Soc. (3) 8, (1958), 466--480.

Došlo 25. 5. 1960.

*Katedra matematiky
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave*

ПОЛУГРУППЫ, В КОТОРЫХ ВСЯКИЙ ЛЕВЫЙ ИДЕАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППОЙ

Рената Грмова

Резюме

В настоящей статье обобщаются результаты статьи [1].

Полугруппа S называется простой слева, если она не содержит отличных от S левых идеалов.

Полугруппа S называется F_l -полугруппой, если она не является простой слева и всякий ее левый идеал, отличный от S , является группой.

В статье доказываются эти результаты:

В F_l -полугруппе все отличные от S левые идеалы являются одновременно максимальными и минимальными идеалами этой полугруппы.

Если S является F_l -полугруппой, то имеет место один и только один из следующих случаев:

А. В S существует два различных левых идеала $L_1 \subsetneq S$, $L_2 \subsetneq S$ и имеет место $S = L_1 \cup L_2$, $L_1 \cap L_2 = ()$.

Б. В S существует только один левый идеал $L \subsetneq S$.

Будем говорить, что полугруппа S является полугруппой типа $S(G, u, b)$ если $S = G \cup \{u\}$, где G — группа, u — элемент $\notin G$ и мультипликация \odot в S определена следующим образом: $x \odot y = xy$ для $x, y \in G$; $u \odot u = b^2$ для некоторого $b \in G$; $u \odot x = bx$, $x \odot u = xb$ для любого $x \in G$, где xb, bx являются произведениями элементов в группе G .

Пусть φ — гомоморфизм простой слева полугруппы P в группу G . Говорим, что полугруппа S является полугруппой типа $S(P, G, \varphi)$, если $S = G \cup P$, $G \cap P = ()$ и мультипликация \odot в S определена при помощи мультипликации (\cdot) в полугруппе P и мультипликации (\cdot) в группе G следующим образом: $x \odot y = x \cdot y$ для $x, y \in P$; $x \odot y = x \cdot y$ для $x, y \in G$; $x \odot y = \varphi(x) \cdot y$ для $x \in P, y \in G$; $x \odot y = x \cdot \varphi(y)$ для $x \in G, y \in P$.

В статье доказана теорема:

Полугруппа S является F_I -полугруппой тогда и только тогда если она изоморфна полугруппе, принадлежащей одному из следующих классов полугрупп:

- а) Класс полугрупп типа $G \cdot H$, где G группа и $H = \{e_1, e_2\}$ -- полугруппа, в которой $e_i e_k = e_k$ ($i, k = 1, 2$).
- б) Класс полугрупп типа $S(G, u, b)$.
- в) Класс полугрупп типа $S(P, G, q)$.

SEMIGROUPS IN WHICH EVERY PROPER LEFT IDEAL IS A GROUP

Renáta Hrmová

Summary

The purpose of this paper is a generalization of results of the paper [1].

A semigroup S is called to be left simple if it does not contain a proper left ideal.

A semigroup S is called to be an F_I -semigroup if it is not a left simple semigroup, but every left proper ideal of S is a group.

In this paper following results are proved:

If S is an F_I -semigroup, then every left proper ideal of S is a maximal and also a minimal proper ideal of S .

If S is an F_I -semigroup, then one and only one of the following cases holds:

A. S contains precisely two different proper left ideals $L_1 \subsetneq S$, $L_2 \subsetneq S$ and $S = L_1 \cup L_2$, $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ holds.

B. S contains a unique left proper ideal.

By semigroup of the type $S(G, u, b)$ we mean a semigroup $S = \{G \cup u\}$, where G is a group, u is an element non $\in G$ with the multiplication \odot defined as follows: $x \odot y = xy$ for $x, y \in G$, $u \odot u = b^2$ for some $b \in G$, $u \odot x = bx$, $x \odot u = xb$, for every $x \in G$; xy, bx, xb are the products of the elements in the group G .

Let q is a homomorphic mapping of a left simple semigroup P into the group G . By the semigroup of the type $S(P, G, q)$ we mean a semigroup $S = \{G \cup P\}$, $G \cap P = \emptyset$, with the multiplication \odot defined by the multiplication (\cdot) in the group G and by the multiplication (\cdot) in the semigroup P , as follows: $x \odot y = x \cdot y$, for $x, y \in P$, $x \odot y = x \cdot y$ for $x, y \in G$, $x \odot y = q(x) \cdot y$ for $x \in P$, $y \in G$, $x \odot y = x \cdot q(y)$, for $x \in G$, $y \in P$.

In this paper following theorem is proved:

A semigroup S is an F_I -semigroup if and only if it is isomorphic with a semigroup belonging to one of the following classes of semigroups:

- a) The class of semigroups of the type $G \cdot H$, where G is a group and $H = \{e_1, e_2\}$ is a semigroup in which $e_i e_k = e_k$ ($i, k = 1, 2$).
- b) The class of semigroups of the type $S(G, u, b)$.
- c) The class of semigroups of the type $S(P, G, q)$.